

প্রাচীন
ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত

"...to construct a history of thought without profound study of the mathematical ideas of successive epochs is like omitting Hamlet from the play which is named after him."

—A. N. Whitehead

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাস

(প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

নন্দলাল মাইতি



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৮৩

প্রকাশক :

কার্মা কেএলএম আইভেট লিমিটেড

২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০১২

Acc No - 15644

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮৩

© নন্দলাল মাইতি

মূল্য : ৩০.০০

মুদ্রাকর :

নায়ক প্রিন্টার্স

৮১/১নই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

যথা শিখা ময়ূরাণাং নাপান্ধাং মগনৌ যথা ।

তদ্ববেদাদশাস্ত্রাণাং গণিতং যুর্জনি স্থিতম্ ॥

—বেদাদ জ্যোতিষ

॥ ভূমিকা ॥

গণিতের ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের নামান্তর। সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে গণিতের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে-कारणे গণিতের ইতিহাসকে সভ্যতার দর্পন বলা খুবই যুক্তিযুক্ত। বস্তুত, সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি-অবনতি, এর ক্রটি-বিচ্যুতি সামগ্রিক রূপ নিয়ে গণিতের ইতিহাসের মধ্যে এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্র শাখার ইতিহাসে তেমনটি হয় কিনা সন্দেহ। কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সঙ্গীত-শিল্প-কলা সবার উন্নতি ও উৎকর্ষের মূলে গণিত,—গাণিতিক-চিন্তন ব্যতিরেকে কোন কিছুই উন্নতি সম্ভব নয়। কথাটি একটু হৈয়ালির মতো শোনালেও এটি সত্য। ধারা আধুনিক গণিত ও তার প্রয়োগ ইত্যাদির সঙ্গে সামান্য পরিচিত, তাঁরা সহজেই কথাটি অনুধাবন করতে পারবেন। তা' ছাড়া প্রাচীন মনস্বীরা যে গণিতের এই সারবত্তা উপলব্ধি করেননি তা নয়। দার্শনিক প্রটো তাঁর আকাদেমীর তোরণ-দ্বারে উৎকীর্ণ করেছিলেন,—“Let no man ignorant of geometry enter here.” আর গু ভিক্ষি তো বলেছিলেন, গণিতে ঋদের জ্ঞান নাই, তাঁরা যেন তাঁর শিল্পশৃষ্টি বিচার না করেন।

সবার জ্ঞান, অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। সেই ধারা নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এখনো অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে,—বদিও একটু ভিন্ন চেহারায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার স্বাক্ষর রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায়; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় পেতে হলে, তার একটি সামগ্রিক রূপের ধারণা পেতে হলে নানা ধর্মের যে বিশাল শাস্ত্ররাজি রয়েছে, ইতিহাস-পুরাণ-কাব্য-দর্শন রয়েছে, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি রয়েছে, তা সবই অধ্যয়ন করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে এই বিশাল সমুদ্র মন্থন এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। তা ছাড়া সবার সব বিষয়ে অধিকারও নাই, কৃতি-প্রবণতাও নাই। তা হলে কিভাবে এই সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়? এ বিষয়ে গণিতের ইতিহাস আমাদের বখেই সাহায্য করতে পারে। এই একটিমাত্র বিজ্ঞানের শাখার জানলা দিয়ে সব দেখা যায়,—এমনি এর আণুবীক্ষণিক চোখ।

গণিতের ইতিহাসের চোখে সব ধরা পড়ে, তা যত ছোট হোক আর বড়ই হোক, যত কাছের হোক, আর যত দূরেরই হোক ।

গণিতের ইতিহাস লেখার নানা রকম পদ্ধতি থাকতে পারে : গণিতাশ্রয়ী, ইতিহাসাশ্রয়ী বা এ দুয়ের সংমিশ্রণ; আবার গণিতজ্ঞদের জীবনী ও তাঁদের সামগ্রিক ও বিশেষ বিশেষ অবদান নিয়েও ক্রমবর্ধমান গণিতের ইতিহাস রচিত হতে পারে। অথবা সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে গণিতের উপাদানগুলি স্থাপন করে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক ইতিহাসও হতে পারে। বস্তুত গণিতের ইতিহাস রচনা করা যেমন জটিল তেমনি দুঃকর। গণিত ইতিহাসিকের যেমন ইতিহাসে জ্ঞান থাকা দরকার,—ইতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যঞ্জনা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকা দরকার, তেমনি গণিতেও জ্ঞান থাকা দরকার। আর কেবল এতেই হবে না, সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাটি অচূর্ণরূপে ধরাও প্রয়োজন। সর্বোপরি সবার সম্মুখে গঠিত সামগ্রিক স্বচ্ছ ধারণা অপরিহার্য।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নানা পরম্পর বিরোধী তত্ত্ব ও তথ্য আছে,—এ-নিয়ে পণ্ডিত মহলে তর্কের শেষ নাই। সেইসব বিতর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্য থেকে একটি সম্ভাবজনক সমাধান ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে কত কঠিন, তা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই তর্কের মাঝে পড়ে সব সময় যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছি, তা জোর করে বলতে পারি না। তবে বেশীভাগ ক্ষেত্রেই পূর্বাচার্যদের মত ও পথই অবলম্বন করেছি, আর কখনো কখনো বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠে যে ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি, তার যথেষ্ট কোন প্রামাণিকতা না থাকলেও, না বলে পারিনি।

ইতিহাসের সুবিশাল পটভূমিতে তত্ত্ব ও তথ্যের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এই গ্রন্থের বৃত্তের বাইরে। সে-বিষয়ে লেখকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলে ভান করার দরকারও নাই। এই গ্রন্থে মূলত প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্মেষকল্প থেকে গণিতের উত্থান-পতনের সহজ ইতিবৃত্ত দেবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সে-কারণে আমাদের গাণিতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের বিশেষ বিশেষ দিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে,—বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে সংশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি মাত্র।

অনিবার্য কারণে মাঝে মাঝে আলোচনার সূত্র আনতে গিয়ে একই বিষয়ের

অবতারণা করতে হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গণিত সম্পর্কে যারা সামান্য অবগত আছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন এ ছাড়া উপায় ছিল না। কোন কোন গাণিতিক তত্ত্ব একটি যুগে সম্পূর্ণতা লাভ করে না। একই ধারণা, একই তত্ত্ব বিভিন্ন যুগের গণিতাচার্যরা আলোচনা করেছেন। আর তাঁদের কথা বলতে গিয়ে পুনরুক্তি অপরিহার্য ও অনিবার্য হয়ে উঠে।

প্রাচীন ভারতে গণিত পৃথক বিষয় হিসাবে আলোচিত হতো না,—জ্যোতি-বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রয়োজনের তাগিদে আলোচিত হতো। তাই এই গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করতে হয়েছে। কিন্তু গণিত প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচিত হয়নি। কেবলমাত্র সোয়াই জয় সিং সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে।

বলা বাহুল্য, গ্রন্থটি পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান নয়। সাধারণ মানুষ, বাংলা ভাষার মাধ্যমে অন্তর্মুগ্ধ পাঠক-পাঠিক বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আমাদের প্রাচীন গণিতের একটি রূপরেখা পান, সেই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি পবিত্রিত। তাই,—এই গ্রন্থে এমন কোন গাণিতিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি য স্কুল গণিত-জ্ঞানের বাইরে, কেবলমাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে উচ্চ গণিতের উপাদানের উল্লেখ আছে। এতে গণিতাচার্যদের সূত্র-নয়মাদির মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাতে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ কারুর পক্ষে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হবে না। কারণ,—সর্বত্র বঙ্গানুবাদ, ভাবানুবাদ বা মর্মার্থ দেওয়া হয়েছে; এমন কি প্রায় সর্বত্র উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

লক্ষণীয়, এই গ্রন্থে পাদটীকা নাই বললেই চলে। গ্রন্থপঞ্জীও যে বিস্তারিত তা বলার স্পর্ধা রাখি না। বখাস্থানে উল্লিখিত হলেও এখানে কয়েকটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই যে গ্রন্থের নাম করতে হয়, তা হলো Dr. B. B. Datta ও Dr. A. N. Singh-এর History of Hindu Mathematics; Dr. B. B. Datta-এর Science of Sulba; Dr. T. A. Saraswati Amma-র Geometry in Ancient and Medieval India; Dr. C. N. Srinivasienger-এর History of Ancient Indian Mathematics; A Concise History of Science in India-এর অন্তর্গত S. N. Sen রচিত গণিতের ইতিহাস। প্রাচীন লিপি ও চিত্রগুলির অধিকাংশই উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ

থেকে গৃহীত। পাণ্ডুলিপির সামান্য পরিমার্জনাশালাে ও প্রফ দেখার সময় ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদারের 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' বইটির সাহায্য নিয়েছি। এবং গ্রন্থ মধ্যে প্রা. ভা. গ. চ. নামে উল্লেখ করেছি।

প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থে নতুন কোন তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবেশনা নাই, আর নতুন কোন তত্ত্বের উপস্থাপনাও নাই। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব অভিমত আছে। তা হলেও বলা যায়, এতে অতি পরিচিত তথ্যের সঙ্কলন আছে মাত্র। এ-বিষয়ে পূর্বাচার্যদের ও পূর্বস্বরীদের প্রতি আমার স্বর্ণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

আর একটি কথা : প্রাচীন ভারতীয় গণিতের কিছু কিছু মূলগ্রন্থ, অল্পবাদ ও ইতিহাস পাঠে যে যুগপৎ বিশ্বয় ও আনন্দ অল্পভব ও উপলব্ধি করেছি, এবং সাধারণ পাঠক ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তার যতটুকু উপযোগিতা আছে বলে মনে হয়েছে, তার সামান্য অংশ পরিবেশন করার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় গণিতের নানা তত্ত্ব ও তথ্য জটিল ও দুর্বোধ্য। তাই এই গ্রন্থে কোন ক্রটি নাই, একথা বলার মতো দৃষ্টতা আমার নাই। যদি অল্পসংখ্যক পাঠক ও স্বধীজন ভুল-ক্রটি উল্লেখ করে গ্রন্থটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে গঠনমূলক প্রস্তাব দেন, তা হলে অল্পগৃহীত হবে।

গ্রন্থে কোথাও কোথাও একাধিক বানান আছে এবং ভুলও অল্পপ্রমিত হয়েছে,—কিছু মূত্রণ-ভুল, আর কিছু লেখকের অনবধানতার জন্য ভুল। লেখকের পক্ষে সব প্রফ দেখা সম্ভব হয়নি, আবার লেখক প্রফ দেখায় খুবই অদক্ষ। ভুল যে-কাকুরই হোক, লেখক অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর ক্রটি স্বীকার করেছেন। পরিশেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হলো। জানি, পাঠক-পাঠিকাদের পড়তে অসুবিধা হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য মার্জনাপ্রার্থী।

এখানে দু-জন সরকারী কর্মচারীর নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁরা হচ্ছেন শ্রীঅনিলচন্দ্র দাস ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ অধিকারী। আমি এই গ্রন্থের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পাণ্ডুলিপিসমেত একটি বাগ কলকাতা থেকে বাঁকুড়াগামী এক্সপ্রেস বাসে ফেলে আসি। কিন্তু ড্রাইভার শ্রীদাস ও কণ্টার শ্রীঅধিকারী পরদিন সকালে আমার টাকাপয়স, পাণ্ডুলিপি ও অগ্রাণু দরকারী কাগজপত্র সমেত ব্যাগটি ফেরৎ দেন। তাঁদের মহত্ত্ব ও সহায়তা আমার আরো প্রেরণা দিয়েছে।

যাঁরা আমার গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন তাঁরা স্মরণ কর, ডাঃ কালাচাঁদ রায়, ডাঃ গোপালচন্দ্র মাইতি, অনীতা কর, প্রণতি রায়, অশোক কুমার খামকই, কিশোরী মোহন মান্না, ডঃ অসীম বর্ধন ও রবীন বল। এঁদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদার ডঃ অমূল্যকুমার বাগের মূল একটি প্রবন্ধ সরবরাহ করায় ও বইটিতে বিশেষ ঐশ্বর্য্য ও আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফার্মা কেএলএম-এর কর্ণধার কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশে সবিশেষ যত্ন ও আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, এবং অল্পজপ্রতিম লেখককে সর্বদা সুপরামর্শ দিতেন। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে গভীর বেদনা অনুভব করছি এবং তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। স্বর্গত মুখোপাধ্যায়ের স্নযোগ্য পুত্র শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কেএলএম-এর প্রকাশন বিভাগের শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ ও সুরেন্দ্রবিকাশ পাল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই; তাঁরা নানাভাবে আমার প্রভূত সাহায্য করেছেন।

ন. ম.

"The best of prophets of the future is past."

—Byron

সূচীপত্র

ভূমিকা ॥

সাত

অবতরণিকা ॥

১—৭

আকরগ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—বৈদিক সাহিত্য-২, ঋগ্বেদ-৩, সামবেদ-৩, যজুর্বেদ-৩, অথর্ববেদ-৪, ত্রাঙ্কণ-৪, আরণ্যক-উপনিষদ-৪, বেদাঙ্গ-৪, শ্রুত-৪, ছন্দ-৫, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ-৫, স্থানাক শ্রুত-৬, সমবায়াক-৬, সূর্য-প্রজ্ঞপ্তি-৬, চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি-৬, জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি-৬, গণিতবিদ্যা-৬, কর্ণশ্রুত, উত্তরাধায়ন শ্রুত-৬ ।

প্রথম অধ্যায় ॥

৮—১১

সিদ্ধু সভ্যতা ৮, মহেঞ্জো-দড়ো হব্ধায় প্রাপ্ত গুপ্তন, গণনা ও সংখ্যা ৯, পরিমাপ ১০, সংখ্যা ১১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১২—১৬

বৈদিক যুগের গণিত ১২, সংখ্যা ১২, প্রাথমিক চার নিয়ম ১৩, ভগ্নাংশ ১৪, প্রগতি ১৪, বৈদিক যুগের বীজগণিত ১৫, সমবায় ও বিন্যাস ১৫, সমস্যা ১৬, নিয়ম ১৬ ।

তৃতীয় অধ্যায় ॥

১৭—৩৬

শব্দশ্রুত ১৭, অগ্নির স্বরূপ ও বৈদিক পূজা অহুষ্ঠানের পরিচয় ১৭, শব্দ ও শব্দকার ১৯, বোধায়ন ১৯, কাত্যায়ন ২০, আপস্তম্ব ২০, মানব ২০, পূর্ব পশ্চিম রেখা নির্ণয় ২২, কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য ২২, প্রাচীন যজ্ঞবেদীর পরিচয় ও ইতিহাস ২৩, কয়েকটি যজ্ঞবেদীর জ্যামিতিক পরিচয় ২৬, পীথাগোরাসের পূর্বে ২৭, বৃত্তের বর্গরূপ ও π (পাই) এর মান ২৯, শব্দশ্রুতে একক ৩০, শব্দশ্রুতে গণিত ৩১, অমূলদরাশি ৩২, ক্ষেত্রফল ও আয়তন ৩৪, শব্দশ্রুতের ভাস্কর্যগণ ৩৪, বোধায়ন শব্দশ্রুত ৩৪, কাত্যায়ন শব্দশ্রুত ৩৫, আপস্তম্ব শব্দশ্রুত ৩৫, মানব শব্দশ্রুত ৩৬ ।

চতুর্থ অধ্যায় ॥

৩৭—৪১

লেখন ও প্রাচীন সংখ্যা ৩৭, প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা ৩৮, ব্রাহ্মীলিপির ভারতীয় উৎস ৩৮, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপিতে সংখ্যা ৩৯ ।

পঞ্চম অধ্যায় ॥

৪২—৫০

জৈন গণিত ৪২, সংখ্যাতত্ত্ব ৪২, গণিতের বিষয়বস্তু ৪৩, পরিকর্ম—প্রাথমিক চার নিয়ম ৪৫, কলাসবর্ণ—ভগ্নাংশ ৪৫, রজ্জু—জ্যামিতি ৪৫, π এর আসন্ন মান ৪৬, জম্বুদ্বীপ বা পৃথিবী বিষয়ে ধারণা ৪৬, সূচক ৪৭, বিকল্প, সমবায় ও বিন্যাস ৪৭, দুজন অগণিতজ্ঞ জৈন আচার্যের জীবনী ৪৯, ভদ্রবাহু ৪৯, উমাস্বামী ৫০

ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

৫১—৬০

বকশালী পাণ্ডুলিপি ৫১, সঙ্কলন গ্রন্থ ৫৩, অজ্ঞাত রাশির সঙ্কেত ৫৩, ঋণাত্মক চিহ্ন ৫৪, বকশালী পাণ্ডুলিপির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ৫৫, ভগ্নাংশ ৫৬, কয়েকটি অঙ্কের উদাহরণ ৫৭, অপেক্ষাকৃত নিয়ম (Regula Falsi) ৫৯

সপ্তম অধ্যায় ॥

৬১—৭৪

আর্ঘভট ৬১, আর্ঘভট সমস্যা ৬৩, আর্ঘভটীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৬৪, π এর মান ৬৬, বর্গমূল ও ঘনমূল ৬৭, প্রগতি ৬৯, সাইন এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ৭১, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ৭৩, কয়েকটি জ্যামিতিক সূত্র ৭৩, আচার্য আর্ঘভট ৭৪

অষ্টম অধ্যায় ॥

৭৫—৭৮

বরাহমিহির ৭৫, প্রথম ভাস্কর ৭৭

নবম অধ্যায় ॥

৭৯—৯৭

ব্রহ্মগুপ্ত ৭৯, ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৮০, ব্রহ্মগুপ্তের অবদান ৮১, দ্বিঘাত সমীকরণ ৮১, দু' একটি সূত্র ৮২, শ্রেণী ৮৩,

[পনের]

প্রাচীন উৎস ও ঐতিহাসিক উপাদান ৮৫, জ্যামিতি ৮৬,
একটি সম্পাদিত ৮৮, চতুর্ভুজ ৮৯, ট্রাপিজিয়াম ৯২, এক নতুন
তত্ত্বের দিশারী ৯৩, বিজ্ঞান সর্বত্র পূজ্যতে ৯৪, সংযোজন ৯৪,
বরফটি ৯৪, হরিদন্ত ৯৫, শ্রীধরাচার্য ৯৫, গোবিন্দ স্বামিন ৯৭,
শঙ্কর নারায়ণ ৯৭

দশম অধ্যায় ॥

৯৮—১১২

মহাবীরাচার্য ৯৮, গণিত-সার-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৯৯,
আচার্য মহাবীরের অবদান ৯৯, পাটীগণিত ১০০, মালা গুণন
১০২, একক ভগ্নাংশ ১০২, কয়েকটি সূত্র ১০৪, জ্যামিতি ১০৬,
সংযোজন ১০৯, দ্বিতীয় অর্থভট ১১০, ত্রিগুণ ১১১

একাদশ অধ্যায় ॥

১১৩—১৩১

ভাস্করাচার্য ১১৩, লীলাবতী উপকাহিনী ১১৪, লীলাবতীর
বিষয়বস্তু ১১৬, বীজগণিতের বিভাগ ১১৬, সমবায় ও বিন্যাস
১১৭, ভাস্করীয় গণিতে শূন্য ১১৭, কবণী ১১৮, কয়েকটি
উদাহরণ ১১৯, সূত্র নির্ণয় ১২০, সময় নির্ণয় ১২১, পরিমিতি
১২৩, জ্যামিতি ১২৪, ত্রিভুজ ১২৪, ট্রাপিজিয়াম ১২৫, বৃত্ত
১২৬, ত্রিকোণমিতি ১২৬, কলন ১২৭, সিদ্ধান্ত শিরোমণির
জনপ্রিয়তা ১২৮, সংযোজন ১২৮, নারায়ণ পণ্ডিত ১২৮,
শূন্য ১২৯

দ্বাদশ অধ্যায় ॥

১৩২—১৫১

ভাষ্যকার পরিচয় ১৩২, পৃথুদকস্বামী ১৩৩, পরমেশ্বর ১৩৪,
নীলকণ্ঠ সোমরাজী ১৩৪, কয়েকটি পরিবারের কথা ১৩৬,
সোমসাই জয়সিং ১৩৮, জয় সিং-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
১৩৯, জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান ১৪০, হর্লড তিনখানি গ্রন্থ
১৪৬, যুক্তিভাষা ১৪৭, করণপদ্ধতি ১৪৯, সদ্ব্যভাসমালা ১৫০

ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

১৫২—১৬১

দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতি ১৫২, সংখ্যা-শব্দ পদ্ধতি ১৫৫,
সংখ্যা-বর্ণ পদ্ধতি ১৫৭, কটপয়ধি পদ্ধতি ১৫৯, শূন্য ১৬০

চতুর্দশ অধ্যায় ॥

১৬২—১৭৬

পাটীগণিতের বিষয়বস্তু ১৬২, প্রাথমিক চার নিয়ম ১৬৩, যোগ
১৬৪, বিয়োগ ১৬৫, গুণন ১৬৬, ভাগ ১৭১, ভ্রাংশ ১৭৩

পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

১৭৭—১৮৭

বর্গ ১৭৭, বর্গমূল ১৮১, ঘন ও ঘনমূল ১৮৩, ত্রৈরাশিক ১৮৪

ষোড়শ অধ্যায় ॥

১৮৮—২১২

বীজগণিত ১৮৮, চিহ্ন ও সংকেত ১৯০, অজ্ঞাতরাশি ১৯১,
সহগ ১৯২, ঘাত ১৯৩, ধ্রুবক রাশি ১৯৩, চিহ্নের সূত্র ১৯৩,
বিয়োগ ১৯৪, গুণন ১৯৫, ভাগ ১৯৫, সমীকরণ ১৯৭,
সমীকরণ লেখন ১৯৮, একবর্ণ সমীকরণ ১৯৯, দুইটি অজ্ঞাত-
রাশি বিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ ২০৩, তিনটি অজ্ঞাতরাশি
বিশিষ্ট একঘাতসমীকরণ ২০৬, দ্বিঘাত সমীকরণ ২০৪, দ্বিঘাত
সমীকরণের দুটি বীজ ২০৭, একটি বিতর্ক ২০৮, শ্রেণী ২০৯

সপ্তদশ অধ্যায় ॥

২১৩—২২৪

কুট্টক ২১৩, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের শ্রেণীবিভাগ ২১৪,
আর্ধভট ও একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ২১৫, একঘাত
অনির্ণেয় সহ সমীকরণ ২১৯, বর্গ-প্রকৃতি ২২১, চক্রবাল ২২২,
দুটি ঐতিহাসিক অপলাপ ২২৩

অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

২২৫—২৩৭

শূন্য ২২৫, শূন্যের প্রাচীনতা ও দার্শনিক তাৎপর্য ২২৫ শূন্যের
গাণিতিক তাৎপর্য ২২৬, শূন্যের পাটীগাণিতিক তাৎপর্য ২২৭,
শূন্যের বীজগাণিতিক তাৎপর্য ২২৭, শূন্য ও ইণ্ডিসিন ২২৮,
শূন্য ও অনন্ত ২২৯, আধুনিক কবির ভাষায় শূন্য ২৩০, ভাষাতত্ত্ব
ও ভারতীয় গণিতের কাল ২৩১

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ

২৩৮

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২৪৬

নির্ধক

২৪৫

॥ অবতরণিকা ॥

“For out of olde felde, as men seith, cometh al this newe corn fro year to year ; And out of olde bokes, in good feith, cometh al this newe science that men lere.”

—Chaucer

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন প্রাচীন ভারতীয় ঋষি ও মনীষীরা নিত্য-নতুন আবিষ্কারে সারা বিশ্বের বিশ্বয় উৎপাদন করেছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এমন অনির্বচনীয় মৌলিকতা বোধ হয় আর কোন দেশের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন সভ্য দেশ সমূহে,—মিশর, ব্যাবিলন, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি সূক্ষ্ম ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় এই স্বাভাবিক ধারাটি যেন কোন বাধামুক্তবলে হঠাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এই স্বাভাবিকত্বের প্রধান কারণ বোধ হয় এই দেশের মাটিতে অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মুনি, ঋষি ও মনীষীদের আবির্ভাব। তাই তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি-স্বরূপ আজও আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ বেদ-কে শ্রীভগবানের রচনা বলে মনে করি। নিঃসন্দেহে অলৌকিক প্রতিভা ভগবানের ঐশ্বর্য-স্বরূপ।

শিক্ষিত মহলে দ্বিমত নাই, ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন ইতিহাস আমাদের বিন্মিত করে,—বিমূঢ় করে। আমরা হতবাক হয়ে সেই সব ভগবৎ ঐশ্বর্যের অধিকারী মুনি-ঋষিদের গবেষণা ও আবিষ্কারের অবলম্বন ধারাটি অনুসরণ করতে না পেয়ে অনেক সময় অর্থহীন মন্তব্য করি। আজও দেশে প্রতিভার অভাব নাই, আজও গবেষণা ও আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব যে ঐতিহাসিক ধারাটি অবলম্বন, তার পুনরুজ্জীবনে আমরা সচেষ্ট নই। ফলে, আমাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্বের স্বার্থ মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি।

সর্বজন স্বীকৃত, কেবলমাত্র অহুঙ্করণের দ্বারা কোন জাতি বড় হয় না,—চাই স্বীকরণ। স্বীকরণ অনায়াসসাধ্য হয়ে ওঠে যখন তা নিজস্ব ধারাটি প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেবল অহুঙ্করণের আয়োজন। তাই, সর্বস্তরে আমরা শিক্ষার কল থেকে বঞ্চিত। আমরা সবাই “তোতা কাহিনীর”

তোতাপাণ্ডি। শেখানো বুলি, মুখস্থ বিত্তে ছাড়া আর আমাদের কি আছে ! আমাদের নিজস্ব বলে কিছু নাই,—জ্ঞান ও বিচার সর্বক্ষেত্রে। অথচ আমরা এক বিশাল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই আলোকবর্তিকা থেকে আমরা নিভূর্ণ পথের নিশানা পেতে পারি, চলার পথের গতি স্বরাশ্রিত করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই আমাদের অতীত গৌরবের প্রায় কিছুই জানি না। ঘেটুবু জানি তা হচ্ছে গুটি কয়েক নাম। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিতের কাছে তো প্রাচীন ভারতের সব কিছুই অচল, মৃত। শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের কথা ভাবি, কিন্তু জাতির স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবি না,— আমাদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবি না।

বিশ্বগণিতের ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচার করলে প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাস এক গরম বিষয়। এই ইতিহাসে সন-তারিখ নাই, নাই কোন ব্যক্তি-পরিচয়, আর নাই গণিতের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির অন্তর্বালের কাহিনী। হায়, কোপীনধারী ভারতীয় মুনি ঋষিগণ ! তোমরা পার্থিব খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে কেন উদাসীন ছিলে ? সন-তারিখ দিয়ে লেখার প্রচলন ছিল না। 326-27 খ্রিঃ পূঃ পরবর্তী রচনায় কিছু কিছু সন-তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার পূর্বের রচনার সময় নির্ণয় দুঃসাধ্য।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের প্রকৃত মূল্যায়ন করে ইতিহাস রচনা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, প্রাচীন ভারতের গাণিতিক উপাদান এই দেশের বিভিন্ন ধর্মের বিশাল শাস্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষার পথ অতিক্রম করে অধ্যয়ন করা যে কি কঠিন, তা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝবেন। সার্থক ও সফল গণিতের ইতিহাস রচনা একমাত্র তখনই সম্ভব যদি বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র ও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অম্লবাদ ও সম্পাদনা করেন।

॥ আকর গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

(বৈদিক সাহিত্য)

বিষয়বস্তু ও রচনাকালের ভিত্তিতে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদ। এই বিভাগ সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এমন কি বিভিন্ন বিভাগে একই তথ্যের

পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। ‘সংহিতা’ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হলেও কোন কোন ‘ব্রাহ্মণ’ কোন কোন সংহিতার পূর্ববর্তী। তেমনি কোন কোন আরণ্যক-উপনিষদ আবার কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পূর্ববর্তী।

ঋগ্বেদ সংহিতা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সংহিতার রচনাকাল নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক আছে। ম্যাক্সমুলার 1500 খ্রীঃ পূঃ এর রচনাকাল বলেছেন, আবার ভিনটারনিজ (Winternitz) 2000—2500 খ্রীঃ পূঃ এই সংহিতার রচনাকাল বলে মনে করেন। তিলক ও জ্যাকোবি ঋগ্বেদ সংহিতাকে আরো প্রাচীন বলে মনে করেন। বর্তমানে অনেকেই ভিনটারনিজের সময়কাল নির্ণয়েই বেশী আস্থা স্থাপন করেন। প্রমাণের অভাবে তা-ই আমাদের মনে নিতে হবে।

অধ্যেয়

ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। পণ্ডিতরা বলেন ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডল বিভিন্ন সময়ে রচিত। এই গ্রন্থে পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানা বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বের তিনটি বিভাগ, সূর্য, চন্দ্র,—এদের গতি, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, দিন, মাস ও বৎসরের সময়ের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন যজ্ঞবেদী ও সংখ্যার উল্লেখ থেকে গণিতের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

সামবেদ

এই সংহিতার তেমন গাণিতিক বৈশিষ্ট্য নাই। তবে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

যজুর্বেদ

এই সংহিতার দুটি বিভাগ—কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদে গতে তাত্ত্বিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদের বিষয়বস্তুর আলোচনায় একটি শৃঙ্খলার ভাব আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদ দক্ষিণ ভারতে, কাশ্মীর, গুজরাট ও পাকিস্তানে অধিক প্রচলিত ছিল। শুক্ল যজুর্বেদ উত্তর ও পূর্বভারতে প্রচলিত ছিল।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সংহিতার গুরুত্ব অনেকখানি। প্রাচীন ভারতে গণিত পৃথক বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়নি। গণিত ছিল জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অঙ্গ। ফলে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় গণিতের বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায় : দশের গুণিতকে বড় বড় সংখ্যার নাম, যোগ,

বিয়োগ, গুণ, ভগ্নাংশ ও প্রগতির বিষয় ঋগ্বেদে উল্লিখিত হলেও এখানে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

অধর্ববেদ

জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনা এই সংহিতায় না থাকলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সংহিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

ত্রাক্ষণ

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে ত্রাক্ষণ অংশ। এই অংশে পূজার্না, ও নানা বৈদিক অস্থষ্ঠানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন সংহিতার ত্রাক্ষণ অংশের বিস্তৃত আলোচনা থেকে জ্যোতিষ ও গণিতের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। গণিতের ইতিহাসে বৈদিক সাহিত্যের এই অংশের অবদান অপরিসীম।

আরণ্যক-উপনিষদ

বৈদিক সাহিত্য বিভাগের এই অংশের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনা আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু জ্যোতিষ ও গণিত বিষয়ে এখানে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা নাই। যেটুকু আছে, তা পূর্ববর্তী সংহিতার অঙ্করূপ।

বেদাঙ্গ

বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অঙ্গ। বিভিন্ন বেদ অধ্যয়নের জন্য বেদাঙ্গের জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। বেদাঙ্গে আছে বিশেষ জ্ঞানের আলোচনা। বেদাঙ্গ ছ'প্রকার—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃন্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। বেদাঙ্গে গণিত, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্য ছড়িয়ে আছে।

সূত্র

কালক্রমে বিপ্লবায়তন বেদ ও বেদাঙ্গ পড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সূত্রাকারে সব কিছু লেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সূত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : স্বরাক্ষরমঙ্গলিঙ্গ সারবদ্ বিবর্তোমৃৎ। অস্তোতম্ অনবত্ত চ সূত্রং সূত্রবিদোবিস্কুঃ ॥ অর্থাৎ “স্বরাক্ষর, সারবান, সর্বত্র প্রযোজ্য, অদলিষ্ঠার্থ, সূত্রাকারে গ্রথিত স্বন্দর গুণ রচনাকে সূত্র বলা হয়।” সূত্রগুলির সূক্ষ্মতা ও সংক্ষিপ্ততা বিষয়ে ভিনটাবনিজ বলেন, “There is probably nothing like these sūtras of the Indians in the entire literature of the world.” সীমিত শব্দের

প্রয়োগে সূত্রগ্রন্থগুলি প্রায় দুর্বোধ্য। ভাষা ব্যতিরেকে এদের মর্মার্থ গ্রহণ অসম্ভব বললেই চলে। তাই, বিভিন্ন সূত্রের অনেক ভাষা রচিত হয়েছে। পতঞ্জলি, বাৎস্যায়ন, শঙ্কর প্রভৃতি স্নানমধস্ত ভাষ্যকার।

পূজাপদ্ধতি ও নানা অঙ্কষ্ঠানের বিধি-নিয়ম কল্পসূত্রে আলোচিত হয়েছে। শুবসূত্র কল্পসূত্রের অন্তর্গত। শুবসূত্র সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে ছন্দের গুরুত্ব অনেকখানি। বিশেষ করে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পিঙ্গলের ছন্দসূত্র গ্রন্থটি। কারণ, এখানেই আমরা প্রথম শূত্রের (0) ব্যবহার দেখতে পাই। এমন কি ভারতীয় গাণিতিকদের সমবায় ও বিভাগ ও দ্বিগুণ উপপাত্তের ধারণা এই গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈনদের অবদান কম নয়। সন-তারিখ সম্বন্ধে ষতটুকু ধারণা করা যায়, তা এই সব ধর্মীয় শাস্ত্রের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে।

ধর্মীয় দিক থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হয়ে পালি ভাষায় এক বিশাল ধর্মীয় গ্রন্থরাজি সৃষ্টি করেছিল। তখনকার আচার-অঙ্কষ্ঠান-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠিন নাগপাশ থেকে মাহাত্ম্যের মুক্তিসাধনের এক নতুন পথের আবিষ্কার করে এই ধর্ম বহির্ভারতে প্রসারলাভ করলেও জ্যোতিষ, গণিত ও বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে এই ধর্মের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অবদান নাই। তা বলে বৌদ্ধরা এই বিষয়গুলি চর্চা করেননি এমন নয়। প্রধানত ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিষ ও গণিতের চর্চার মধ্যেই তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। গণিত অধ্যয়ন এই ধর্মে স্বীকৃত হলেও জৈনদের মত গণিতে বৌদ্ধদের তেমন কোন অবদান নাই। বিশাল বিশাল সংখ্যার নামকরণ ও ব্যবহার বৌদ্ধদের গণিত-চর্চার একটি দৃষ্টান্ত। যথাস্থানে আমরা ছ'একটি বৌদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ করব।

জৈনদের ধর্মশাস্ত্র 'আগম' বা 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। এই আগম গ্রন্থসমূহে জৈনধর্মের তত্ত্ব, ব্যাখ্যা, জিনচরিত ও মহাবীর বর্ষমানের প্রবচনসমূহ আলোচিত হয়েছে। আগম গ্রন্থের মোট সংখ্যা ৪৫, কারো কারো মতে ৪৪। এই

৪৫ ধানি বা ৪৪ ধানি গ্রহ অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছন্দ-সূত্র ও মূল-সূত্রে বিভক্ত।
নিম্নে গণিত ও জ্যোতিষ সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থের নামসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয়
দেওয়া হলো।

স্থানাঙ্গ সূত্র (ঠান্যাংগ) : এই গ্রন্থে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার নানাবিধ
তথ্যের আলোচনা আছে। স্থানাঙ্গ সূত্রের গাণিতিক মূল্য অপরিমিত।

সমবায়াদ (সমবায়ংগ) : স্থানাঙ্গ সূত্রে যে সংখ্যাগত দিকের আলোচনা
আছে তার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এটিকে স্থানাঙ্গ সূত্রের
ভাষাক্রমে গণ্য করা যেতে পারে।

সূর্য-প্রজ্ঞপ্তি (সূর-পন্নতি) : এই গ্রন্থটি জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান
সম্বন্ধীয়। দ্বাদশ রাশি, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের বিবরণ থেকে জৈনদের জ্যোতির্বিজ্ঞান
সহজে ধারণার কথা জানতে পারা যায়।

চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি (চন্দ-পন্নতি) : এই গ্রন্থটি সূর্য-প্রজ্ঞপ্তির ন্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞান
বিষয়ক গ্রন্থ।

জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি (জম্বুদ্বীপ-পন্নতি) : এই গ্রন্থটি প্রধানত ভূগোল বিষয়ক।
তা হলেও এখানে নানা গাণিতিক সূত্রের সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

গণিত-বিজ্ঞা (গণি বিজ্ঞা) : জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনার গণিত
অপরিহার্য। তাই এই গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গণিতের আলোচনা
আছে।

কল্প সূত্র ও উত্তরাধ্যায়ন সূত্র : প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থদ্বয় গণিত বিষয়ক নয়।
তবুও এখানে ভদ্রবাহু নানা গণিত-তথ্যের উল্লেখ করেছেন। 'জৈনগণিত' অধ্যায়ে
আমরা ভদ্রবাহু সম্পর্কে আলোচনা করব।

জৈনধর্মে গণিতের অহুশীলন ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য করা হতো। সর্বশেষ
তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান ও বাইশতম তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির শিকণীয় বিষয়ের
তালিকা থেকে জানতে পারা যায় খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ও তারও পূর্ববর্তী সময়ে
জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও ষষ্ঠস্থানীয় নিষিদ্ধ (বৈদিক কোষগ্রন্থ), এদের
অঙ্গ উপাঙ্গ এবং রহস্ত, এদের সার, সংখ্যা-শাস্ত্র (গণিত), ষড়ঙ্গশাস্ত্র (শিক্ষা-
কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দ-নিরুক্ত-জ্যোতিষ), নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করে সর্ববিষয়ে

বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব তাঁর রাজস্বকালে প্রজাদের হিতার্থে বাহাস্তব কলা, চৌষটি মহিলা-স্তম্ভ, শতপ্রকার শিল্প ও তিন প্রকার কর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ওই বাহাস্তব কলার প্রথমটি লেখা, প্রধানটি গণিত এবং সর্বশেষটি শকুনের ভাবার অর্থ-নির্ণয়। ঋষভদেবের সময়কাল নির্ণয় করা এক অসম্ভব ব্যাপার। পরপর দু'জন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব শত বৎসর করে ধরলেও ঋষভদেবের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ 3000 বৎসর হয়। তাহলে কি তিনি মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পার যুগের নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন? বাই হোক,—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকে গণিত-চর্চা চলে আসছে।

প্রথম অধ্যায়

“The history of mathematics is one of the large windows through which the philosophic eye looks into past ages and traces the line of intellectual development.

—F. Cajori

॥ সিন্ধু সভ্যতা ॥

ভারতীয় ইতিহাসে সিন্ধু-সভ্যতা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের। এই সভ্যতার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, কেবল কিছুটা ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইতিহাস রচনার মশলার অভাব বেশী নাই। অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়নি। এখানকার শীলমোহর থেকে যদি কোনদিন লিপি পাঠ সম্ভব হয়, তা হলে হয়তো ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস আমরা জানতে পারব। আর মনে হয় তখন অনেক গবেষণা নিব্বর্থক হয়ে উঠবে। তখনই কেবল বেদ-বেদান্তের ক্রমবিকাশের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবুও সিন্ধু-নদের তীরে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এক সুসভ্য জাতি বাস করতো। আধুনিক সভ্যতার নগর-জীবন তাদের অনভ্য ছিল না। 180 ফুট দীর্ঘ 100 ফুট বিস্তৃত বিরাট স্নানাগারের মধ্য ভাগের প্রান্তরে 39 ফুট দীর্ঘ, 23 ফুট বিস্তৃত ও 8 ফুট গভীর সম্ভবগণাপীঠে যে রাজা বা সর্দার অথবা দোঁড় প্রতাপ কোন পুরোহিত সখী বা দেবদাসীসহ জলক্রীড়া করত না কে বলতে পারে? এখানকার কূপের ধারে ক্ষয়ে যাওয়া ইটের চিহ্ন দেখে কোন স্বপ্নবিলাসী কবি যদি অপরাহ্ন বেলায় নানা ভূষণে সজ্জিত সিন্ধু ললনাদের কলহাস্ত মুখরিত একটি অধ্যায়ের গীতিকাব্য রচনা করেন, তা হলে খুব দোষের হবে না। নগরের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন পল্লীর নরনারীর প্রেমের উপাখ্যান শিলাস্তরের কোথায় লুকিয়ে আছে, আজ তার সব সম্ভান মিলবে না। রক্ত মাংসের চিহ্ন আজ আর নাই, আছে কেবল কঙ্কাল আর ভগ্নত্বা। আমরা এর মধ্য থেকেই কিছু সম্ভান করার আয়োজন করছি।

নগর পরিকল্পনা, অট্টালিকা ও গৃহনির্মাণে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সিন্ধু-তীরবাসী কোন ইঞ্জিনিয়ার গ্রহণ করেছিলেন, আজ তার কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই।

যে বিশাল শস্তগারে শাসনকর্তার রাজত্ব জমা হতো তার ওজন-পদ্ধতির কোন লিখিত রূপ আমাদের জানা নাই। সত্যতা ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন কালের কবাল গ্রাণ অতিক্রম করে আমাদের নয়নগোচর হয়েছে বটে, আজও কিন্তু সবই আত্মমানিক, কাল্পনিক। দেহজন্মেই বলছিলাম এই সত্যতার প্রকৃত ইতিহাস আজও রচিত হয়নি।

॥ মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পার প্রাপ্ত ওজন, গণনা ও সংখ্যা ॥


বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও গৃহ-নির্মাণে যারা নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, তাঁরা যে পরিমাপ ও গণনার নিপুণ ছিলেন, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত মন্তব্য করা যায়। কারণ, গণিত-বিজ্ঞান প্রাথমিক নিয়মগুলি ব্যতিরেকে এত বড় সত্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, এ-কথা ভাবা যায় না। চিত্র-সম্বলিত অসংখ্য শীলমোহর ও বিভিন্ন ওজনের পাথরের বাটখারার মধ্যেই এ-সবের প্রমাণ আছে।

শীলমোহরের পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিকরা মনে করেন বহির্বাণিজ্যে এই শীলমোহর ব্যবহৃত হতো এবং বস্তুর নাম ও ওজন লিপিবদ্ধ করা আছে। ওজন পাথরগুলি সাধারণত চকমকি পাথরের তৈরী, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় প্রায় সমান অর্থাৎ ঘনকাকৃতি। বড় বড় পাথরগুলি মন্দিরাকৃতি, দড়ি দিয়ে ঝুলোবার জন্তে এতে ছিদ্রও থাকত। মি. হেমির মতে এই ওজন-গুলি এলাম ও মেসোপটেমিয়ার ওজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নির্ভুল। এই সব ওজন-পাথরের পরিমাপ পরীক্ষা করলে দেখা যায় সুসার ওজনের মত প্রথমত দ্বিগুণিত 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ; কিন্তু তারপর দশগুণোত্তর, 110, 200, 320, 640, 1600 প্রভৃতি। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার খনন করে 13.71 গ্রাম ওজনের বহু পাথর পাওয়া গেছে। সুতরাং মনে হয়, সিদ্ধবাসীরা 13.71 গ্রামকেই ওজনের একক হিসাবে ব্যবহার করত। কয়েকটি ধাতব তুলাদণ্ডের আবিষ্কার থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে ওজন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। মনে করা হয়, এ-সব তুলাদণ্ডের ছোট্ট হালকা ধরনের কোন কিছু মূল্যবান সামগ্রী ওজন করা হতো। যেমন আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিক্তি ও ব্যালেন্স ব্যবহার করি। ওজন বাটখারার একক ভগ্নাংশ ছিল বলে, মনে হয় সেই অতি প্রাচীন ভারতীয়রা ভগ্নাংশের ব্যবহার জানত।

মহেঞ্জো-দড়োর পরিকল্পনা, স্থাপত্য ও পূর্ত-বহু বিস্ময়ের বস্তু। এই নগরীর

ইমারৎ নির্মাণে যেন বর্তমানের ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ধ্বংসস্থূপের মধ্যে $10\frac{1}{2}''$ বা $11'' \times 2\frac{1}{2}''$ মাপের ইট দেখতে পাওয়া যায়। স্থান ও কার্যবিশেষে কখনো কখনো কাঁচা ও পোড়া ইটের মাপ $10\frac{1}{2}'' \times 5'' \times 2\frac{1}{2}''$ থেকে $20\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ পর্যন্ত দেখা যায়। কাশ্মপ-সংহিতায় $10\frac{1}{2}$ বা $11 \times 5\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ অঙ্গুলি মাপের ইটের সঙ্গে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

পরিমাপ : এই মৃত-স্থূপের মধ্য থেকে দু'ধরণের স্কেল আবিষ্কৃত হয়েছে। এক প্রকার শঙ্খের তৈরী বর্তমান ফুটের মত।



চিত্র—১ (সিদ্ধু-সভ্যতা যুগের ব্যবহৃত স্কেল)


ভাঙ্গা এই স্কেলটি দৈর্ঘ্যে ৬.৬২ সেমি এবং প্রস্থে ০.৬ সেমি। এতে স্থানান্তরিত দিয়ে ন'টি সমান্তরাল দাগ কাটা আছে। এই দাগের একটিতে বৃত্ত ও ষষ্ঠ দাগে একটি বিন্দু চিহ্নিত আছে। বিন্দু ও বৃত্তের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ১.৩২ ইঞ্চি। আর পরপর দুটি দাগের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ০.২৬৪ ইঞ্চি। ১.৩২ ইঞ্চিকে সিদ্ধু-ইঞ্চি ধরিলে এই পরিমাপ ২ হুমেরীয় শুণির সমান। এই স্কেলের সঙ্গে সম্রাট আকবরের সময় উত্তর ভারতে গজের এক বিস্ময়কর মিল দেখতে পাওয়া যায়। আকবরের সময় উত্তর ভারতে ৩৩ ইঞ্চিতে এক গজ ব্যবহৃত হতো। আর তা ২৫ সিদ্ধু-ইঞ্চির সমান।

আগেই বলা হয়েছে উপরোক্ত স্কেলটি ভগ্ন। ম্যাকে মনে করেন সমগ্র স্কেলটির পরিমাপ ১৩.২ ইঞ্চি। এই মাপের একক দশমিকে বিভক্ত ছিল বলে তিনি মনে করেন। ফুটের মত মাপ প্রাচীন মিশর ও এলামে প্রচলিত ছিল। সিদ্ধু-তীর্থবাসীরা মাপের উন্নততর পদ্ধতি, দশমিক পদ্ধতি ব্যবহারের জ্ঞান গর্ব করতে পারে।

তখন আর এক প্রকার মাপকাঠি প্রচলিত ছিল,—হাতের মত প্রায় ২০.৫ ইঞ্চি লম্বা। প্রাচীন সভ্যদেশ সমূহে প্রায় সর্বত্রই এই হাতের মাপ ব্যবহৃত হতো।

বৈদিকযুগের সময় থেকেই আমরা এই প্রকার মাপের বহু প্রমাণ পাই। কে বলতে পারে ভারতে এই মাপ হয় তো সিদ্ধ-সত্যতারই অঙ্গবর্তন !

সংখ্যা : মি. বোস সিদ্ধ-শীলমোহরে প্রাপ্ত সংখ্যা বিষয়ে আলোচনা করে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এক 12 এই কয়েকটি সংখ্যা নির্দেশক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। সিদ্ধবাসীরা উল্লম্ব রেখার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করত। উল্লম্ব রেখাগুলি পাশাপাশি লেখা হতো, আবার দলগত ভাবেও লেখা হতো। এই ধরনের সংখ্যা বহু প্রাচীন সভ্য দেশে দেখতে পাওয়া যায়।



চিত্র—২ (সিদ্ধ-সত্যতা যুগের সংখ্যা)

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সিদ্ধ-সংখ্যার সঙ্গে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী সংখ্যার কিছু কিছু মিল আছে। শুধু সংখ্যা নয়, শীলমোহরের কিছু কিছু লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মী-লিপির সাদৃশ্যও আছে।

মহেঞ্জো-দাড়োর আদি-স্তরের খনন সম্ভব হলে, হয়তো ভারতের এই পূর্বের ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে। হয়তো তখন শীলমোহরের লিপি-পাঠ সম্ভব হবে,—অনেকের মত গণিতের ইতিহাসও নতুন করে লিখতে হবে।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

“This long period of nearly five thousand years show the rise and fall of many a civilization, each leaving behind it a heritage of literature, art, philosophy, and religion. But what was the net achievement in the field of reckoning, the earliest art practiced by man?”

—Dantiz.

॥ বৈদিক যুগের গণিত ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের আলোচনায় সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবতরণিকায় সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থরাজিতে ছড়ানো গাণিতিক উপাদানসমূহ বৈদিক যুগে ভারতীয়দের গাণিতিক নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কল্পসূত্রের অন্তর্গত শুবসূত্রে ও জ্যোতিষে গাণিতিক উপাদানের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। শুবসূত্র বৈদিক যুগে রচিত হলেও পৃথকভাবে আমরা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করব। বৈদিক যুগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়নে গণিতের একটি বিশেষ স্থান ছিল। সনৎকুমারের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে নারদ তাঁর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রগুলির যে বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ স্থান পেয়েছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে গণনা বা রাশি-বিজ্ঞানে ময়ূরের মাথায় শিখা এবং সাপের মাথার মণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে গণিতের সারবত্তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

সংখ্যা : বৈদিক যুগে সংখ্যা-লিখনে দশগুণোত্তর পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার নামকরণে প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে ভারতীয়গণ অগ্রগণ্য। গ্রীকরা মিরিয়াড (10⁴) পর্যন্ত নামকরণ করেছিল। যজুর্বেদ সংহিতায় 10¹² পর্যন্ত সংখ্যার নামকরণ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক (1), দশ (10), শত (10²), সহস্র (10³), অযুত (10⁴), নিযুত (10⁵), প্রযুত (10⁶), অবুদ (10⁷), তুবুদ (10⁸), সমুদ্র (10⁹), মধ্য (10¹⁰), অভ্য (10¹¹) এবং পরার্থ (10¹²) সংখ্যার নাম পাওয়া যায়। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও একইভাবে নামকরণ দেখা যায়, তবে সেখানে পরার্থের পরও বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার নামকরণ আছে। বিশ্বগণিতের ইতিহাসে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার এই নামকরণ অনন্ত। আর এটাই হচ্ছে ভারতীয়দের একটি বৈশিষ্ট্য।

কেবলমাত্র বৈদিক যুগেই যে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা দেখা যায়, তা নয়। বৌদ্ধ ও জৈন গাণিতিকরাও বিরাট বিরাট সংখ্যার কল্পনা করে নামকরণ করেছেন। বৌদ্ধরা দশগুণোত্তর পদ্ধতির পরিবর্তে শতোত্তর পদ্ধতি অবলম্বন করে 10^{50} সংখ্যাটির নাম দেয় “তল্লক্ষণ”। শীর্ষ-প্রাহেলিকা অবলম্বন করে জৈনরাও আরো বিশাল সংখ্যাগঠন ও নামকরণ করে।

সংখ্যার নামকরণে বৈদিক গাণিতিকরা তিন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করে। বিজ্ঞান-সম্মত এই পদ্ধতিই আমাদের বিশ্বয় উদ্রেক করে। প্রথমত প্রথম ন’টি অঙ্কের নাম,—এক, দ্বি, ত্রি, চতুর্, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, এবং নব। দ্বিতীয়ত আর ন’টি সংখ্যা উপরের অঙ্কগুলিকে 10 দ্বারা গুণ করে দশ, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চতুর্বিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, এবং নবতি নামকরণ করা হয়েছে। তৃতীয়ত শত থেকে শুরু করে পর্বার্ধ পর্যন্ত এই এগারোটি সংখ্যা 10 দ্বারা গুণ করে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারে গুণের নিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে। যে-সব সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সংখ্যা দ্বারা গঠিত, সেখানে যোগের পদ্ধতি অমুসৃত হয়েছে। যেমন, দ্বাদশ = $10 + 2$ । যে-সব সংখ্যা গঠনে যোগ ও গুণ উভয় পদ্ধতি অমুসৃত হয়েছে, সেখানে তৃতীয় ও প্রথম অথবা দ্বিতীয় প্রকারের সংখ্যার মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন,—সপ্ত শতানি বিংশতি = $720 = 7 \times 100 + 20$ । বিয়োগ-নিয়মও সংখ্যার নামকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। শুভযত্নে এর উদাহরণ আছে। যেমন, একান্ন-শত বলতে তখন একশ’ অপেক্ষা ‘এক’ কম বোঝানো হতো। একান্ন-শত = $100 - 1 = 99$ । ভাষার ক্রমবিকাশের পক্ষে ‘একান্ন’-ই পরবর্তীকালে ‘একোন’ হয়ে ‘উন’-তে পরিণত হয়েছে। এখন ‘উন’ অর্থে আমরা ‘এক কম’ বুঝি। প্রাচীন ব্যাবিলন ও গ্রীসেও এই পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক চার নিয়ম : সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে প্রাথমিক চার নিয়মের স্পষ্ট কোন আলোচনা নাই। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে গণিত-শিক্ষণে এ-সব নিয়ম এমনই অপরিহার্য যে তাঁরা এ-সব নিয়মের আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি। ঠিক একই কারণে প্রথম আর্ধভট ও ব্রহ্মগুপ্তও এ-সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। দশম শতকে দ্বিতীয় আর্ধভটের সময় যোগ ও বিয়োগের আলোচনা দেখা যায়। ‘গুণ’ শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে আছে। তখন ‘গুণ’ শব্দের অর্থে ‘হনন’, ‘বধ’ ও ‘ক্ষয়’ বোঝানো হতো। ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণে এক হাজারকে তিন দ্বারা ভাগের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদেও স্পষ্ট কোন প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাই। শতপথ

ব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে ইন্দ্র ও বিষ্ণু কর্তৃক এক হাজার গাভীকে ভাগ করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি এক হাজারকে তিন ভায়া ভাগ করে, তা হলে সব সময় এক বেশী হবে অর্থাৎ ভাগশেষ থাকবে।

ভগ্নাংশ : প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে ভগ্নাংশের প্রচলন ছিল। মহেঞ্জো-দাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত ওজন ও পরিমাপের একক থেকেই তা প্রমাণিত হয়। বৈদিক সাহিত্যেও ভগ্নাংশের উল্লেখ আছে,—অর্ধ ($\frac{1}{2}$), ত্রিপাদ ($\frac{2}{3}$), পাদ ($\frac{1}{4}$), কলা ($\frac{1}{8}$) প্রভৃতি কয়েকটি উদাহরণ। শুবস্বত্রে-যুগের পর ভগ্নাংশ বলতে ‘অংশ’, ‘ভাগ’ বোঝানো হতো। কয়েকটি উদাহরণ :—ত্রিভাগ— $\frac{2}{3}$, পঞ্চম ভাগ, পঞ্চম— $\frac{1}{5}$; ষাটশ-ভাগ, ষাটশ— $\frac{1}{60}$; পঞ্চদশ-ভাগ— $\frac{1}{15}$; ত্রি-অষ্টম, ত্র্যষ্ট— $\frac{3}{8}$; দ্বি-সপ্তম— $\frac{2}{7}$; পঞ্চমস্ত চতুর্বিংশ— $\frac{1}{20}$ এর $\frac{1}{4}$ ।

ভগ্নাংশ প্রকাশের আরো একটি রীতি ছিল। যেমন,— $7\frac{1}{2}$ বলতে অর্ধাষ্টম, $1\frac{1}{2}$ বলতে অর্ধনবম, $\frac{1}{2}$ —দ্বিগুণ, $\frac{1}{3}$ —ত্রিগুণ প্রভৃতি। ‘অর্ধাষ্টম’ বলতে এখানে আট থেকে অর্ধ কম বোঝাচ্ছে। এই রীতি ভারতীয় গণিতে নতুন নয়।

প্রাথমিক চার নিয়ম সহ ভগ্নাংশের বর্গীকরণ শুবস্বত্রে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি $\frac{1}{2}$ বর্গ পুরুষ ইট দ্বারা $7\frac{1}{2}$ বর্গ পুরুষ স্থান আবৃত করতে মোট ইট লাগবে $7\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = 187\frac{1}{2}$ । শুবস্বত্রে এই প্রক্রিয়াটি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রগতি : প্রগতি ছিল প্রাচীন ভারতীয় গাণিতিকদের একটি অতি আকর্ষণীয় বিষয়। সংহিতার যুগেও প্রগতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নিম্নলিখিত সমান্তর শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায় :

1	3	5	19	29	39	99
2	4	6	20			
4	8	12	20			
5	10	15	100			
10	20	30	100			

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ‘দক্ষিণা’ দেবার একটি নিয়মের মধ্যে গুণোত্তর শ্রেণীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, এখানে শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের কোন নিয়ম দেওয়া হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণে এই নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন সাধারণ পদ্ধতির নিয়ম নাই। তবুও সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর উল্লেখও নিভুল সমষ্টি নির্ণয় থেকে মনে হয় বৈদিক গাণিতিকরা হয়তো কোন সাধারণ পদ্ধতি জানতেন। বৃহদ্দেবতায় সমষ্টি নির্ণয়ের এই অঙ্কটি আছে :

$$2+3+4+5+\dots\dots+1000=500499।$$

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পিত্রলের ছন্দস্থলে গুণোত্তর শ্রেণীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের ভারতীয় গাণিতিকরা পূর্ববর্তীদের মত সমান আগ্রহী ছিলেন এ-বিষয়ে। মহাবীর, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য ও নারায়ণ প্রভৃতি গাণিতিকরা শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র দিয়ে তাঁদের প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন।

বৈদিক যুগের বীজগণিত

সাধারণত বীজগণিতের উদ্ভব-কাল শুভযুগে স্থগীত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুগেও গণিতের এই শাখার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তখন এর জ্যামিতিক রূপটি ছিল গাণিতিকদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দু। প্রদত্ত একটি বাহু দ্বারা কোন বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিতে $ax=c^2$ এই সমীকরণের বীজ নির্ণয় করতে হতো। ‘মহাদেবী’ ও ‘জ্যেষ্ঠ-চিতি’ নির্মাণে যে সমীকরণের সাহায্য নিতে হতো তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসর পূর্বেও ভারতীয় গাণিতিকরা বীজগণিতের ধারণা ও তার নিয়মাবলী সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শুভসূত্রে দ্বিঘাত, অনির্ণেয় সমীকরণ, করণী, মূলদ ও অমূলদ রাশি ও আসন্ন মান নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। a ও b বাহুযুক্ত আয়তক্ষেত্রের করণ $\sqrt{a^2+b^2}$ । ডঃ টি. এ. সরস্বতী আশ্রা তাঁর *Geometry in Ancient and Medieval India* গ্রন্থে বলেছেন: “Here (as also in evaluating $\sqrt{a^2-b^2}$), the purpose of the Śulbasūtras is really more geometrical i. e. to combine two squares into an equivalent square....”

সমবায় ও বিভাগস: প্রগতির জ্ঞান সমবায় ও বিভাগও ছিল প্রাচীন ভারতীয় গাণিতিকদের একটি প্রিয় বিষয়। শুধু গাণিতিকরা নয়, অ-গাণিতিক ছান্দনিকরা আবার এ-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বৈদিক ছন্দ ও তার বৈশিষ্ট্য সংঘটনে এই বিষয়ের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রেই কেবল নয়, অল্প বিষয়ের সমস্তা সমাধানেও এই নিয়মের ব্যবহার হয়েছে। যেমন, ১৬টি বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর থেকে একসঙ্গে ১, ২, ৩ অথবা ৪টি করে বস্তু নিয়ে কত প্রকারের স্তম্ভ গঠিত করা যায়, তার সমাধানও করা হয়েছে। জ্ঞান ও সমস্তার নানান ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগ করে সমবায় ও বিভাগ তত্ত্বের বহুল প্রয়োগ ও নিভুল উদ্ভব-নির্ণয় থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয় গণিতের উৎকর্ষতা।

সমস্যা ও বিধানের আলোচনার ঐষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পিকলের হৃদয়শ্রেয় অবধান কৰ্য নয়। পিকল সংক্ষিপ্ত নিয়ম বর্ণনা করে সমস্যা সমাধান করেছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে তাঁর নিয়ম ও পদ্ধতির আলোচনা করা যাক।

সমস্যা :—পুনরাবৃত্তির সাহায্যে a -সংখ্যক বস্তুকে দুটি করে নিয়ে কত প্রকারে বিভাগ করা যায়? (এখানে দুটি বস্তু বলতে বোঝা ও দুই মাত্রার কথা বলা হয়েছে)

নিয়ম :—"যখন অর্ধ করা হবে তখন 2 বসাত, যখন 1 বিয়োগ করা হবে তখন শূন্য বসাত; শূন্যের বেলার 2 দ্বারা গুণ ও অর্ধের বেলার বর্গ কর।"

6 মাত্রার পারসী হৃদয়ের ক্ষেত্রে বিভাগ-নিয়ম প্রয়োগ করে পিকলের নিয়মটি আলোচিত হচ্ছে।

	A	B
1. সংখ্যাটি বসাত (এখানে হৃদয়ের সংখ্যা)	6	\times
2. অর্ধ কর	3	2
3. 3 অশূন্য, অতএব 1 বিয়োগ কর	2	0
4. অর্ধ কর	1	2
5. 1 অশূন্য অতএব 1 বিয়োগ কর	0	0

B-স্তম্ভের সংখ্যাগুলি পিকলকৃত নিয়ম দ্বারা পাই। প্রকৃত গণনা B স্তম্ভ থেকে শুরু হয়। শূন্যের বেলার 2 দ্বারা গুণ করে 2 পাওয়া যায়; অর্ধের বেলার বর্গ; অতএব 2-এর বর্গ— 2^2 । আবার শূন্যের বেলার বিয়োগ করলে $2 \times 2^2 = 2^3$ পাওয়া যায়। অর্ধের বেলার বর্গ হবে; অতএব $(2^2)^2 = 2^4$ । এটাই সমস্যার নির্ণয়ের উত্তর।

কেবল বিভাগ নয়, পিকলের গ্রন্থে সমস্যাগুলির আলোচনাও আছে। ভারতীয় গণিতে সমস্যাগুলির নাম "সেক-প্রশ্ন"। দশম শতকে হুনাফু এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। সপ্তদশ শতকে পাসকাল এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এখন তা "পাসকলের ত্রিভুজ" নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতীয় গাণিতিকরা কমপক্ষে ঐষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাসকালের প্রায় 2000 বৎসর পূর্বে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

"Let no one who is unacquainted with geometry enter here."—Plato

ভাষ্য

প্রাচীন কালে বিজ্ঞানানুশীলন ধর্মীয় আচার-অচ্যুতানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হতো। ফলতঃ ধর্মীয় আচার অচ্যুতান ও উৎসর্গান্ত্রে পণ্ডিতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ শুদ্ধভাবে ও 'বিজ্ঞানসম্মত' উপায়ে সম্পন্ন করতে হলে গ্রহ-উপগ্রহের বিশেষ সময়ে অবস্থান, পৃথিবী, সূর্যমণ্ডল, পৃথিবীগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতিতে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রধান ভাবে আলোচিত হলেও এই বিজ্ঞান-চর্চা প্রধান হাতিয়ার হিসাবে পরিণত ও অচ্যুতানিত হতো। এইভাবেই আমবা পটীগণিত, বাজপণিত, ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতি চর্চা ইতিহাস জানতে পারি।

ভারতীয় মুখ্যত ধর্মগ্রন্থে যেন। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এক কথায় বলতে গেলে, ধর্মই ছিল ভারতীয় সমাজ-জীবন, রাজনৈতিক-জীবন ও সাংস্কৃতিক-জীবনের মূল ভিত্তি। ভারতীয় সাহিত্য ও চর্চায় যেমন ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এ-মেলের বিজ্ঞান-চেষ্টার মূলেও ধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সে-কারণে বোধি নির্মাণ থেকেই এতেনের জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল। শুধু মূর্তি নির্মিত প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতির পরিচয় দেওয়ার আগে বৈদিক পূজা অচ্যুতানের বিধি ও রীতি নিয়ে কতক আলোচনার প্রয়োজন। তাহলে আমরা ভারতীয় জ্যামিতির উদ্ভব ও ভবিষ্যতের ধারণা অল্পসংগে করতে পারব।

অগ্নির বহুপ ও বৈদিক পূজা অচ্যুতানের পরিচয়

বিধি ও নিয়মাবলী বোধি-নির্মাণ ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন করাই ছিল বৈদিক অচ্যুতানের অঙ্গসমূহ। অগ্নির বহুপ না জানলে অগ্নিতে আততি প্রদানের তাৎপর্য উপলব্ধি হবে না। তাহলে ভবিষ্য অগ্নির দৃষ্টি

স্বরূপের কথা বলেছেন : একটি স্থূল রূপ বা নিম্নে রূপ, আর অল্পটি সূক্ষ্ম বা উৎকৃষ্ট রূপ। ঋষিগণ সেই অগ্নির উপাসনার কথা বলেছেন যে কারণ-সত্তা থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়েছে। অগ্নির যে অংশ স্থূল, যে অংশ মৃতদেহ ভক্ষণ করে, সে অংশের অর্চনা ঋষিদের অভিপ্রেত নয়। তাঁদের অভিপ্রায়—যে অগ্নির মধ্যে আর একটি অগ্নি আছে, যে অগ্নি দেবতাদের কাছে যজ্ঞের হবি বহন করে থাকে, যে অগ্নি বিশ্বের তাৎপর্য বস্তুকে জানে, তাঁরই উপাসনা করা। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয়, সেই যজ্ঞের উপাস্ত দেবতা স্থূল অগ্নিাদি দেবতা নয়। অর্থাৎ অগ্নির সূক্ষ্ম রূপটিই দেবতাদের কাছে যজ্ঞীয় হবি বহন করে। যজ্ঞের অগ্নির প্রকৃত তাৎপর্যই এই। ঋগ্বেদে সর্বত্রই অগ্নিকে দেবতাদের দূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হবি বহন করে বলে অগ্নি দূত। যে মানব কেবলমাত্র অমৃত প্রাপ্তির জন্য অগ্নিতে হবি প্রক্ষেপ করে, কেবল সেই মানুষের সম্বন্ধেই অগ্নি দূত হয়। অতীত নয়।

বৈদিক অল্পস্থানে যজ্ঞের অপরিহার্যতা উপরের আলোচনার কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে বলে আশা করা যায়। যা হোক, যজ্ঞ ছিল দু'রকমের। প্রথম প্রকারের নাম 'নিত্য্য' এবং দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'কাম্য'। নিত্য্য শব্দটির অর্থ আবশ্যিক, কাম্য হচ্ছে কামনা করা,—কিছু পেতে ইচ্ছা করা।

বৈদিক ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি দিন কয়েকটি ধর্মীয় অল্পস্থান আবশ্যিক বলে বিবেচিত হতো। কেবল ষাঁচা সন্ন্যাসী,—ষাঁচা গৃহ থেকে দূরে কোন অরণ্যে বা পর্বতকন্দরে গভীর ধ্যানের মগ্ন থাকতেন, তাঁরা ছিলেন সব রকম আচার-অল্পস্থানের বাইরে। বিশেষ ধরনের যজ্ঞ-বেদীতে প্রত্যেক গৃহস্থকে তিন প্রকার অগ্নি সংরক্ষিত রাখতে হতো। সেগুলি ছিল 'গার্হপত্য্য', 'আহ্বানীয়' ও 'দক্ষিণ'। যজ্ঞবেদী-নির্মাণে সবিশেষ সাবধানতা বৈদিক অল্পস্থান। কারণ, বেদী নির্মাণে,—এর আকার ও আয়তনে সামান্ততম ভুলত্রুটি হলে গৃহস্থের অমঙ্গল ও অকল্যাণ হিসাবে গণ্য হতো।

গার্হপত্য্য বেদী বর্গাকার অথবা ত্রুতাকার হতে পারত, আহ্বানীয় বেদী বর্গাকার ও দক্ষিণ বেদী ছিল অর্ধবৃত্তাকার। 'ব্যাম' একক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এক ব্যামের পরিমাপ ছিল ৭২ ইঞ্চি। 'পুরুষ'-ও একক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এর পরিমাপ ছিল ৯০ ইঞ্চি। সে-যুগে 'পুরুষ' একক কোন রাজা বা পুরোহিতের দৈর্ঘ্য ছিল বলে মনে হয়।

উপরোক্ত তিন প্রকার অগ্নি নিত্য্য পূজা-অর্চনার অল্প নির্দেশিত ছিল। আর

এক প্রকার অগ্নি, 'কাম্যায়ি'-র প্রচলন ছিল। এই প্রকার অগ্নির মধ্যে কোন-না-কোন পার্শ্বিক লাভালাভ জড়িত ছিল বলে শাস্ত্রে এই প্রকার অগ্নি সমাদৃত হতো না। রাজা-রাজড়ারা ছিল এই প্রকার অগ্নির ভক্ত। অশ্বমেধ, রাজন্যুর প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা আমাদের অজানা নেই। অবশ্য কখনো কখনো মূনি-ঋষিরা একত্রে দেশ বা কোন গোষ্ঠীর বৃহত্তর কল্যাণে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। কাম্যায়ি নির্মাণ অতীব জটিল। ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, ট্রাপেজিয়াম প্রভৃতিতে বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যতিরেকে এই প্রকারের বেদী-নির্মাণ সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এক বেদীকে সম-আকার বা ভিন্ন-আকারের অন্ত বেদীতে রূপান্তরিত করা ছিল আরো জটিল।

॥ শুভ ও শুভকার ॥

শুভ শব্দের অর্থ 'রজ্জু' বা 'দড়ি'। তাই কখনো কখনো শুভ শব্দের পরিবর্তে রজ্জু শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রজ্জু বা দড়ি দিয়ে জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কণ হতো বলে খুব সম্ভব এই নাম দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসেও 'লিনেন' বা সূতোর ব্যবহার দেখা যায়। জ্যামিতির নানা উপপাত্ত, সম্পাত্ত ও সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে শুভ সূত্রে নিহিত আছে। 'অবতরণিকা'য় আমরা সূত্রের সংজ্ঞা দিয়েছি। বৈদিক যুগের শিক্ষা দান ছিল মৌখিক। কিন্তু কালক্রমে বিশাল জ্ঞান মৌখিক শিক্ষা দানে অসম্ভব হয়ে উঠে। তখনই সূত্রাকারে লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়,—সূত্র যুগের শুরু হয়। এক সময় ভারতে বহু বৈদিক প্রতিষ্ঠান ছিল। 150 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পতঞ্জলির রচনা থেকে জানতে পারা যায় তখন 1131 বা 1137 প্রকারের বৈদিক প্রতিষ্ঠান ছিল। অল্পমিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন শুভ সূত্র পড়ানো হতো। কিন্তু বর্তমানে আমরা মাত্র সাত প্রকারের শুভসূত্রের কথা জানি।

ভারতীয় রীতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুভকারদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আর জানি না তাঁদের রচিত গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে। নীচে শুভকারদের নাম ও তাঁদের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

॥ বোধায়ন ॥

প্রাচীনতার দিক থেকে বোধায়নের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। এঁর রচনা-কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও পণ্ডিতরা 800 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দকে এঁর রচনাকাল বলে অনুমান করেন। বোধায়নের সূত্রগ্রন্থ সর্বাঙ্গোপেক্ষ বৃহৎ গ্রন্থ।

তিনি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে মোট 525টি সূত্র আছে। ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এ দশটি স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে 467টি উপপাত্ত আছে। এই আলেকজেন্দ্রীয় শিক্ষকের মণীষায় আমরা প্রায়ই অভিভূত হই, আর তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। কিন্তু বোধায়ন প্রভৃতি জ্যামিতিকারদের সম্পর্কে আমরা প্রায়ই নীরব থাকি,—এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যা হোক,—বোধায়ন তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বেদী তথা জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কনের নিয়ম কখনো বিস্তারিতভাবে কখনো অতি সংক্ষেপে তথা সূত্রাকারে বিবৃত করেছেন। প্রকৃতশক্ষে, শুদ্ধকারগণ কোন সূত্রের আবিষ্কারক নন। খুব সম্ভব, ইউক্লিডের মত বোধায়নও কোন বৈদিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগ্য আচার্য ছিলেন।

॥ কাত্যায়ন ॥

কাত্যায়নের শুদ্ধসূত্র দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের সূত্র সংখ্যা 90 এবং দ্বিতীয় অংশের সংখ্যা 40 বা 48। বোধায়নের তুলনায় কাত্যায়নের বেশী কিছু কৃতিত্ব নাই। এখানে-ওখানে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায় মাত্র। এই গ্রন্থের রচনা আনুমানিক 500 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে ধরা হয়।

॥ আপস্তম্ব ॥

ইনি সম্ভবত 400 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। এঁর গ্রন্থ 21টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং মোট সূত্র সংখ্যা 223টি। আপস্তম্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিভিন্ন প্রকার বেদী-নির্মাণ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

॥ মানব ॥

অন্যান্ত শুদ্ধসূত্রের তায় মানব শুদ্ধসূত্রে বিভিন্ন প্রকারের বেদী ও অগ্নি নির্মাণের নিয়ম ও সূত্রাদির বর্ণনা আছে। মানব ও কাত্যায়ন শুদ্ধের সঙ্গে অন্যান্তদের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। বোধায়ন ও আপস্তম্ব নিয়মগুলি সূত্রাকারে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু মানব ও কাত্যায়ন পণ্ডের ব্যবহার করেছেন। মানব শুদ্ধের প্রধান ভাষ্যকার শিবদাস বলেন, পত্ন্যাংশের রচয়িতা হচ্ছেন শুদ্ধকারগণ। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন মানব-শুদ্ধ 500 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে 200 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হয়ে থাকবে।

মানব-শুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে পরিভাষা সূত্রের আলোচনা আছে। দ্বিতীয়,

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বেদীর আলোচনা দেখা যায়। সপ্তম অধ্যায়ের কিছু অংশে পরিমাপ ও ‘দক্ষিণা’ সম্বন্ধে বলা হয়েছে; অবশিষ্ট অংশে ‘সুপর্ণ-চিতি’ নামে এক প্রাচীন চিত্রের উল্লেখ আছে। সুপর্ণ-চিত্তিকে গুরুড়-চিত্তিও বলা হয়। ‘সুপর্ণ’ শব্দের অর্থ পরম সত্তা, প্রাণশক্তি, বিষ্ণু, সূর্য। এই চিত্রের উল্লেখ ও অস্তিত্ব দেবতাদের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লক্ষ্যণীয় :—

“ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাছ

রথো দিব্যঃ স সুপর্ণ গুরুত্মান।”

বোধায়ন ও আপস্তম্বে এই চিত্রের উল্লেখ নাই। কিন্তু রামায়ণে উল্লেখ আছে। মহারাজ দশরথ পুত্রোপ্তি বজ্র সম্পাদনের জন্ত ‘গুরুড়-চিত্তি’ নির্মাণ করেছিলেন। ‘সম্ভবিত-চতুরঙ্গ-শ্রোন-চিৎ’-এর সঙ্গে মস্তক ছাড়া সব দিক থেকে এই চিত্রের মিল দেখা যায়।

মানব শুভশ্রুতি আর কোন চিত্র বা অগ্নির উল্লেখ নাই। তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশই নানা প্রকারের বেদী-নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছে। অপরপক্ষে, বোধায়ন ও আপস্তম্বে নানা প্রকার অগ্নি-নির্মাণের বিবরণ আছে। এর কারণ সম্বন্ধে নরেন্দ্র-কুমার মজুমদার তাঁর “Mānava Śūlba Sūtram” প্রবন্ধে বলেছেন মানব শুভশ্রুতির ব্যবহার সম্ভবত অনগ্নিক-যজ্ঞ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং অগ্নি চিহ্নটি আগ্নিক-যজ্ঞ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্যের বেদান্ত-তান্ত্র থেকেও এই মত সমর্থিত হয়। তিনি বলেছেন, “ঐহারা ঋষেদৌ—ঋষোহুসারে যজ্ঞকারী, তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রে সকল বিকারে অহুস্যত, অগৎ-কারণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐহারা ষজুর্বেদৌ, তাঁহারা যাবতীয় অগ্নির মধ্যে এই ব্রহ্ম-সত্তাকেই উপাসনা করেন। ঐহারা সামবেদী, তাঁহারাও মহাব্রত নামক যজ্ঞে এই ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন।”

পরিভাষা খণ্ডে পরিমাপের জন্ত রজু ও শঙ্কুর বর্ণনা আছে। অগ্নি কোন শুভগ্রহে এক্রপ দেখা যায় না। ‘পূর্ব-পশ্চিম-রেখা’ নির্ণয় সব ধরনের বেদী ও অগ্নি নির্মাণের ভিত্তি-স্বরূপ। মানব এই রেখা নির্ণয়ের চার প্রকার পদ্ধতি দিয়েছেন। কাত্যায়নে মাত্র একটি, আর অগ্নি শুভ শুক্লসুপর্ণ এই রেখা নির্ণয়ের কোন বর্ণনা নাই। অবশ্য প্রাথমিক এই নিয়মটি স্বতঃসিদ্ধের মতই স্পষ্ট ও সত্য বলে ধরে নেওয়ার জন্তই সম্ভবত এর বর্ণনা অস্তিত্ব শুভগ্রহে দেখতে পাওয়া যায় না।

॥ পূর্বপশ্চিম রেখা নির্ণয় ॥

কাত্যায়ন শুদ্ধসূত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই রেখা নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ :—

“সমে শংকুং নিখায় শংকুসম্মিতয়া রজ্জা মণ্ডলং পরিমিত্য যত্র লেখায়াঃ শংকুবগ্রচ্ছায়া নিপততি তত্র শংকু নিহন্তি সা প্রাচী ।”

মানব শুদ্ধেও একই পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—

সামন্তলিক ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত অঙ্কন করে কেন্দ্রে দৃঢ়ভাবে একটি শঙ্কু স্থাপন করতে হবে। সূর্যোদয়ের সময় বৃত্তের পরিধিতে শঙ্কুর ছায়া যে বিন্দুতে পতিত হবে এবং সূর্যাস্তের সময় শঙ্কুর ছায়া বৃত্তের পরিধিস্থ যে বিন্দুতে পতিত হবে— এই উভয় বিন্দুর সংযোগ রেখাই হবে “পূর্ব-পশ্চিম-রেখা ।”

॥ কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য ॥

ইউক্লিডের জ্যামিতি পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ ও পাঁচটি স্বীকার্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইগুলিই জ্যামিতিক প্রমাণ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি। ইউক্লিড এগুলির উপর নির্ভর করেই মোট ৪৬৪টি উপপাদ্য যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। বলা বাহুল্য, আরোহ-অবরোহ পদ্ধতিতে সতর্ক যুক্তি-তর্ক-নির্ভর ইউক্লিডের জ্যামিতি। ভারতীয় ও গ্রীক জ্যামিতির পার্থক্য এখানেই। ভারতীয় গণিতে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্যের কোন উল্লেখ নাই। ভারতীয় গণিত একান্তভাবে গণিত নির্ভর। ভারতীয় জ্যামিতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডঃ টি. এ. সরস্বতী আশ্চর্য্য মন্তব্য : “The Indian's aim was not to build up an edifice of geometry on a few self-evident axioms, but to convince the intelligent student of the validity of the theorem, so that visual demonstration was quite an accepted form of proof.” ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচার করলে মনে হয়, ভারতীয় জ্যামিতি কোন প্রকারেই গ্রীসের নিকট ঋণী নয়। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আছে সাড়ে চারশ'-র মত উপপাদ্য। কিন্তু ভারতীয় গণিতে এই সংখ্যা পাঁচশ'-রও বেশী। পতঞ্জলির মত যদি সত্য হয়,—যদি ভারতে এক হাজারেরও বেশী বৈদিক প্রতিষ্ঠান থেকে থাকে, এবং সে-সব প্রতিষ্ঠানে যদি ভিন্ন ভিন্ন শুদ্ধসূত্রের অধ্যয়ন হয়ে থাকে, তা হলে এই সংখ্যা যে কত বেশী হবে তা কল্পনা করে নিতে হয়। মানবের শুদ্ধসূত্রের মারুতি, বারুণী, স্বপর্ণ-চিতি প্রভৃতির নিয়ম অত্র কোন সূত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। তা বলে এর অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতিতে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্যের কোন উল্লেখ নাই। তা বলে তাঁরা কি এ-বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন? তাঁরা কি কেবল অভিজ্ঞতা ও পরিমাপ থেকেই বেদী ও অগ্নি নির্মাণে বিভিন্ন স্বীকার্যের সহায়তা নিতেন? আজ আমাদের হাতের কাছে তেমন প্রমাণ নাই যা থেকে আমরা উপরের প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি। তবে ধারা সেই প্রাচীন কালে গণিতে অদ্বুত-পূর্ব উন্নতিসাধন করেছিলেন, জটিল পাটিগাণিতিক সমস্যা, বীজগণিত ও গোলীয় ত্রিকোণমিতির ধারণা ও সূত্রাদি প্রয়োগ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশ্বয়কর উন্নতি করেছিলেন, তাঁরা কোন যুক্তি-তর্কের ধার ধারতেন না, এ এক অসম্ভব কল্পনা মাত্র। শুভসূত্রের নানা জ্যামিতিক অঙ্কন থেকে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য নিয়ে প্রদত্ত হলো :—

(1) যে-কোন সরল রেখাকে যে-কোন সংখ্যক সমান অংশে বিভক্ত করা যায়।

(2) ব্যাস অঙ্কনের দ্বারা বৃত্তকে যে-কোন অংশে বিভক্ত করা যায়।

(3) আয়তক্ষেত্রের কর্ণ ক্ষেত্রটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(4) কর্ণদ্বারা আয়তক্ষেত্র চারটি অংশে বিভক্ত হয় এবং বিপরীত অংশগুলি পরস্পর সমান।

(5) রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(6) সমদ্বিখাছ ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ও ভূমির সংযোজক রেখা ত্রিভুজটিকে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত করে।

(7) একই ভূমি ও সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যবর্তী আয়তক্ষেত্র ও সামন্ত-রিকের ক্ষেত্রফল সমান।

(৮) আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।


(9) ত্রিভুজের বাহুগুলিকে সমান সংখ্যক অংশে বিভক্ত ক'বে এবং দুই-দুই হিসাবে বিন্দুগুলি শীর্ষবিন্দুর সহিত সংযোজিত ক'বে ত্রিভুজটিকে যে কোন সংখ্যক সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অংশে বিভক্ত করা যায়।

॥ প্রাচীন যজ্ঞবেদীর পরিচয় ও ইতিহাস ॥

ঋগ্বেদ সংহিতায় পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে যজ্ঞ-বেদীর নির্মাণ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ

আছে। শ্রীরামচন্দ্রের অগস্ত্যমুনির আশ্রম গমনের সময় এবং চিত্রকূট ও পঞ্চবটীতে অবস্থানের সময় যজ্ঞ-বেদীর উল্লেখ আছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে তিন প্রকার বেদী—গার্হপত্য, আহ্বানীয় ও দক্ষিণ বেদী সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ঋগ্বেদের যুগের পূর্ববর্তী বলে স্বীকৃত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই সব বেদী-নির্মাণে বৃত্তের বর্গ ও অতিভুজের বর্গ-জনিত সমস্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। স্মতরাং পীথাগোরাসের নামে পরিচিত উপপাদ্যটি ভারতে কমপক্ষে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত তিনপ্রকার ‘নিত্য’ যজ্ঞ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আরো কতকগুলি আবশ্যিক অস্থান ছিল। যেমন,—ইষ্টিযজ্ঞ, পশুযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ। ইষ্টিযজ্ঞ ছিল ছ’রকমের—দর্শ ও পৌর্ণমাস। প্রতি অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে মাখন ও ফলমূল দিয়ে এই অস্থান সম্পাদিত হতো।




চিত্র—৩ (দর্শপৌর্ণমাসিকী বেদী)

বছরে অন্তত একবার করে বর্ষাকালের যে-কোন অমাবস্তা বা পূর্ণিমায় পশুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। সোম যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল খুব জাঁকজমকপূর্ণ এক বিরাট ব্যাপার। ব্যয়বহুল এই যজ্ঞানুষ্ঠান তিন-পুরুষে মাত্র একবার অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি ছিল।


কাম্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে বেদীর নাম পাওয়া যায়, তা হচ্ছে শ্রেণ-চিতি। এই বেদীর আকার বাজপাখীর মত ছিল বলে এরকম

নামকরণ হয়েছে। কামাগ্নি নির্মাণ প্রণালী সাধারণত জটিল। তাই 'শ্রোণ-চিত্তি' নির্মাণ প্রণালী ভীষণ জটিল।



চিত্র—৪ (শ্রোণ-চিত্তি)

আর এক প্রকার বেদীর নাম ছিল বক্র-পক্ষ-বাস্ত-পুচ্ছ-শ্রোণ। বাজপাখীর মত দেখতে এই বেদীর ডানা দুটি ছিল নিয়ম্ণ্বী এবং লেজটি ছিল বিস্তৃত।



চিত্র—৫ (বক্র-পক্ষ-বাস্ত-পুচ্ছ-শ্রোণ)

কক্ক বেদী ছিল ককের মত দেখতে। অলঙ্ক এক প্রকার পাখীর মত, প্রাউন ছিল সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, উভয়ভঃ প্রাউন ছিল রঘুসের মত। রথ-চক্র

রথের চাকার মত, স্রোণ ছিল দোনা,—পাত্রে মত। পরিচর্য বৃত্তাকার, কূর্ম কচ্ছপের মত। একাদশিনী বেদী মহাবেদীর মত দেখতে হলেও এই বেদী মহাবেদীর এক বৃহৎ রূপ—উভয় বেদীর মধ্যে একটি সরল অমুপাত দেখতে পাওয়া যায়। ‘একাদশিনী’ নামকরণের তাৎপর্য এই যে এই বেদীর সম্মুখভাগে অর্থাৎ পূর্বপ্রান্তে এগারোটি ‘যুগ’ স্থাপনের বিধি ছিল। অশ্বমেধ বেদীও মহাবেদীর মত দেখতে। কিন্তু আয়তনে একাদশিনী বেদীর চেয়ে বড়। এই বেদীর পূর্বপ্রান্তে একুশটি তুপ স্থাপন করার বিধি। নীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র যখন পুস্পকে চড়ে অযোধ্যার নিকটবর্তী হয়েছিলেন, তখন মহাকবি কালিদাস তাঁর অননুক্রমণীয় ভঙ্গিমায় বর্ণনা দিচ্ছেন :

“জলানি বা তীরনিখাতযুগা বতোযোধ্যামনু রাজধানীম্।


তুরঙ্গমেধাবভূথাবতীনৈঃ ইক্ষাকুতিঃ পুণ্যতরীকৃতানি” ॥

“যে সরযুর তীরে যুগ সকল প্রোথিত রহিয়াছে ও ইক্ষাকুবংশীয় রাজগণের অশ্বমেধ যজ্ঞান্ত জ্ঞান দ্বারা যে সরযুর জল পবিত্রতর হইয়া রাজধানী অযোধ্যার নিকট দিয়া বহিয়া চলিয়াছে।”

অশ্বমেধ যজ্ঞে যুগের প্রচলন সম্পর্কে রঘুবংশের স্নোকেটি আমাদের কিছু ধারণা বহন করে বলে উদ্ধৃত হলো।

॥ কয়েকটি যজ্ঞবেদীর জ্যামিতিক পরিচয় ॥

প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতি গ্রীক জ্যামিতির মত যুক্তি-তর্ক-নির্ভর নয়। তাই, যজ্ঞবেদীর জ্যামিতিক পরিচয়ে আমরা তার গাণিতিক দিকটির পরিচয় বেশী করে পাই। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-চর্চা উদ্বেগুবিহীন ছিল না। কেবল, জ্ঞানের ক্ষতাই জ্ঞান নয়—সব জ্ঞানের সর্বশেষ লক্ষ্যটি ছিল ব্রহ্মদর্শন। প্রাচীন



চিত্র—৬ (মহাবেদী)

ভারতে জ্ঞান তাই ছিল প্রয়োজন-ভিত্তিক। জ্যামিতি চর্চাও এই নিয়ম-বিধি বহির্ভূত ছিল না।

সর্বাঙ্গেক্ষা প্রাচীন তিন বেদী—গার্হপত্য, আহুমানীয় ও দক্ষিণের মধ্যে আকারে প্রভেদ থাকলেও আয়তনে কোন প্রভেদ নাই। প্রত্যেক প্রকার বেদীর ক্ষেত্রফল ছিল নির্দিষ্ট এবং তা এক বর্গ-ব্যাস। মহাবেদী বা

সৌমিকী-বেদীর আকার ছিল সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম। প্রাচীন এই বেদীর সম্মুখীন বাহু ২৪ পদ, ভূমি ৩০ পদ এবং উচ্চতা ছিল ৩৬ পদ।

সৌত্রমণি-বেদীর আকারও ছিল সমদ্বিবাছ ট্রাপিজিয়াম। কিন্তু ক্ষেত্রফল ছিল মহাবেদীর এক তৃতীয়াংশ। পৈতৃকী-বেদীর আকারও তাই, কিন্তু ক্ষেত্রফল সৌত্রমণি-বেদীর এক নবমাংশ। প্রাগ্-বংশ-বেদীর আকার আয়তক্ষেত্র। একাদশিনী বেদীর পূর্বপ্রান্তের দৈর্ঘ্য 10 অক্ষ 11 পদ 8 অঙ্গুলি; অশ্বমেধ-বেদীর পূর্বপ্রান্তের দৈর্ঘ্য 20 অক্ষ 21 পদ 8 অঙ্গুলি।

বেদী-নির্মাণে ইট ব্যবহার করা হতো। প্রাথমিক পর্বে বেদীতে পাঁচটি স্তর থাকত। প্রাথমিক বেদী উচ্চতায় হাঁটুর সমান,—বৈদিক পরিমাপ অনুযায়ী 32 অঙ্গুলি। প্রত্যেক ইটের আকার ও আয়তন নির্দিষ্ট ছিল। যেমন—চতুশ্চ-শ্যোন-চিতি নির্মাণে প্রত্যেকটি ইট হতো বর্গাকার এবং প্রত্যেক স্তরে 200 ইট থাকার বিধি ছিল। অবশ্য কোন কোন বেদী-নির্মাণে ইটের আকার ভিন্ন হলেও সংখ্যা অনির্দিষ্ট রাখার বিধি ছিল।

গার্হপত্য বেদী পাঁচ স্তরে নিমিত হতো। প্রতি স্তরে ইটের সংখ্যা 21 এবং যজ্ঞবেদীর ক্ষেত্রফল হতো এক বর্গ বাঘ। লক্ষ্য করার বিষয়, স্তর নির্মাণে নিশ্চিত কিছু ‘মশলা’ ব্যবহার করা হতো এবং দুটি ইটের মধ্যকার ফাঁক পূরণ করার বিষয়ে গণিতজ্ঞদের চিন্তার অবকাশ ছিল। বৌদায়ন এই বেদী-নির্মাণে তিন প্রকার ইট ব্যবহার করার বিষয় আলোচনা করেছেন। এদের আকার এক বাঘের এক-ষষ্ঠাংশ, এক-চতুর্থাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ। প্রথম স্তর নির্মাণে প্রথম প্রকারের 9টি ইট, দ্বিতীয় প্রকারের 12টি ব্যবহৃত হতো; দ্বিতীয় স্তরে প্রথম প্রকারের 16 টি এবং তৃতীয় প্রকারের দুটি ইট ব্যবহৃত হতো। তৃতীয় ও পঞ্চম স্তরে প্রথম স্তরের মতই ইট লাগত, আর চতুর্থ স্তরটি ছিল দ্বিতীয় স্তরের অধরূপ।

॥ পীথাগোরাসের পূর্বে ॥

অতিভূজের উপর বর্গ সম্পর্কিত উপপাত্তটির আবিষ্কারক হিসাবে গ্রীক গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক পীথাগোরাসের সর্বাধিক পরিচিতি। কিন্তু গণিত ইতিহাসকারগণ ঐ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানজ্ঞের ছাত্র-ছাত্রীরা পীথাগোরাসের উপপাত্তের যে প্রমাণটি পড়ে, সেটিও তাঁর নয়। খুব সম্ভব, এই প্রমাণটির কৃতিত্ব ইউক্লিডের প্রাপ্য। সে যা হোক,—ভারতে ঋষিদের যুগের পূর্বেও এই উপপাত্তটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। শুধু ভারতে কেন,—পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যদেশেই এই উপপাত্তের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে এই উপপাত্তটি ‘কর্ণের উপর বর্গ’ নামে খ্যাত। অতি প্রাচীন দক্ষিণ বেদী নির্মাণে

এই উপপাদ্যের সাহায্য অপরিহার্য। তা ছাড়া আরো নানা ধরনের বেদী নির্মাণে এই উপপাদ্যের জ্ঞান অত্যাৱশ্যক।

বোধায়ন শুবসূত্রে উপপাদ্যটির বর্ণনা এইভাবে পাওয়া যায় :—

“দীর্ঘচতুরশ্রুত। ক্রমারজ্জুঃ পার্শ্বমাণী তিৰ্যঙ্মাণী
চ যৎপৃথগ্ভূতে কুরুতস্তদ্ব্যসং করোতি”—


—আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যাহা (ক্ষেত্রফল) পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন করে তাহা (ক্ষেত্রফল) উহার কর্ণ উৎপন্ন করে।

সহজ ও সরল ভাষায় আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ক্ষেত্রফল একত্রে উহার কর্ণের ক্ষেত্রফলের সমান।

হুঃখের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্যটির বর্ণনা শুবসূত্রে থাকলেও এর কোন প্রমাণের উল্লেখ নাই। থিবো, ব্যুর্ক ও ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত এই উপপাদ্যটির তখনকার প্রচলিত প্রমাণই সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এই উপপাদ্যের নিশ্চয় প্রমাণ ছিল। এর বহুল প্রচার ও প্রয়োগই সম্ভবতঃ শুবকারদের লিখে রাখার প্রেরণা দেয়নি। বোধায়ন এর গাণিতিক দিকটির উল্লেখ করে বলেছেন, এর সত্যতা উপলব্ধি হবে 3 ও 4 একক, 12 ও 5 একক, 15 ও 8 একক, 7 ও 24 একক এবং 15 ও 26 একক বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের বেলায়। আমরা জানি, $3^2 + 4^2 = 5^2$; $12^2 + 5^2 = 13^2$ প্রভৃতি। আয়তক্ষেত্রের কর্ণ 5 একক হলে তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 4 ও 3 একক হবে। সুতরাং কর্ণের উপর বর্গ সম্পর্কিত উপপাদ্যটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তা ছাড়া শুবসূত্রে এর প্রমাণ থাকার কথাও নয়। যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বেদী-নির্মাণ, সেখানে সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণই বা থাকবে কেন? এই প্রসঙ্গে ডঃ টি. এ. সরস্বতী আশ্চর্য মতটি উল্লেখযোগ্য : “To speculate on whether the Indians have a proof for the theorem or what the proof could have been is idle. The Śulbasūtras, our only means of knowing what the condition of mathematics then was in India, are only practical manuals for the construction of the altars. Proofs are outside their scope. Very likely they had proofs orally transmitted to the enquiring student.”

ব্যুর্কের মতে এই উপপাদ্যটির প্রমাণে প্রাচীন শুবকারগণ হয়তো কর্ণ ও অর্ন্ত

বাহু দুটিকে একক বর্গে পরিণত করে গণনার দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণ করতেন।
নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে।



চিত্র-৭


॥ বৃত্তের বর্গ-রূপ ও π (পাই)-এর মান ॥

কোন বৃত্তের সমান বর্গক্ষেত্র ও কোন বর্গক্ষেত্রের সমান বৃত্তাক্ষনের ইতিহাস খুব প্রাচীন। গ্রীক গণিতে যে তিনটি সমস্তা দীর্ঘদিন অসমাধানিত ছিল, এটি তার মধ্যে একটি। প্রকৃত কাল-নির্ণয় করা না গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সমস্তাটির সমাধান প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অন্তত তিন হাজার বছর পূর্বে করেছিলেন। গার্হপত্য, আহ্বানীয় ও দক্ষিণ বেদী-নির্মাণ এই সমস্তার সমাধান না হলে সম্ভব হতো না। তা ছাড়াও অজ্ঞাত বেদী আশান-চিৎ, রথচক্র-চিৎ, পরিচর্য-চিৎ, দ্রোণ-চিৎ প্রভৃতি নির্মাণে এর প্রয়োগ আছে।

বোধায়ন শুদসূত্রে সম্পাণ্ডটি নিম্নরূপে উল্লিখিত আছে : “যদি তুমি বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন করিতে চাও তাহা হইলে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে উহার কর্ণের অর্ধ পরিমাণ ব্যাসার্ধ লইয়া পূর্ব-পশ্চিম বরাবর রেখা স্পর্শ করিয়া বৃত্তাক্ষন কর। অতঃপর বর্গক্ষেত্রের বহিঃস্থ রেখার এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ব্যাসার্ধ লইয়া বৃত্তাক্ষন কর।”

ABCD একটি বর্গক্ষেত্র, O কেন্দ্র (কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দু)। OA সংযুক্ত করা হলো। O-কে কেন্দ্র করে OA ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তাক্ষন করা হলো। এই বৃত্ত পূর্ব-পশ্চিম বরাবর রেখা EW-কে P বিন্দুতে ছেদ করল। PR-কে এমন ভাবে ভাগ

করা হলো যেন $QR = \frac{1}{2} PR$ হয়। এবার O -কে কেন্দ্র করে OQ ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তাক্ষন করলে তা প্রায় $ABCD$ বর্গক্ষেত্রের সমান হবে।



চিত্র—৪

তদন্ত্রে π -এর মান সম্পর্কে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু নানান জ্যামিতিক অঙ্কন থেকে প্রমাণিত হয় প্রাচীন কালে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা বৃত্তের পরিমাপ ও ব্যাসের অল্পপাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। আমরা জানি, r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল πr^2 । সুতরাং বৃত্তাকার কোন বস্তুবেদীর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে π -এর মান নির্ণয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

উপরের চিত্রে $AB = 2a$ হলে, $OQ = \frac{a}{3}(2 + \sqrt{2})$

অতএব $\pi = 18(3 - 2\sqrt{3})$ । এখানে π -এর মান 3.088। π -এর মানটি নিভুল নয়, স্থূল মান। বস্তুবেদী নির্মাণে এই মান যথেষ্ট বলে গণ্য হতো মনে হয়।

৥ তদন্ত্রে একক ॥

এককের প্রয়োজনীয়তার কথা না বললেও চলে। আধুনিক বিজ্ঞানে কত প্রকারের এককই না প্রচলিত আছে। এ-সবই স্থূল পরিমাপের জন্ত। প্রাচীন

যুগে ভারতীয় গণিতজ্ঞরাও বিজ্ঞান-সম্বন্ধে উপায়ে সঠিক পরিমাপ করার জন্য নানা প্রকার একক আবিষ্কার করেছিলেন। এককগুলির নাম থেকে মনে হয় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যেমন,—‘পুরুষ’ একক সম্বন্ধে মহাবীর বর্ধমানের সংসার ত্যাগের মুহূর্তের এক বিবরণ পাওয়া যায়। ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে আছে,—“সেই কালে সেই সময়ে (মহাবীর) হেমন্তের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাভিমুখিনী ছায়ায় এক “পৌরুষী” পরিপূর্ণ হইলে সূত্রত নামক দ্বিবসে বিজয় নামক মুহূর্তে চন্দ্রপ্রভা নামক শিবিকায় আরোহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।” এক পৌরুষী বা পুরুষ সমান সাড়ে তিন হাত বা পুরুষের দৈর্ঘ্যের সমান বা উদ্ধবাহু পুরুষের দৈর্ঘ্যের সমান বলা হয়েছে। অঙ্গুলি, পদ, ব্যাম প্রভৃতি এককগুলি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সূচিত করে। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো :

5½ অঙ্গুলি=1 পদ=1 প্রক্রম

12 অঙ্গুলি=1 প্রাদেশ

24 অঙ্গুলি=1 অরংনি=1 হাত=18 ইঞ্চি=1 শর

96 অঙ্গুলি=1 ব্যাম=1 পিনিল

104 অঙ্গুলি=1 অঙ্গ

120 অঙ্গুলি=1 পুরুষ

5 শর বা হাত =1 পুরুষ

8 বব =1 অঙ্গুলি

1 প্রক্রম=2 পদ (ইষ্ট যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

=3 পদ (পৌষ যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

=2½ পদ (সৌম যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

=5 পদ (সাগ্নিক যজ্ঞের ক্ষেত্রে)

এই এককগুলির কোন সর্বভারতীয় রূপ ছিল কিনা বলা যায় না। মনে হয় অঞ্চলভেদে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল।

॥ শব্দসূত্রে পণ্ডিত ॥

ভারতীয় গণিতজ্ঞরা যুক্তি-তর্কের ভাষাগত দিকটির প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করেননি। গণিতে যে দিকটির প্রতি তাঁরা বিশেষ আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন, সে দিকটি হচ্ছে জটিল গাণিতিক পথ। সম্ভবত এই কারণেই শুদ্ধকারগণ

সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলিকে মূলদ রাশির দ্বারা প্রকাশ করেছেন। a, b ও c সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহু হলে এদের সম্পর্ক $a^2 + b^2 = c^2$ —এই সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। শুদ্ধসূত্রে এই সমীকরণের কোন সাধারণ বীজ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন কতকগুলি উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে ওই সমীকরণের ধর্মটি প্রযুক্ত হয়েছে। শুদ্ধসূত্রে নিম্নরূপ বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজের উদাহরণ পাওয়া যায় :—

$$(1) a=3, b=4, c=5$$

$$(2) a=5, b=12, c=13$$

$$(3) a=7, b=24, c=25$$

$$(4) a=8, b=15, c=17$$

$$(5) a=12, b=35, c=37$$

সৌত্রমণি বেদীতে $5\sqrt{3}$, $12\sqrt{3}$, $13\sqrt{3}$ এবং অশ্বমেধ বেদী নির্মাণে $15\sqrt{2}$, $36\sqrt{2}$ এবং $39\sqrt{2}$ বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজাক্ষনের পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ অমূলদ রাশি ॥

শুদ্ধসূত্রে অমূলদ রাশির পরিচয়ও পাওয়া যায়। কোন বিশেষ প্রকার বেদীর বৃহতীকরণ থেকেই অমূলদ রাশির ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছিল। যেমন,— সৌত্রমণি বেদী ত্রিভুজাকার; কিন্তু এই বেদীর ক্ষেত্রফল 5, 12, 13 বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের তিনগুণ।

$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ প্রভৃতি অমূলদরাশিকে শুদ্ধসূত্রে ‘করণী’ বলা হয়েছে। $\sqrt{2} =$ দ্বিকরণী, $\sqrt{3} =$ ত্রি-করণী, $\frac{1}{\sqrt{3}} =$ তৃতীয় করণী, $\frac{1}{\sqrt{2}} =$ সপ্তম করণী।


বিভিন্ন যজ্ঞবেদীর ক্ষেত্রফল নির্ণয় থেকে করণী সংক্রান্ত নানা প্রক্রিয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। বৌদায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়নের শুদ্ধসূত্রে দ্বি-করণী ($\sqrt{2}$)-এর আসন্ন মান পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকালে করণীর আসন্ন মান নির্ণয় গণিতের ইতিহাসে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে।

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{3.4.34}$$

এখানে, $\sqrt{2} = 1.4142156$; $\sqrt{2}$ -এর সঠিক মান 1.4142। কিন্তু কোন পদ্ধতি অবলম্বনে প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এই অত্যাস্চর্য ঘটনা সংঘটিত

করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার কোন ইঙ্গিত শুদ্ধসূত্রে নাই। অবশ্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। দ্বি-করণীর আসন্ন মান নির্ণয়ে সম্ভাব্য একটি পদ্ধতি বিবৃত করা হলো।

একক বাহুবিশিষ্ট দুটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে একটিকে তিনটি সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত করে প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে 1 ও 2 দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। তৃতীয় আয়তক্ষেত্রে তিনটি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করে প্রথমটিকে 3 দ্বারা এবং অপর দুটিকে সমান চারটি করে অংশে বিভক্ত করে 4, 5, 6, 7, এবং 8, 9, 10, 11 দ্বারা চিহ্নিত করা হলো। এই এগারোটি খণ্ডকে নিম্নরূপ চিত্রের তায় অপর বর্গক্ষেত্রে সংযোজিত করা হলো।



চিত্র—৯

এরকম করার ফলে একটি নতুন ক্ষেত্র পাওয়া যাবে যার চিহ্নিত ছোট বর্গক্ষেত্রটির অন্তর্গত সমগ্র ক্ষেত্রটি বর্গক্ষেত্র হতে পারবে না। এখন নতুন ক্ষেত্রের বাহুর পরিমাপ $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3.4}$ এবং চিহ্নিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে নবতম বর্গক্ষেত্রটি প্রথমে নেওয়া বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা $\left(\frac{1}{3.4}\right)^2$ অধিক।

যদি 4 থেকে 11 পর্যন্ত ছোট খণ্ডগুলির বিস্তার x হয়, তা হলে,

$$2x\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3.4}\right) - x^2 = \left(\frac{1}{3.4}\right)^2$$

$$\text{অর্থাৎ, } x = \frac{1}{3.4.3.4} [x^2 \text{ উপেক্ষা করে}]$$

$$\text{প্রত্যেক বর্গক্ষেত্রের কর্ণ } \sqrt{2} \text{ সুতরাং } \sqrt{2} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{3.4.3.4}$$

বর্তমানে একজন পাশ্চাত্য গবেষক করণীর এই আসন্ন মান নির্ণয়ের কৃতিত্ব ব্যাবিলনীয়দের প্রাপ্য বলে মন্তব্য করেছেন। দ্বি-করণীর আসন্ন মান নির্ণয় ব্যাবিলনে বহু শতাব্দী পূর্বে হয়েছিল সত্য, কিন্তু কেবল প্রাচীনতাই অস্ত্রান্ত্র দেশের মৌলিকতা বিনষ্ট করে না।

আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সর্বপ্রথম অমূলদ রাশি ব্যবহার করেন। অবশ্য গ্রীসেও অমূলদ রাশির প্রচলন ছিল। কিন্তু $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি অমূলদ রাশির মূলদ রাশিতে আসন্ন মান প্রকাশ করার কোন পদ্ধতি তাঁরা জানতেন না। অমূলদ রাশি দ্বারা পাটীগণিতিক সমস্তার সমাধান পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। পীথাগোরাস প্রথম এই রাশির ব্যবহার করলেও একথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে শুদ্ধকারগণ তাঁর বহু বহু শতাব্দী পূর্ববর্তী। অমূলদ রাশির ধারণা ও এ-সম্পর্কীয় তত্ত্ব অতি আধুনিক, —ডেভিকিও, ক্যান্টর প্রভৃতি গণিতজ্ঞদের অবদান। আমরা গর্ব করতে পারি এই বলে যে, অস্ত্র তিন হাজার বছর পূর্বে আমাদের দেশের গণিতজ্ঞরা এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও গণিতের সর্বক্ষেত্রে তার ব্যবহার করেছিলেন।

॥ ক্ষেত্রফল ও আয়তন ॥

শুভসূত্রে জ্যামিতিক ক্ষেত্রফল এবং সামন্তলিক ও অস্ত্রান্ত্র বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তনের সূত্র পাওয়া যায়।

- (1) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$
- (2) সামন্ত্রিকের ক্ষেত্রফল $= \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$
- (3) ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times \text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের সমষ্টি} \times \text{উচ্চতা}$
- (4) চোঙের ক্ষেত্রফল $= \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$

॥ শুভসূত্রের ভাস্কর্য্যগণ ॥

শুভসূত্রের অনেক ভাস্ক্র আছে,—এমন কি একই শুভসূত্রের একাধিক ভাস্ক্রও আছে। কিন্তু এ-সব গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় এক অসম্ভব ব্যাপার। নিয়ে কয়েকজন ভাস্কর্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

॥ বৌধায়ন শুভসূত্র ॥

এই সূত্রগ্রন্থে হ'জন ভাস্কর্য্যের নাম পাওয়া যায়,—দ্বারকানাথ ও ভেক্টেশ্বর। দ্বারকানাথের শুভ-ভাস্ক্রটির নাম শুভ-দীপিকা। প্রথম আর্ষভট্টের গ্রন্থ থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অহমিত হয় তিনি আর্ষভট্টের পূর্ববর্তী কোন

সময়ে বর্তমান ছিলেন। শুভসূত্রের বর্গের বৃত্তরূপ ও এর বিপরীত প্রতিজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত ফলের সমালোচনা করে উদাহরণের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে আর্থমটের ফল অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও নিভুল। শুভসূত্রে π -এর মান নির্ণয়ের সূত্র সংশোধিত করে স্বাক্ষরানুগ নিম্নরূপ সূত্রটি দিয়েছেন :—

$$r = \left\{ a + \frac{a}{3}(\sqrt{2}-1) \right\} \left(1 - \frac{1}{18} \right) \text{ এই সূত্র থেকে}$$

$$\pi = 3.141109 \dots \text{ পাওয়া যায়।}$$

ভেক্টরের দীক্ষিতের ভাস্কর্য গ্রন্থের নাম শুভ-মীমাংসা। তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

॥ কাত্যায়ন শুভসূত্র ॥

এখানেও হুঁজর ভাস্কর্যের নাম পাওয়া যায়,—রাম বা রামচন্দ্র ও মহীধর। রামচন্দ্রের ভাস্কর্যের নাম শুভ-সূত্র-বুদ্ধি এবং মহীধরের ভাস্কর্যের নাম শুভ-সূত্র-বিবরণ। বর্তমান লক্কো-এর নিকটবর্তী নৈমিশ্যবাসী রামচন্দ্রের গ্রন্থে শ্রীধরচার্যের ত্রিশতিকা উদ্ধৃতি আছে, যদিও তাঁর গ্রন্থে সমকোণী ত্রিভুজাক্রমের এক নতুন পদ্ধতি আছে। তা হলেও তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার। $\sqrt{2}$ -এর সপ্তম দশমিক স্থান পর্যন্ত নিভুল মান নির্ণয়ের জন্যই তিনি বিখ্যাত।

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{3.4.34} - \frac{1}{3.4.34.33} + \frac{1}{3.4.34.34}$$

অর্থাৎ $\sqrt{2} = 1.414213502$ । অনুমিত হয় রামচন্দ্র হয়তো শুভকার কর্তৃক অল্পস্বত পদ্ধতি জানতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ কোন ইঙ্গিত দেননি।

মহীধরের রচনাকার্য 1589 খ্রীষ্টাব্দ বলে জানতে পারা যায়। তাঁর ভাস্কর্য রামচন্দ্রের ভাস্কর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি অত্যন্ত বিবয়ের উপর সতেরোখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ আপস্তম্ব শুভসূত্র ॥

এই গ্রন্থের ভাষ্যকারের সংখ্যা সর্বাধিক। চারজন বিখ্যাত ভাস্কর্য গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এঁদের মধ্যে গার্গ বসিংহ সোমসূত্রের পুত্র গোপালনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর গ্রন্থের নাম আপস্তম্বীয়-শুভ-ভাষ্য।

অরবিন্দ স্বামী আপস্তম্বের শ্রৌতসূত্রেরও ভাস্কর্য রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি আরো কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি

অৰ্ধভট্টের পরবর্তী। তাঁর রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা না গেলেও তিনি পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তিনি বৃহৎসাপের ক্ষেত্রফলের যে সূত্র দিয়েছেন তা কোন গণিত গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল শ্রীধরাচার্যের পর এই সূত্রটি আরো সূক্ষ্ম ও শুদ্ধরূপে দেখতে পাওয়া যায়। এর ভাস্কর্য গ্রন্থের নাম শুদ্ধ প্রদীপিকা।

কপদিস্বামীর ভাষ্যগ্রন্থের নাম শুদ্ধ-ব্যাখ্যা। ইনি সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। গণিতজ্ঞ শূলপাণি, হেমাজি ও নীলকণ্ঠ এঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শূলপাণির রচনাকাল মোটামুটি 1150 খ্রীষ্টাব্দ এবং হেমাজি দেবগিরির রাজা মহাদেবের (1260-71) মন্ত্রী ছিলেন।

সুন্দররাজ সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদে বর্তমান ছিলেন। শুদ্ধ-প্রদীপ এঁর রচিত গ্রন্থ। ইনি স্বাক্ষরকানাথের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

॥ মানব শুদ্ধ সূত্র ॥

বারানসীর বাসিন্দা নারদের পুত্র শিবদাস হচ্ছেন এই শুদ্ধসূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার। শিবদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্করভট্ট ছিলেন যৈত্রায়ণী শুদ্ধের ভাষ্যকার। উভয় ভ্রাতার গ্রন্থে রামচন্দ্রের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। শিবদাস দ্বিতীয় ভাস্করের গ্রন্থ থেকে ত্রৈবালিক নিয়মটি উদ্ধৃত করেছেন। বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্যের উদ্ধৃতি তাঁর গ্রন্থে থাকায় তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী বলে অনুমিত হন। শুদ্ধপাঠ সম্বন্ধে শিবদাসের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন গণিত-পাঠ সমাপ্ত করে শুদ্ধপাঠ করা উচিত। অন্ত্যায় শুদ্ধে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক যুগের গণিত সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। কিন্তু এ-যুগের বিপুলায়তন গ্রন্থাদির আলোচনা ও বিক্ষিপ্ত গাণিতিক তথ্যাদি পরিবেশন এক ছুঃসাধ্য ব্যাপার। লেখক অকপটে তাঁর সীমিত জ্ঞান স্বীকার করে পরবর্তী কোন সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অপেক্ষা করছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

"The transfer of a mathematical way of thought to the rest of our intellectual effort is in a sense, an application of mathematics. Precise numerical answer is not usually required and may not even be consistent with the input and output structure of a model."

Cambridge Report.

লেখন ও প্রাচীন সংখ্যা

ভারতবর্ষে কবে লিখিতরূপের আবিষ্কার হয়েছিল আজ আর তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব বলে মনে হয় না। অজাবধি আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপি হচ্ছে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি। খরোষ্ঠী লিপির বিদেশী উৎস সম্পর্কে মতভেদ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য মনীষী এই লিপির বিদেশী উৎসে বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন ব্রাহ্মী লিপির উৎস হচ্ছে সেমীয়-লিপি। সে যা হোক, এই লিপির প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে, অশোকের সময় কালের। এখন প্রশ্ন,—ভারতে কি তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে কোন লিপির প্রচলন ছিল না? পণ্ডিতরা বলেন বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে লিখিত রূপের প্রচলন ছিল। বশিষ্ট ধর্মগ্রন্থে এর ইঙ্গিত আছে। এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটি অত্র কোন প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ—ঋগ্বেদে "আট" সংখ্যাটির উল্লেখ আছে। "সহস্রানি দদাতো অষ্টকর্ষাঃ"—"কর্ণে অষ্ট-চিহ্নিত এক হাজার গাভী আমাকে দাও।" ঋগ্বেদের এই উদ্ধৃতিটি তখনকার যুগে সংখ্যার লিখিতরূপ নির্দেশ করে। এখনো পল্লীগ্রামে গোকর কানে ও শরীরের অত্র অংশে লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দিয়ে চিহ্ন দেওয়ার রীতি আছে। অবশ্য যদিও অত্র কারণে দেওয়া হয়, তবুও এর মধ্যে আমরা সেই প্রাচীন ঋগ্বেদীয় ঐতিহ্যের ও রীতির অনুবর্তন দেখতে পাই। এছাড়াও বৈদিক যুগে বে লেখার প্রচলন ছিল ঋগ্বেদে তার অনেক প্রমাণ আছে। এ-প্রসঙ্গে স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির Vedic Culture গ্রন্থ থেকে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হলো : It is suggested by many persons that in the Vedic

Age the art of writing was unknown ; hence the Vedas were committed to memory and thus handed down orally from generation to generation but Riks 6.53.7 and 8 clearly refer to the existence of a script, vide “Ārikha kikirā krinu”. Letters of the alphabet are mentioned in Rik 10. 13. 3. Rik 10. 71 sukta is about the learning of languages and the knowledge Absolute.”

সপ্তম খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পানিনির ব্যাকরণে ‘স্বৰশাস্তি’ ‘লিপিকার’ ‘লিবিকার’ শব্দগুলিও সেকালে লেখার প্রচলনের সাক্ষ্য দেয়।

বর্তমানে ব্রাহ্মীলিপির বিদেশী উৎস স্বীকার করা হয়না। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত শীলমোহর ও ঐক্ললিপি তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতে প্রচলিত লিখিত রূপের সাক্ষ্য বহন করে বলে মনে করা হয়।

॥ প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা ॥

প্রথম অধ্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহর ও ঐক্ললিপিতে সংখ্যার কথা আলোচিত হয়েছে। সিঙ্কু-লিপিতে এক থেকে বারো অথবা তেরো পর্যন্ত সংখ্যার নমুনা পাওয়া গেলেও, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ ঐক্লতি বড় বড় সংখ্যা তাঁরা কেমনভাবে লিখতেন, তার কোন পরিচয় আমাদের জানা নাই। সিঙ্কুসভ্যতা থেকে অশোকের সময় পর্যন্ত প্রায় 2700 বছরের ব্যবধান। সুদীর্ঘ এই মধ্যবর্তী সময়কাল কোন লিখিত রূপের আবিষ্কার আজও সম্ভব হয়নি। এই হ্রস্বগণের সম্ভাবহার করে তাই অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন ষষ্ঠম শতাব্দীর পূর্বে এ-দেশে লিখিতরূপের প্রচলন ছিলনা। কিন্তু তা না মানার যথেষ্ট কারণ আছে।

॥ ব্রাহ্মীলিপির ভারতীয় উৎস ॥

বিদেশী নানা প্রাচীন লিপির সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অধিকাংশই ব্রাহ্মীলিপির বিদেশী উৎস সমর্থন করেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যের অন্তর্গত এই মতবাদ স্বীকার করা যায় না। এই সম্পর্কে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্সপেক্টর মতবাদটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর মতে চার হাজার বছর পূর্বে ভারতীয়রা লেখা-শিল্পে পারঙ্গম ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৬^শ হাজার বছর পূর্বে ভারতীয়রা 10^০ সংখ্যাটির ব্যবহার করেছেন, আবার 10^{১০} পর্যন্ত সংখ্যার নামকরণও দেখতে পাওয়া যায়। এ-সব থেকে প্রমাণিত হয় যে ভারতে অতি

প্রাচীনকালে পাটীগণিতের বথেষ্ট সম্বন্ধি ঘটেছিল। লিখিত রূপের প্রচলন না থাকলে এটা যে সম্ভব নয়, এ-অনুমান অসম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন সব ধর্মগ্রন্থেই স্ফটিকর্তা ব্রহ্মা সংখ্যা লিখন ও ব্রাহ্মীলিপির জনক বলে অভিহিত হইতেন। ব্রাহ্মী শব্দের মধ্যে ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের সম্পর্ক থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

॥ খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপিতে সংখ্যা ॥

সম্রাট অশোক ও তাঁর পরবর্তীকালের অধিকাংশ প্রত্নলিপিই দু'প্রকার লিপিতে লেখা,—খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপির বিস্তার কাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। সম্রাট অশোকের খরোষ্ঠী প্রত্নলিপিতে মাত্র চারটি সংখ্যা পাওয়া যায়। উল্লম্ব রেখার দ্বারা এখানে সংখ্যা প্রকাশ করা হইছে :

1	2	3	4	4
				X

চিত্র—10 খরোষ্ঠী লিপি

শক, পার্শিয়ান ও কুষাণ-যুগে আরো উন্নত ধরনের সংখ্যা ব্যবহার দেখা যায় :

1	2	3	4	5	6	7	8
			X	IX	X	X	XX
10	20	40	50	60	70	80	
?	3	33	'33	333	'333	3333	
		100	200	300			
		LI	LII	LIII			

চিত্র—11 শক-পার্সিয়ান-কুষাণ যুগের সংখ্যা

এখানে সংখ্যার ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্যকর। অশোকের প্রত্নলিপিতে

যেখানে ৪ সংখ্যাটি চারটি উল্লম্ব রেখার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল, শক-পাণ্ডিয়ান যুগে সেই সংখ্যাটি ক্রশ-চিহ্ন (+) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। চারটি উল্লম্ব রেখার ক্রশ-চিহ্নে রূপান্তরের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ জানতে পারা যায় না। হয়তো চার দিক নির্দেশের মধ্যে চার-এর ইঙ্গিত আছে, বা সহজ সরলীকরণ। চার সংখ্যার পর যোগের নিয়ম অঙ্কন্যত হয়েছে আট পর্যন্ত। কিন্তু 'নয়' কেমন ছিল তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অঙ্কমান করা হয় যোগের নিয়মটি 'নয়' পর্যন্ত অঙ্কন্যত হয়েছিল। তা হলে এই সংখ্যাটি 1x-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকবে। অবশ্য এ-সবই অঙ্কমান। হয় তো 'নয়' সংখ্যার অঙ্ক কোন পৃথক চিহ্ন থাকতেও পারে।

ভারতে ব্রাহ্মীলিপির বহুল প্রচলন ছিল, আর এই লিপি থেকেই বর্তমানের ভারতীয় লিপিসমূহের উদ্ভব। এই লিপির অতি প্রাচীন নিদর্শন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। নিম্নের লিপিগুলি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর :

1	2	4	6	50
		+	৫৫	৩.০

চিত্র—12 খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মীসংখ্যা

এরপর প্রাচীন সংখ্যার নিদর্শন মধ্যভারতের নানাঘাট পর্বতে পাওয়া যায়। সাতবাহন বংশের রাজা বেদিশ্রী কর্তৃক পণ্ডিকদের বিশ্রামের জন্তু এই পর্বতগাত্রে একটি গুহা নির্মিত হয়। এখানকার শিলালিপিতে বিভিন্ন যজ্ঞে প্রদত্ত উপহার সামগ্রীর তালিকা আছে। নানাঘাট সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ :

1	2	4	6	7	9	10	20
—	=	γγ	৮	৯	৯	ααα	০

চিত্র—13 নানাঘাট সংখ্যা

বোম্বাই-এর নাসিক জেলায় প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ :

1 —	2 ==	3 ≡	4 ¥ ¥	5 n 7
6 4	7 7	8 4 4	9 2	10 α α

চিত্র—14 নাসিক সংখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়

“The history of mathematics is important also as a valuable contribution to the history of civilization... Mathematical and physical researches are a reliable record of intellectual progress.”

—F. Cajori

জৈন গণিত

জৈন ধর্মে গণিতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গণিতানুশীলন পরিগণিত হতো। জৈন ধর্মের সর্ব প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব বাহাস্তর কলার প্রধান হিসাবে গণিতের নাম উল্লেখ করেছেন। অরিস্টেনেসী ও মহাবীর বর্ধমানের শিক্ষা-সূচীতে গণিতের নাম পাওয়া যায়, অবতারণায় আমরা এ-সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গণিতের প্রতি জৈনদের আগ্রহ, উৎসাহ ও আকর্ষণ থাকলেও, এমন কি জ্ঞানের এই শাখায় তাঁদের মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার থাকলেও, আজ আর সে-সবের পৃথক কোন গ্রন্থ নাই। জৈন ধর্মাবলম্বী মহাবীরের স্মায় কোন গণিত গ্রন্থ আর কোন জৈনদের দ্বারা লিখিত হয়নি, অথবা লিখিত হলেও তা কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। জৈনদের গণিত সম্পর্কে আকর্ষণ ও গাণিতিক উপাদান তাঁদের বিশাল আগম শাস্ত্রাদিতে ছড়িয়ে আছে। গণিতজ্ঞ মহাবীরের বিবৃতি থেকে জানতে পারা যায় যে, তাঁর গণিত-সার-সংগ্রহ একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। তাঁর পূর্ববর্তী মহান ঋষিরা যে অসীম গাণিতিক জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, তিনি সেখান থেকেই তাঁর গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। স্মরণ্য বৃত্তে অসুবিধা হয় না এক সময় জৈন আচার্যরা বিশাল গাণিতিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং হয়তো এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন।

॥ সংখ্যাতত্ত্ব ॥

জৈন গণিতে সংখ্যা তিন ভাগে বিভক্ত : (1) সংখ্যাত বা সংখ্যায়, (2) অসংখ্যাত বা অসংখ্যায় এবং (3) অনন্ত। যে সংখ্যা অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা যায় তা-ই সংখ্যাত বা সংখ্যায়। একক থেকে আরম্ভ করে আঠাশটি অঙ্ক

নিম্নে যে সংখ্যা হয় তা সংখ্যাত বা সংখ্যায়। এর অতিরিক্ত সংখ্যাকে অসংখ্যাত বা অসংখ্যায় বলা হয়। অসংখ্যায় সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, —উপমা দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। যেমন, পল্যোপম ও সাগরোপম। কিন্তু অসংখ্যাত বা অসংখ্যায় অনন্ত বা অসীম নয়। অসংখ্যায় সীমার অন্তর্গত। যখন কোন সংখ্যা সীমার অতিরিক্ত, তখন তাকে আর উপমার দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না,—তখন অনন্ত সংখ্যার আবির্ভাব। সংখ্যাত, অসংখ্যাত ও অনন্তের আবার তিন প্রকার করে বিভাগ আছে,—জঘগ, অধম ও উৎকৃষ্ট। তিন প্রকার সংখ্যার আবার কোন কোনটির প্রবিভাগ আছে।

অনন্ত পাঁচ প্রকার : (1) একতো অনন্তং (2) দ্বিমানন্তং (3) দেশবিস্তারনন্তং (4) সর্ববিস্তারনন্তং (5) শাস্তানন্তং।

উত্তরাধায়ন সূত্রে ‘অনেগবাসাণউয়া’ বা নবযুতবর্ষের উল্লেখ আছে। ঠিকাকারের মতে নবযুতবর্ষের তাৎপর্য হচ্ছে অসংখ্য বৎসর। কারণ, চুরাণী লক্ষ বৎসরে এক পূর্বাক্ষ ; এই পূর্বাক্ষকে চুরাণী লক্ষ দিয়ে গুণ করিলে এক পূর্ব হয়। পূর্বকে চুরাণী লক্ষ দিয়ে গুণ করলে এক মবতাক্ষ হয়। এক মবতাক্ষকে চুরাণী লক্ষ দিয়ে গুণ করলে এক মযুত হয়। অর্থাৎ জৈন গণিতে সংখ্যাতক্ষে চুরাণী লক্ষ গুণোত্তর পদ্ধতি নামে এক নতুন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ভারতীয় গণিতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ আর কোথাও দেখা যায় না।

দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন প্রণালী ছাড়া অল্প কোন পদ্ধতি জৈন-যুগে প্রচলিত ছিল কি না জানা যায় না। বৈদিক যুগে প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক পৃথক নাম ছিল। কিন্তু জৈন-যুগে একাধিক সংখ্যা যুক্ত করে সংখ্যার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন,—এক, দশ, শত, সহস্র, দশ-সহস্র, দশ-শত-সহস্র, কোটি, দশ-কোটি, শত-কোটি। ঐগুলি যথাক্রমে 1, 10, 100, 1000, 10 000, 10 00 000, 10^7 , 10^8 এবং 10^9 । একাধিক সংখ্যা যুক্ত করে সংখ্যা গঠনের পিছনে বিশাল বিশাল সংখ্যা গঠনের ইতিহাস আছে।

আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও জৈন ও বৌদ্ধদের মত বৃহৎ সংখ্যার ব্যবহার ও নামকরণ দেখা যায় না। একটি সংখ্যায় রাশি কত বড়? জৈন গণিতজ্ঞ বলেন, “পৃথিবীর আয় ব্যাস বিশিষ্ট একটি পাত্রে একটি একটি করে গণনা করে সরিষা দ্বারা পূর্ণ কর। অল্পরূপভাবে স্থল ও সমুদ্রের আয় পাত্রগুলি পূর্ণ কর। তবুও সংখ্যায় রাশি গঠন সম্ভব নয়।” খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতা-বিস্তারে 10^{55} পর্যন্ত সংখ্যার নাম আছে। কচ্ছায়নের পালি ব্যাকরণে 10^{140}

সংখ্যাকে অসংখ্য বলি হয়েছে। বর্তমানে 10^{100} -কে ‘গোগুল’ বলে। জৈন ও বৌদ্ধ গণিতজ্ঞরা তারো অনেক উপরে। নিম্নে জৈনদের সময় সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টি একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

(1) এক পূর্বি—75600, 000, 000, 000 বৎসর।

(2) এক শীর্ষ প্রহেলিকা—(8, 400 000)^{১০} পূর্বি। এই সংখ্যাটিতে 194টি অঙ্ক আছে !!

বিশ শতাব্দীতে ক্যান্টর অনন্ত তত্ত্বের আবিষ্কারক। নতুন সংখ্যার আবিষ্কার হলো আলেফ-জিরো (Alef-Zero)। এ-ও এক বৃহৎ সংখ্যা—অনন্ত সংখ্যা নামে পরিচিত। কিন্তু জৈন গণিতজ্ঞদের দৃষ্টি যেন আরো সুদূর প্রসারিত। *A Concise History of Science in India* গ্রন্থে S. N. Sen বলেছেন, “The highest numerable number of the Jainas reminds us of the Alef-Zero of modern mathematics, and the Jaina imagination clearly went much farther than that.”

॥ গণিতের বিষয়বস্তু ॥

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর জৈন গ্রন্থ স্বামিন্দ-সূত্রে গণিতের বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে। জৈন গণিতজ্ঞদের মতে গণিতের বিষয়বস্তু দশটি,—পরিকর্ম, ব্যবহার, রজ্জু, রাশি, কলা সর্বণ, যাবৎ-তাবৎ, বর্গ, ঘন, বর্গ-বর্গ ও বিকল্প। জৈন গ্রন্থে এই গাণিতিক পরিভাষার সঠিক অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু গণিতের বৈশিষ্ট্য তার সর্বজনীনতায়। তাই পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও একই পরিভাষা ব্যবহার করায় এদের অর্থ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। অর্থগুলি নিম্নরূপ :

(1) পরিকর্ম—প্রাথমিক চার নিয়ম।

(2) ব্যবহার—প্রযুক্তি পাটীগণিত।

(3) কলা সর্বণ—ভগ্নাংশ।

(4) রজ্জু—তত্ত্ব বা জ্যামিতি।

(5) রাশি—রূপ, শব্দ পরিমাপ বিষয়ক সামন্তলিক ও ঘন বস্তু সম্পর্কিত পরিমিতি।

(6) বর্গ—বর্গ।

(7) ঘন—ঘন।

(8) বর্গ-বর্গ—উচ্চতর ঘাত বিষয়ক সমস্তা এবং বর্গমূল।

(9) **যাবৎ-তাবৎ**—অজ্ঞাত রাশি। জৈন গণিতে ঠিক কি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে বীজগাণিতিক অর্থে যে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। অজ্ঞাত রাশি দ্বারা পাটিগাণিতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয়েছে বলেও মনে করা হয়।

(10) **বিকল্প**—জৈন গণিতে সমবায় ও বিকাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

॥ পরিকর্ম—প্রাথমিক চার নিয়ম ॥

উদাহারিত গ্রন্থে গুণ ও ভাগের দুই প্রকার পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়। একটি বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির অল্পরূপ এবং অত্রটি উৎপাদক সম্বলিত। উৎপাদকের সাহায্যে গুণনের পদ্ধতি ব্রহ্মগুপ্ত ও পরবর্তী গণিতজ্ঞদের গ্রন্থে দেখা যায়। শ্রীধরের ত্রিশতিকায়ে উৎপাদকের সাহায্যে ভাগহার দেখা যায়।

॥ কলা সর্বণ—ভগ্নাংশ ॥

অপ্রকৃত ভগ্নাংশের আসন্ন মান নির্ণয়ে জৈন গণিতজ্ঞরা চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যখনই কোন অপ্রকৃত সংখ্যার ভগ্নাংশটি 1-এর চেয়ে কম হয়েছে, তখনই তাঁরা সেই অংশটি উপেক্ষা করেছেন; আবার যখন ভগ্নাংশটি $\frac{1}{2}$ এর অধিক হয়েছে, তখন তাঁরা ভগ্নাংশটিকে 1-এর সামিল করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ,

315089 $\frac{218079}{630178}$ এর স্থলে 315089 এবং 3 8314 $\frac{553404}{636628}$ -এর স্থলে

318315 ধরে নেওয়া হয়েছে।

॥ বজ্জু—জ্যামিতি ॥

বৈদিক যুগের গ্রন্থ জৈন যুগেও ‘বজ্জু’ শব্দটি জ্যামিতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জৈন জ্যামিতির কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ হলো ‘সমচক্রবাল-বৃত্ত’ (বৃত্ত), ‘ব্যাসাধ’, ‘জীব’ (জ্যা), ‘ধনুপৃষ্ঠ’ (চাপ), ‘সম-চতুরঙ্গ’ (বর্গ), ‘চতুরঙ্গ’ (চতুর্ভুজ), ‘আয়ত্ত’ (আয়তক্ষেত্র), ‘ত্র্যশ’ (ত্রিভুজ), ‘প্রতর’ (সমতল), ‘ঘন-ত্র্যশ’ (ত্রিভুজ পিরামিড), ‘ঘন-চতুরঙ্গ’ (ঘনক), ‘ঘন-বৃত্ত’ (গোলক) প্রভৃতি।

ভস্করাধিগম-সূত্র ভাষ্যে বৃত্তীয় পরিমিতির অনেকগুলি সূত্র প্রদত্ত আছে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো :

(1) বৃত্তের পরিধি— $\sqrt{10} \times$ ব্যাস

(2) বৃত্তের ক্ষেত্রফল— $\frac{1}{2} \times$ পরিধি \times ব্যাস

$$(3) \text{ জ্যা} = \sqrt{4\text{শর}(\text{ব্যাস}-\text{শর})}$$

$$(4) \text{ শর} = \frac{1}{2} [\text{ব্যাস} - \sqrt{(\text{ব্যাস})^2 - (\text{জ্যা})^2}]$$

$$(5) \text{ অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর চাপ} = \sqrt{(\text{শর})^2 + (\text{জ্যা})^2}$$

$$(6) \text{ ব্যাস} = \frac{(\text{শর})^2 + \frac{1}{2}(\text{জ্যা})^2}{\text{শর}}$$

এখানে ‘শর’ শব্দের অর্থ উচ্চতা।

॥ π -এর আসন্ন মান ॥

প্রায় 2000 বছর ধরে জৈন গণিতজ্ঞরা π -এর আসন্ন মান $\sqrt{10}$ ধরে এসেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সূর্য-শ্রেঙ্খতি-তে π -এর দুটি মান হলো 3 এবং $\sqrt{10}$ । কিন্তু গ্রন্থকার প্রথম মানটি বর্জন করে দ্বিতীয় মানটি গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে $\pi=3$ প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে গণিতের আরো উন্নতির ফলে ওই মানটি বর্জিত হয়।

॥ জম্বু-দ্বীপ বা পৃথিবী বিষয়ে ধারণা ॥

জৈন চিন্তাধারায় জম্বু-দ্বীপ বা পৃথিবী বৃত্তাকার এবং ছয়টি সমান্তরাল পর্বতের দ্বারা সাতটি অংশে বিভক্ত। পৃথিবীর ব্যাস 100,000 যোজন, পরিধি 316221 যোজন 3 গব্যুতি 128 ধনু 1 34 অঙ্গুলির কিছু বেশী এবং ক্ষেত্রফল 7905694150 যোজন 1 গব্যুতি 1515 ধনু 60 অঙ্গুলি। অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত জৈন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ লম্বাচার্য তাঁর শিঙ্কবীজ্জিন নামক গ্রন্থে বলেছেন পৃথিবীর পৃষ্ঠফল 2856338557 যোজন। দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ দ্বিতীয় ভাস্কর লম্বাচার্য নির্ণীত ফলের শতাংশও বাস্তব পৃষ্ঠফল নয় বলে তাঁর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ভাস্করের এই মত মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, লম্বাচার্য ব্যবহৃত একক ও ভাস্কর ব্যবহৃত এককের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তেমন বিচিন্তনয়। দেন-যুগে লক্ষণ সেনের সময় জমি পরিমাপের জন্য ‘নয়’ ব্যবহৃত হতো। ঐতিহাসিকরা অহুমান ক.য়ন বিজয় সেনের হাতের মাপের দৈর্ঘ্য ওই যুগে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে লম্বার ফলের সঙ্গে ভাস্করের ফলের পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। শুধু যুগেও একক সর্বত্র সমান ছিল না।

॥ সূচক ॥

জৈন সাহিত্যে সূচকের নামকরণের চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অম্বুযোগ-দ্বার-সূত্রে ঘাত ও বর্গমূলের নাম প্রথম বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ, তৃতীয় বর্গ, ..., এবং প্রথম বর্গমূল, দ্বিতীয় বর্গমূল প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান গাণিতিক চিহ্নে এদের নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :

$$(1) \text{ প্রথম বর্গ} = (a) - a^2$$

$$(2) \text{ দ্বিতীয় বর্গ} = \{(a)^2\}^2 - a^4$$

$$(1) \text{ প্রথম বর্গমূল} = \sqrt{a} - a^{\frac{1}{2}}$$

$$(2) \text{ দ্বিতীয় বর্গমূল} = \sqrt{(\sqrt{a})} - a^{\frac{1}{4}}$$

$$(3) \text{ তৃতীয় বর্গমূল} = \sqrt{\{ \sqrt{(\sqrt{a})} \}} - a^{\frac{1}{8}}$$

উত্তরাধার্যন সূত্রের বিবৃতি থেকে জানতে পারা যায় ঘাতের নামকরণে বর্গ, ঘন, বর্গ-বর্গ (চতুর্থ ঘাত), ঘন-বর্গ (ষষ্ঠ ঘাত), ঘন-বর্গ-বর্গ (দ্বাদশ ঘাত) এবং মূল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় বর্গ-মূল-ঘন $= \{(a^{\frac{1}{2}})^2\}^2 - a^4$ ব্যবহৃত হয়েছে।

অম্বুযোগ-দ্বার-সূত্রে একটি বিবৃতি থেকে দেখা যায় প্রথম বর্গমূল \times দ্বিতীয় বর্গমূল $=$ দ্বিতীয় বর্গমূলের ঘন $= a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{1}{2}})^2 = a^1$ । এই গ্রন্থে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা 29টি অঙ্কে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বৃহৎ সংখ্যাটি ষষ্ঠ বর্গের ও পঞ্চম বর্গের গুণফল অর্থাৎ $2^6 \times 2^5 = 2^{11} \times 2^{10} = 79, 218, 162, 514, 264, 337, 593, 543, 950, 336 !!!$ এখানে আরো বলা হয়েছে যে, সংখ্যাটি 2^{10} দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং এই তথ্য থেকে আমরা সূচক-সূত্র পাই :


$$(1) a^m \times a^n = a^{m+n} \text{ এবং } (2) (a^m)^n = a^{mn}$$

॥ বিকল্প—সমবায় বিজ্ঞান ॥

ভারতীয় গণিতের সমবায় ও বিজ্ঞানের ধারণার প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। বৈদিক যুগে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃজনে এই ধারণার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জৈন গণিতজ্ঞরাই এই বিষয়টি গণিতের অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। মহাবীরাচার্যের গণিত-সার-সংগ্রহে সমবায় ও বিজ্ঞানের সূত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পূর্বেও এ-বিষয়ে সূত্র রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ভগবতী-সূত্র, অম্বুযোগ-দ্বার-সূত্র ও জম্মু-দ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি-তে সমবায়ের ধারণা আছে। সূত্রের রসভেদ বিকল্পাধ্যায়ে ছয়টি রস থেকে 1, 2, 3 প্রভৃতি

করে নিয়ে ৬৩টি সমবায় গঠনের কথা বলা হয়েছে। সমবায় অর্থে বিকল্প শব্দটি জৈনদেরও পূর্ববর্তী। পিঙ্গলের ছন্দস্থত্রে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। কিন্তু জটিল স্লোকের অষ্টোপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যেন আরো জটিল। দশম শতাব্দীর পিঙ্গলের ভাষ্যকার হলাম্বুধের ব্যাখ্যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। হলাম্বুধের ব্যাখ্যা :

শীর্ষে একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কনের পর তার নিম্নে দুটি বর্গক্ষেত্র এমনভাবে অঙ্কন কর যাতে তাদের অর্ধাংশ প্রথম বর্গক্ষেত্রের নিম্নে থাকে। অতঃপর তার নিম্নে তিনটি,—তার নিম্নে চারটি প্রভৃতি বর্গক্ষেত্র একই নিয়মে অঙ্কন কর যতক্ষণ না আকাঙ্ক্ষিত পিরামিড প্রস্তুত হয়। শীর্ষ বর্গক্ষেত্রে ১ বসাঁও এবং প্রত্যেক স্তরের প্রান্তীয় বর্গক্ষেত্রে ১ বসাঁও। অন্ত্যন্ত বর্গক্ষেত্রে ঠিক তার উপরের বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের যোগফল বসাঁও। এইভাবে যে চিত্র অঙ্কিত হবে তার নাম “মেরু প্রস্তর”।



চিত্র—১৫ মেরু-প্রস্তর

চিত্রটি থেকে এই সূত্রটি পাওয়া যায় : $n+1C_r = nC_r + nC_{r-1}$ । পাশ্চাত্য গণিতের ইতিহাসে এই চিত্রটি ‘পাসকালের ত্রিভুজ’ নামে পরিচিত। কিন্তু ‘মেরুপ্রস্তর’ পাসকালের ত্রিভুজের চেয়ে সহজ। মেরু-প্রস্তরের ধারণা পাসকালের দু’হাজার বছর পূর্বেকার, হলাম্বুধের ব্যাখ্যাই তো কমপক্ষে ছ’শ বছর পূর্বের।

বিভিন্ন জৈন গ্রন্থে প্রাপ্ত সমবায় ও বিহাসের সূত্রগুলি আধুনিক পরিভাষায় নিয়রূপ :

$$(1) nC_1 = n; (2) nC_2 = \frac{n(n-1)}{1.2}; (3) nC_3$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)}{1.2.3}$$

$$(1) nP_1 = n; (2) nP_2 = n(n-1); (3) nP_3 = n(n-1)(n-2)।$$

॥ দু'জন অগণিতজ্ঞ জৈন আচার্যের জীবনী।

ভদ্রবাহু ও উমাস্বামী গণিতজ্ঞ ছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থে যে-সব গাণিতিক উপাদান ছড়িয়ে আছে তা থেকে এমন অনুমান করা যায় যে গণিতে তাঁরা একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। অতঃ কেবলিম ভদ্রবাহু নিঃসন্দেহে উমাস্বামীর পূর্ববর্তী।

ভদ্রবাহু

ভদ্রবাহু ছিলেন 'অতঃ কেবলিম' অর্থাৎ সময়গ্র জৈনশাস্ত্র তাঁর মুখস্থ ছিল। মগধের অধিবাসী ভদ্রবাহু গৃহী ছিলেন না,—ছিলেন দিগম্বর সন্ন্যাসী। সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকায় তাঁর বাস্তব জীবনের কোন কাহিনী জানা যায় না।

একটি কিংবদন্তী অনুসারে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধে দীর্ঘ বারো বছর ধরে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। মহাজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ ভদ্রবাহু নাকি পূর্বেই গণনা করে ভাবী দুঃসময়ের বিষয় অবগত হন। সে-কারণে তিনি অসংখ্য শিষ্ণুসহ দক্ষিণ ভারতের কন্নড় দেশে গমন করেন এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তিনি গণধর ছিলেন এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নাকি শেষ বয়সে "শ্রাবণ বেলগোলা" পর্বতে জৈনধর্মাত্মমোদিত 'সম্মেখনা' (অনশন ব্রত) অবলম্বন করে নখর দেহ ত্যাগ করেন। এখনো এই 'শ্রাবণ বেলগোলা' পর্বতে অসংখ্য জৈন মন্দির ও শিলালিপি জৈন অভ্যাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক সত্য যে, দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের এই অঞ্চলে নানা বংশের নৃপতিরা জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

ভদ্রবাহুর দক্ষিণ ভারত গমনকালে অনেক শিষ্যই তাঁর সঙ্গে যাননি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রাকোপে এই জৈনরা তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান অঙ্গুল রাগতেও পারেন নি। খেতবস্ত্র পরিধান এই সময় থেকেই এক শ্রেণীর জৈনদের মধ্যে প্রচলিত হয়। ফলে, জৈনধর্মের দুটি শাখা,—দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বরের সূচনাও শুরু হয়।

ভদ্রবাহুর নির্বাণ-স্থান ও নির্বাণ-বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্বের মতে শ্রীবীর নির্বাণের 170 বছর পরে ভদ্রবাহুর পরিনির্বাণ হয়েছিল।

জৈনদের নিকট ভদ্রবাহু উত্তরাধ্যয়ন সূত্র ও কল্পসূত্রের লেখক হিসাবে অধিক পরিচিত। কিন্তু তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ ভদ্রবাহুর সময়ে ভারতে কোন লিপি প্রচলিত ছিল বলে জানা যায় না। সম্রাট অশোকের সময় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন ছিল বটে, কিন্তু তার পূর্বের কোন লিপির অস্তিত্ব এখনো জানা যায় নি। তাছাড়া গণধর ঋত কেবলিন ভদ্রবাহু যিনি সমুদয় জৈনগ্রন্থ মুখস্থ করে বেখেছিলেন, তাঁর পক্ষে কোন গ্রন্থ রচনা বাহুল্য মনে করাই স্বাভাবিক। তাঁর নামে প্রচলিত গ্রন্থসমূহ হয়তো তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী অবলম্বনে পরবর্তী কালে কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচনা।

॥ উমাস্বামী ॥

উমাস্বামী নামের সঙ্গে তাঁর পিতা ও মাতার নাম জড়িত আছে বলে মনে করা হয়। একরূপ বলা হয়, তাঁর পিতার নাম স্বামী ও মাতার নাম উমা। অত্যাশ্চর্য্য অনেক জৈন আচার্য্যদের সময়-কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও উমাস্বামীর সময় নিয়ে কোন সংশয় নাই। তিনি ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নাগোধিকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানটি কুস্থমপুরের অন্তর্গত। ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে কুস্থমপুর একটি স্মরণীয় নাম। এখানেই আচার্য্য আর্ষভট জন্মগ্রহণ করেন। মনে হয়, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল থেকেই কুস্থমপুর উচ্চতর গণিত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে এখানে গণিতের গবেষণা ও অধ্যাপনা চলতে থাকে।

ভদ্রবাহুর মত উমাস্বামীও গণিতজ্ঞ ছিলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর রচিত ‘তত্ত্বার্থাশিগম-সূত্র’ ভাব্যে প্রচুর গাণিতিক উপাদান আছে। অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থ থেকে অনেক গাণিতিক সূত্র উদ্ধৃত করলেও গণিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল না, এমন কথা বলা যায় না।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ভারতীয় গণিতের উন্নতি ও সংস্কার সাধনে জৈনদের বিশিষ্ট অবদান আছে। এক সময় তাঁদের গাণিতিক প্রতিভা অত্র ধর্মে ও মতে বিশ্বাসী গণিতজ্ঞদের মুগ্ধ করেছিল। জৈনদের আবিষ্কৃত গাণিতিক পরিভাষা পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা নির্দিষ্টাঙ্গ গ্রহণ করেছেন। জৈন ধর্ম উদ্ভবের মূলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিরোধ থাকলেও উভয় ধর্মের গণিতজ্ঞদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিলনা। গণিতের সর্বজনীনতার এমন মহৎ দৃষ্টান্ত আর অত্র কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

॥ অষ্ট অধ্যায় ॥

“No subject loses more than mathematics by an attempt to dissociate it from its history.” —Glashier.

বকশালী পাণ্ডুলিপি

বাংলা সাহিত্যে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গ্রন্থখানি যেমন বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কোন এক গ্রামের একটি বাড়ীর গোয়ালঘরের মাচা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তেমনি ‘বকশালী পাণ্ডুলিপি’ নামাঙ্কিত গণিত গ্রন্থটিও পেশোয়ারের নিকট একটি গ্রামের কৃষকের খননের ফলে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভূর্জবৃক্ষের বকলে লিখিত এই গ্রন্থখানি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। সমগ্র গণিত গ্রন্থটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি,—মাত্র সত্তরটি পাতা, তাও আবার কয়েকটি শতছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভারতের জলবায়ু এবং বিখ্যাত বন্দীক গ্রন্থটির কতখানি গ্রাস করেছে, তা আর আজ জানা যাবে না। হায়, যদি সমগ্র গ্রন্থটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যেত! তা হ’লে হয়তো আমরা প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়গুলি সংযোজিত করে একটি ক্রমিক বিবরণ দিতে পারতাম। গ্রন্থটি গাথা ভাষায় সারদা লিপিতে লিখিত।

কোলকাতা, ম্যাক্সমুলার প্রত্নতত্ত্ব পাঠ্যমণ্ডল মনীষীরা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন গবেষণা করে যেমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি ভারতবাসীর সপ্রশংস অঙ্গাণু পেয়েছেন। কিন্তু ‘বকশালী পাণ্ডুলিপি’-র অন্বেষণক জি. আর. ক্যে (Kaye) সাহেব যেন সচেতনভাবে ভারতীয় কৃতিত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন না করে তা বিকৃত ও নিম্নমান করার প্রচেষ্টা করেছেন। অধ্যক্ষ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর ‘প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা’ গ্রন্থে এই মনোভাবের বিষয়ে বলেছেন, “এককালে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের একটি বহুমূল্য ধারণা ছিল যে হিন্দুরা বৈজ্ঞানিক যে সমৃদ্ধ তথ্য জানিত তাহার প্রায় সকলই বিদেশ হইতে শিখিয়াছিল। তাঁহাদের মতে গ্রীসই ছিল সমৃদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস এবং ইহার নিকটই ভারতবর্ষ বিশেষভাবে স্থগী ছিল।.....”

গ্রীকেরা যে ইহার (ত্রিকোণমিতির সাইন) ব্যবহার জানিত এরূপ কোন প্রমাণ অতাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ইহার প্রচলন ছিল। তথাপি ইউরোপীয় কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা যে হিন্দুরা গ্রীকগণের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছিল।” উক্তটি আর দীর্ঘ না করে এক কথায় বলা যায় যে, এখনো অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় কৃতিত্বের প্রকৃত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে কার্পণ্য বোধ করেন।

এই পাণ্ডুলিপি কোন সময়ে রচিত বা কে এই গ্রন্থের রচয়িতা, এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে দেশবিদেশী অনেক পণ্ডিত এর উদ্ভব-কাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী বলে মনে করেন। কিন্তু কো সাহেব অত প্রাচীনতা স্বীকার করেন না। তিনি এর ভাষা ও লিপির উপর শাণিতযুক্তির ছুরি চালিয়ে একে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন। এ-বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় গণিতে বিশেষজ্ঞ সুপণ্ডিত ডঃ বিভূতিভূষণ দত্তের মতটি প্রাধান্যবোধ্য। তিনি বলেন, কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় ভাষা ও লিপির দ্বারা উদ্ভব-কাল নির্ণয় না করে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করতে হবে। এই গ্রন্থের গাণিতিক রীতি, পদ্ধতি, সাংকেতিক চিহ্ন ও পরিভাষার উপর ভিত্তি স্থাপন করে তিনি এর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলে মনে করেন।

এই গ্রন্থটি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থের অঙ্কলিপি বা করণ গ্রন্থ (ভাষ্য)। গ্রন্থ রচনার বৈশিষ্ট্য, নানা বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা, পুনরুক্তি, পূর্ববর্তী আলোচনার উল্লেখ প্রভৃতি থেকে অন্তত তা-ই মনে হয়। গ্রন্থটিতে পাঁচ ধরনের হস্তলিপি আছে। কোন ব্রাহ্মণ গণিতজ্ঞ এর লেখক। তাঁর পিতার নাম ছজক। তিনি তাঁর পুত্র বশিষ্ঠ ও পরবর্তী বংশধরদের জন্য এই গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু ছজক পুত্র এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা নন,—অঙ্কলিপিকার মাত্র।

বকশালী পাণ্ডুলিপির যুগে গাণিতিক পরিভাষা তখনো স্ফজন-স্তরে। তাই এতে ব্যবহৃত শব্দগুলি তখনো সাধারণীকৃত হয়নি। সে কারণে পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা এসব শব্দ ব্যবহার করেননি। ভগ্নাংশের সমহরে পরিবর্তনের নাম ‘সর্বণন’। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে এর স্থলে ‘সদৃশ করণ’ বা ‘হরসাম্যকরণ’ ব্যবহৃত হয়েছে। গাণিতিক সমস্রাকে ‘স্তাস’ না বলে ‘স্থাপন’, কখনো কখনো ‘স্তাস’ বা ‘স্তাস-স্থাপন’ বলা হয়েছে। সাধারণত ‘শ্রেণী-’কে ‘শ্রেণী’ বলা হয়,

কিন্তু এখানে ‘বর্গ,’ ‘পার্শ্ব’ ও ‘রূপণ করণ’ বলা হয়েছে। ভারতীয় গণিতজ্ঞদের প্রিয় বিষয় একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের কোন উল্লেখ এখানে নাই। কুট্টকের সম্পূর্ণ অস্থপস্থিতি থেকে মনে হয় এই পাণ্ডুলিপির রচনাকাল আর্ষভটের পূর্বে। অবশ্য এ-সবই অসম্ভব। পাণ্ডুলিপির খণ্ডিত অংশে যে ‘কুট্টক’ ছিলনা, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

॥ সঙ্কলন গ্রন্থ ॥

এটি একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। ‘আর্ষভটীয়’, ‘ব্রহ্মসুটসিদ্ধান্ত’ প্রভৃতির সঙ্গে এর কোন মিল নাই। এতে আছে গাণিতিক নিয়ম, তার উদাহরণ ও সমাধান। পাণ্ডুলিপির উদ্ধারকৃত অংশে পাটীগণিত ও বীজগণিতের আলোচনা দেখা যায়,—মাত্র কয়েকটি জ্যামিতি ও পরিমিতির উল্লেখ আছে। অসমিত হয় খণ্ডিত অংশে জ্যামিতি ও পরিমিতির পূর্ণ আলোচনা ছিল। এই গ্রন্থে শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না,—একই পরিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা দুর্বল নয়। পাটীগণিতের ভগ্নাংশ, বর্গমূল, লাভক্ষতি, সুদকবা ও ত্রৈরাশিক বোধ হয় ছদ্মক-পুত্র তাঁর পুত্র ও বংশধরদের গণিত শিক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা বিবেচনা করেছিলেন। বীজগণিতের সরল ও সহসমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ, সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণী বিষয়ে আলোচনা আমাদের বিশ্বয় উদ্রেক করে।

॥ অজ্ঞাত রাশির সন্ধেত ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে জৈন গণিতে ‘সাবৎ-তাবৎ’-এর অর্থ বীজগণিত বলে বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে ‘সাবৎ-তাবৎ’ অজ্ঞাত রাশির অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ঠিক কখন থেকে এই অর্থ প্রচলিত হলো, তা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অমর সিংহ ‘অমরকোষে’ সাবৎ-তাবৎ-এর অর্থ দিয়েছেন ‘মান’ বা ‘রাশি’। বকশালী-পাণ্ডুলিপিতে ‘সাবৎ-তাবৎ’-এর স্থলে ‘যদৃচ্ছা’ শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অজ্ঞাত রাশির সন্ধেত হিসাবে শূন্য (0) ব্যবহৃত হয়েছে। ‘যদৃচ্ছা বিহনে শূন্যে’—অজ্ঞাত সংখ্যা বা রাশির স্থানে শূন্য (0) বসায়। অবশ্য প্রকৃত শূন্য স্থানে শূন্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আরো পরবর্তীকালের। ত্রিধরার্চা ও দ্বাদশরার্চাও অজ্ঞাত রাশির সন্ধেত হিসাবে

শূন্যের ব্যবহার করেছেন ;—পাটীগণিতে অজ্ঞাত রাশির ক্ষেত্রে শূন্য (0) ব্যবহারের বহুল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ‘জিনজিকা’-র নিম্ন উদাহরণটি লক্ষ্য করার মত :

আদি 20 । উ 0 । গচ্ছ 7 । গণিতম্ 245

সংকেতটির অর্থ : কোন সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ 20, সাধারণ অন্তর অজ্ঞাত (সে-কারণ 0 ব্যবহৃত হয়েছে), পদসংখ্যা 7 এবং সমষ্টি 245।

সঠিক ও যথার্থ সংকেতের অভাবে পাণ্ডুলিপির অনেক সমীকরণ অর্থক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তবে সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ,—

$$(1) \quad \left| \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 5 \\ 1 \end{array} \text{ য় } \quad \begin{array}{c} x \\ 1 \end{array} \quad + \quad \begin{array}{c} 5 \\ 1 \end{array} = x + 5 \right|, \text{ এখানে অজ্ঞাত রাশি } x=0।$$

$$(2) \quad \left| \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 5 \\ 1 \end{array} \text{ য় } \quad \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \quad \left| \begin{array}{c} 5 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 7 \\ 1 \end{array} + \quad \begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right|$$

এখানে দুটি অংশে দুটি সমীকরণ আছে :

$$(1) \quad \sqrt{x+5}=5; \quad (2) \quad \sqrt{x-7}=5$$

একই সমীকরণে দুটি করে শূন্য, দুটি করে অজ্ঞাত রাশি বোঝাচ্ছে। ‘0’—এই সংকেতের দুটি অর্থ : (1) অজ্ঞাত রাশি, আবার (2) শূন্যের নীচে ‘1’ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে এই শূন্যটি প্রকৃত শূন্য নয়।

॥ ঋণাত্মক চিহ্ন ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে পাটীগণিতিক প্রক্রিয়া বোঝাতে সংস্কৃত বর্ণমালার ‘বর্ণ’ বা সম্পূর্ণ শব্দ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে যোগ বোঝাতে ‘হু’, বর্গমূল বোঝাতে ‘মু’ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ঋণাত্মক রাশি বোঝাতে ‘+’ চিহ্নের ব্যবহারের কোন প্রাচীন ইতিহাস জানতে পারা যায় না। অতীত গণিত গ্রন্থে বিন্দু (•) দিয়ে ঋণাত্মক চিহ্ন সূচিত হয়েছে। খুব সম্ভব ‘+’ চিহ্নের সঙ্গে ব্রাহ্মী-লিপির চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য থেকে থাকবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সি. এন. শ্রীনিবাসিয়েক্সারের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা গেল : “The origin of the symbol + for subtraction may be through the

word *kshaya* since *kṣa* in the Brahmi characters or in the Bakshālī characters differs from the symbol + in only having a little flourish at the lower end of the vertical line. ডঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত বলেন সংস্কৃত ‘ক্ষয়’-এর বিবর্তনে + চিহ্নের উৎপত্তি ; ডঃ হর্নেল বলেন সংস্কৃত ‘কশিয়স’ বা ‘স্থান’ শব্দ থেকে এসেছে।

॥ বকশালী পাণ্ডুলিপির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ॥

বকশালী পাণ্ডুলিপির অনেক বৈশিষ্ট্য। তাই গণিতের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্বল্প পরিসরে পাণ্ডুলিপির সব বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা দ্বিঘাত করণীয় আসন্ন মান নির্ণয়ের সূত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সূত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে এটি অল্পত্র কোথাও এমন সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। অবশ্য কোন কোন গণিতজ্ঞ বলেন সূত্রটির অস্তিত্ব শুধু-যুগেও পরিমলকিত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গ্রীক গণিতজ্ঞ হীরনের সূত্রের সঙ্গে এর মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে এটি স্বাধীনভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রীকদের সঙ্গে কোন কিছু মিল বা সাদৃশ্য দেখলেই তা গ্রীকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, এমন ধারণা কল্পনা-প্রসূত ছাড়া কিছুই নয়। ‘প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা’ গ্রন্থে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : “ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের ও চিন্তার আদান-প্রদান আবহমান কাল হইতে প্রচলিত।..... কোনো দুই দেশে কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিলেই তাহা যে ভাব বিনিময়ের ফল মাত্র একথা নিশ্চয় করা চলে না। কারণ অসংখ্য পরিবেশের ফলে বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্রভাবে একই প্রকারের চিন্তা ও আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।” যাই হোক,—পাণ্ডুলিপির যুগ হীরনের পূর্ববর্তী বলে অনেক গণিতজ্ঞ মনে করেন।

সূত্র : অ-বর্গ সংখ্যার ক্ষেত্রে নিকটতম বর্গ-সংখ্যা বিয়োগ কর। ভাগশেষ নিকটতম বর্গসংখ্যার দ্বিগুণ করে ভাগ কর : এই সংখ্যার বর্গের অর্ধেককে আসন্ন বর্গমূল ও ভাগশেষের সমষ্টি দ্বারা ভাগ করে বিয়োগ করলে নিভুল বর্গমূল পাওয়া যায়।

আধুনিক গাণিতিক সঙ্কেতে সূত্রটি এ রকম :

$$\sqrt{A} = \sqrt{a^2 + r} = a + \frac{r}{2a} - \frac{\left(\frac{r}{2a}\right)^2}{2\left(a + \frac{r}{2a}\right)}$$

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে সূত্রটির প্রয়োগ দেখানো যাক।

$$\text{উদাহরণ : } \sqrt{41} = 6 + \frac{5}{2.6} - \frac{\left(\frac{5}{2.6}\right)^2}{2\left(6 + \frac{5}{2.6}\right)} = 6 + \frac{5}{12} - \frac{\left(\frac{5}{12}\right)^2}{2\left(6 + \frac{5}{12}\right)}$$

$$\sqrt{105} = \sqrt{10^2 + 5} = 10 + \frac{5}{20} - \frac{\left(\frac{5}{20}\right)^2}{2\left(10 + \frac{5}{20}\right)}$$

প্রথম উদাহরণে আসন্ন বর্গসংখ্যা = 6, ভাগশেষ = 5।

কয়েক প্রকার অঙ্কের গণনায় ক্রটি ও বাধার্ম নির্ধারণের জন্য এই সূত্রের সম্প্রসারিত রূপের প্রয়োগ পাণ্ডুলিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। সেই সূত্রের অতীতে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা যে এ ধরনের চিন্তা করেছিলেন ভাবতেও আজ অবাক লাগে।

সমান্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি পাণ্ডুলিপির আর একটি বিশিষ্ট অবদান। যদি কোন সমান্তর শ্রেণীর প্রথম পদ a , সাধারণ অন্তর d , পদসংখ্যা n হয়, তা হলে পাণ্ডুলিপি অনুসারে, $S = \left\{ \frac{1}{2} (n-1) d + a \right\} n$

॥ ভগ্নাংশ ॥

ভগ্নাংশের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় গণিতে অতি পুরাতন ঘটনা। ঋগ্বেদে ভগ্নাংশের বহু উল্লেখ আছে,—নানা সমস্তায় ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এর প্রয়োগও করেছেন। পাণ্ডুলিপির যুগেও ভগ্নাংশের ব্যবহার দেখা যায়। এ-যুগে ভগ্নাংশের যোগ-ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সদৃশ বা সম-হরের প্রচলন ছিল। প্রাচীন সভ্য অন্যান্য দেশেও এই একই প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। পাণ্ডুলিপি থেকে দু'একটি উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

উদাহরণ :

যোগ কর : $\frac{2}{3}, 1\frac{1}{3}, 1\frac{1}{3}, 1\frac{1}{2}, 1\frac{1}{3}$

নিয়ম :—সদৃশ্য ক্রিয়তে,—সদৃশ হরে পরিণত করা হলো।

$$\frac{120}{60}, \frac{90}{60}, \frac{80}{60}, \frac{75}{60}, \frac{72}{60}$$

এরপর উত্তর লেখা হয়েছে, $\frac{437}{60}$

উদাহরণ :

যোগ কর : $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$

$$(\text{সদৃশ্য ক্রিয়তে}) \frac{30}{60}, \frac{20}{60}, \frac{45}{60}, \frac{36}{60}$$

এবার উত্তর লেখা হয়েছে $\frac{131}{60}$

প্রাচীন ভারতের গণিত-গ্রন্থসমূহে একই ধরনের অঙ্ক দেখা যায়। এটি বোধ হয় গণিতজ্ঞদের সংরক্ষণশীল চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। ক্রীষক, পৃথকস্বামী, মহাবীর, ভাস্করাচার্য প্রভৃতির গ্রন্থে একই প্রকার অঙ্কের অল্পবর্তন দেখা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর অঙ্ক ছাদশ শতাব্দীর গণিত গ্রন্থে প্রায় অবিকৃত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, এমন ঘটনা অপ্রতুল নয়। বকশালী পাণ্ডুলিপির অঙ্কও ভাস্করাচার্য তাঁর লীলাবতীতে পরিবেশন করেছেন। নিম্নলিখিত অঙ্কটিতে ভাস্কর তিনজনের পরিবর্তে চারজন এবং অঙ্কের পরিবর্তে মূল্যবান পাথরের উল্লেখ করেছেন।

তিনব্যক্তি যথাক্রমে ৭টি, ৯টি হয়* এবং ১০টি উটের মালিক। যদি প্রত্যেকে একটি করে অঙ্ক পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে, তা হলে প্রত্যেকেই সমান ধনী হয়। প্রত্যেকটি অঙ্কের মূল্য কত?

এখন যদি x_1, x_2 এবং x_3 যথাক্রমে একটি অশ, একটি হ্র এবং একটি উটের মূল্য হয়, তা হ'লে

$$4x_1 = 6x_2 = 7x_3 = K \text{ (মনে করা হনো)}$$

এখন x_1, x_2 এবং x_3 -এর সাংখ্যিক মান পেতে হলে K এর মান হবে 4, 6 ও 7-এর ল. সা. গু-র যে কোন গুণিতক। 4, 6 ও 7 এর ল. সা. গু 84। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে K -এর মান $84 \times 2 = 168$ ধরা হয়েছে।

$$\text{সুতরাং } 4x_1 - 6x_2 = 7x_3 - 168$$

$$\therefore x_1 = 42, x_2 = 28 \text{ এবং } x_3 = 24$$

[*অর্থ ও হয় সমার্থক। পার্থক্য কেবল অর্থ হয়-এর চেয়ে উন্নত]

2. উদাহরণ :

পাঁচজন ব্যবসায়ী একটি মণি ক্রয় করল। যদি মণিটির মূল্য প্রথম ব্যবসায়ীর টাকার অর্ধেক ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর টাকার এক তৃতীয়াংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা তৃতীয় ব্যবসায়ীর টাকার এক চতুর্থাংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা চতুর্থ ব্যবসায়ীর টাকার এক-পঞ্চমাংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, অথবা পঞ্চম ব্যবসায়ীর টাকার এক ষষ্ঠাংশ ও অবশিষ্টদের মোট টাকার সমান হয়, তাহলে মণিটির মূল্য কত? আর প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কাছে কত করে টাকা আছে?

এখন পাঁচ জন ব্যবসায়ীর টাকার পরিমাণ যথাক্রমে x_1, x_2, x_3, x_4 ও x_5 এবং মণির মূল্য p হলে সর্তাহসাবে,—

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = x_1 + \frac{1}{3}x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = x_1 + x_2 + \frac{1}{4}x_3 + x_4 + x_5 = x_1 + x_2 + x_3 + \frac{1}{5}x_4 + x_5 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \frac{1}{6}x_5 = p$$

$$\text{1নং উদাহরণের মত } \frac{1}{2}x_1 = \frac{2}{3}x_2 = \frac{3}{4}x_3 = \frac{4}{5}x_4 = \frac{5}{6}x_5 = q$$

$$\text{অতএব, } x_1 = 2q, x_2 = \frac{3}{2}q, x_3 = \frac{4}{3}q, x_4 = \frac{5}{4}q, x_5 = \frac{6}{5}q$$

উপরের যে কোন সমীকরণে x_1, x_2, x_3 প্রভৃতির মান বসালে আমরা p -এর মান পাই। প্রথম সমীকরণে বসালে

$$\frac{1}{2} \times 2q + \frac{3}{2}q + \frac{4}{3}q + \frac{5}{4}q + \frac{6}{5}q = p$$

$$\text{অথবা, } \frac{60q + 90q + 80q + 75q + 72q}{60} = p$$

অথবা, $\frac{377}{60} q = p$

উত্তরটি অথও সংখ্যায় হলে $q = 60$ হবে।

অতএব $p = 377$

$\therefore x_1 = 120, x_2 = 90, x_3 = 80, x_4 = 75$ এবং $x_5 = 72$

॥ অপ্রকৃত নিয়ম ॥

ইংরাজীতে এই পদ্ধতির নাম Regula Falsi, Rule of False Position-প্রভৃতি। এটি ভারতীয় গণিতজ্ঞদের স্বতন্ত্র ও মৌলিক আবিষ্কার। ইউরোপে এই নিয়মটি আরবদের দ্বারা বাহিত হয়ে গণিতের সমস্ত সমাধানে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিতে এই পদ্ধতি বহুদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল। তারপর বীজগণিতের প্রয়োগ ও নানা সাঙ্কেতিক চিহ্নের আবিষ্কারের পর এর গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তবুও স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে যেখানে বীজগণিত অননুমোদিত সেখানে এই পদ্ধতি এখনো প্রয়োগ করা হয়। নবম শতাব্দীর জৈন গণিতজ্ঞ মহাবীরের ‘পণ্ডিত সার সংগ্রহে’ এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ আছে। পাণ্ডুলিপির যুগে এই পদ্ধতির প্রচলন থেকে মনে হয় ভারতে এটি খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর কোন সময়ে আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে।

এখনো পাটীগণিতের অঙ্ক সমাধানে,—অদকবা, লাভ ক্ষতি, ভগ্নাংশ বিষয়ক অঙ্ক প্রভৃতিতে এই অপ্রকৃত নিয়ম বা Regula Falsi-র বহুল প্রয়োগ করা হয়। সেই সুবিধাভাৱে অঙ্ক, কোন বাঁশের এত অংশ জলে, এত অংশ কাড়ায় ও এতখানি উপরে থাকলে বাঁশটির উচ্চতা কত? অথবা কোন ব্যক্তি তার মাসিক আয়ের এত অংশ গৃহখরচ বাবদ, এত অংশ বাড়ী ভাড়া, এত অংশ লেখাপড়া প্রভৃতিতে খরচ করার পর তার মাসে এত টাকা জমলে, তার মাসিক আয় কত? এইসব অঙ্কে আমরা এই অপ্রকৃত পদ্ধতির প্রয়োগই করে থাকি। এ-সব অঙ্কে সাধারণত আমরা একটি অপ্রকৃত সংখ্যা ধরে নিয়ে অঙ্ক কষে প্রকৃত উত্তর বার করি। বাঁশের অঙ্কটির ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা 1 ধরি ও মাসিক আয়ের অঙ্কের ক্ষেত্রে 100 টাকা ধরি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঁশের উচ্চতা 1 নয়, ব্যক্তিটির মাসিক আয়ও 100 টাকা নয়। খুলী মন্ত-

একটি অপ্রকৃত উত্তর ধরে নিয়ে অঙ্ক কষার এই পদ্ধতিকে তাই অপ্রকৃত নিয়ম পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

বকশালী পাণ্ডুলিপিকে প্রাচীন ভারতীয় গণিতের একটি লুপ্ত অধ্যায় বলা যেতে পারে। এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমীম। আর্ধভটের পূর্ববর্তী যুগের গাণিতিক নমুনা একমাত্র এখানেই আছে। এই পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব সম্পর্কে ডঃ ব্রিনিবাসিয়েঙ্কার বলেন,—“The date of the mathematics contained in the Bakhshālī manuscript is therefore far more important than the date of Ms. itself, but a precise estimate of the former date may be possible only when further such manuscripts come to light.”

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

“No mathematician should ever allow himself to forget that mathematics, more than any other art or science, is a youngman's game.”

—G. H. Hardy.

আর্থভট

আর্থভট নামটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে ‘আর্থভট’। প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের নামের সঙ্গে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম যুক্ত হওয়ায় ভারতবাসী মাত্র সকলেই আনন্দিত হবেন। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও পণ্ডিত মনীষীদের স্মৃতি রক্ষার জন্য সরকার ও বেসরকারী নানা সংস্থা অনেক কিছু করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও সাহিত্যিকদের স্মৃতি রক্ষার তেমন বিশেষ আয়োজন নাই। ব্যক্তি নামে দেশে নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, স্থানের নামকরণে, রাস্তার নামকরণেও ব্যক্তির নাম জড়িত হচ্ছে। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই আমাদের দেশের অসামান্য প্রতিভাধরদের নাম উপেক্ষিত হচ্ছে।

আর্থভট নামটি কোন কোন পত্র-পত্রিকায় ও সাধারণ মানুষের কাছে ‘আর্থভট্ট’ নামে লিখিত ও উচ্চারিত হচ্ছে। এই ভুল লেখা ও উচ্চারণ কম পরিতাপের বিষয় নয়। এই ভুলের পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে : প্রথমত নামের সঙ্গে ‘ভট্ট’ যুক্ত অনেক নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিজ্ঞাবিদ, সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-গণিত-ফলসংহিতার সুপণ্ডিত, বিখ্যাত মীমাংসা লেখক কুমারিল ভট্ট, স্মৃতি চণ্ডিকা গ্রন্থের লেখক দেবলভট্ট, আদিশূর প্রবর্তিত এবং কনৌজ থেকে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম বেণীসংহার রচয়িতা নারায়ণ ভট্ট, সুবিখ্যাত যদুভট্ট প্রভৃতি কয়েকটি উদাহরণ। দ্বিতীয়ত ভট্ট-এর সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত বলে ‘ভট’ উচ্চারণে স্বীকৃতি পাইনা, বা উচ্চারণে বাধাপ্রাপ্ত হই। যা হোক, ভট্ট উচ্চারণ না করে কেন আমরা ‘ভট’ উচ্চারণ করব তার কারণটি ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ে ‘বাঙালীর

ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো : “ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই ভট্ট ব্রাহ্মণ নামে আর এক নিম্ন বা ‘পতিত’ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের খবর পাওয়া বাইতেছে ; স্মৃত পিতা এবং বৈষ্ণু মাতার সম্ভানবাই ভট্ট ব্রাহ্মণ এবং অল্প লোকদের বশোগান করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট ব্রাহ্মণ।”

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে ক্রম পরম্পরায় তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রাচীন ভারতের গাণিতিক উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি দেখানো না গেলেও বৃহতে অসুবিধা হয় না, সুদূর অতীতে এ-দেশের গণিতজ্ঞরা নানা বিষয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। বেদ, বেদাঙ্গ, বৌদ্ধ ও জৈন বিশাল গ্রন্থগাজি এ-বিষয়ে আমাদের বিক্ষিপ্ত সংবাদ সরবরাহ করে। সত্য কথা, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ের গণিতজ্ঞান আমাদের অতি অল্প। তবুও গণিত বিষয়ে যতটুকু জানা যায়, গণিতজ্ঞদের সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। নিঃসন্দেহে এটি ভারতীয় ঐতিহ্য। ভারতীয় মনীষীরা তাঁদের বিষয় সম্পর্কে স্মরণ আলোচনা করেছেন, কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এ-দেশে বসন্তের বড় অভাব। ফলে, বহু গ্রন্থ অক্ষয় অনামাঙ্কিত হয়ে গেছে। ভারতের গর্ব ‘আর্ষভট্টীয়’-ও হারিয়ে গেছে। জানি না কোন্ পুণ্যের ফলে তার একটিমাত্র অক্ষলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে! পণ্ডিত প্রবর ভাউ দাজী এ-অল্প সমগ্র ভারত-বাসীর তথ্য বিশ্বাসীয় কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্ষভট্টের সবশ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘আর্ষভট্টীয়’ গ্রন্থের একটি অক্ষলিপি সংগ্রহ করেন।

গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণ-যুগ। এই যুগে বিহারের অন্তর্গত কুম্ভমপুরে, ঐতিহাসিক পাটলিপুত্র বা পাটনার ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্ষভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে গুপ্তযুগ ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই যুগ-সম্বন্ধে আর্ষভট্টের তার প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের পক্ষে যে অসুবিধা হয়েছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর্ষভট্ট মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আর্ষভট্টীয়’ রচনা করেন। এই সময় পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আসীন ছিলেন বুদ্ধগুপ্ত এবং তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছরই আর্ষভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। ‘আর্ষভট্টীয়’ গ্রন্থে তিনি জন্ম তারিখ উল্লেখ করেছেন :

যষ্ঠমকামাং যষ্ঠির্দাদ্যাক্ষরশ্চ যুগপাদাঃ ।

অ্যাবিকা বিংশতিরকান্তদেহ মম জন্মনোহতীভাঃ ।

উপরের স্লোকটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কলিযুগের ৩৬০০ বছর অতিক্রান্ত

হলে আর্ষভটের বয়স ছিল ২৩ বছর। অর্থাৎ তিনি ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা হচ্ছে :

আর্ষভটস্তিহ নিগদতি কুসুমপুরেইত্যর্চিতং জ্ঞানম্ ॥

কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর ‘আর্ষভটীয়’ গ্রন্থের বিখ্যাত ভাষ্যকার প্রথম ভাষ্যর তাঁর লেখায় আর্ষভটকে ‘অশ্বক’ বলেছেন। ফলে পরবর্তী যুগের কোন কোন ভাষ্যকার যেমন শীলকর্তৃ বলেছেন আর্ষভট অশ্বক জনপদের অধিবাসী। অশ্বক খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশ ;—কেবল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন ভাষ্যকার তাই আর্ষভটীয়-কে ‘অশ্বক-স্মৃট-তন্ত্র’ নামেও অভিহিত করেছেন। আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আর্ষভটীয় গ্রন্থের বহু ভাষ্য এবং এই গ্রন্থের উপর রচিত অত্যাশ্র গ্রন্থও দাক্ষিণাত্যের কেবল রাজ্য থেকেই পাওয়া গেছে। আবার আর্ষভটীয় পদ্ধতিতে কিছু কিছু পঞ্জিকা ব্যবহারের রীতি এখনো এই রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ-সব তথ্য থেকে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে হয়তো আর্ষভট কেবল রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন এবং কুসুমপুরে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা করে থাকতেন। কিন্তু পণ্ডিত কৃপাশঙ্কর তন্ত্র মহাশয় মনে করেন আর্ষভট কুসুমপুরেরই অধিবাসী এবং সে সম্ভাবনা অধিক বলে মনে হয়।

॥ আর্ষভট সমস্তা ॥

বাংলা সাহিত্যে যেমন চণ্ডীদাস-বিজ্ঞাপতি সমস্তা আছে, তেমনি গণিতের ইতিহাসেও আর্ষভট সমস্তা আছে। একই নামধারী অন্তত দু’জন আর্ষভটের নাম ভারতীয় গণিতে আছে। একজন আর্ষভট কুসুমপুর নিবাসী ও ‘আর্ষভটীয়’ গ্রন্থের রচয়িতা আর একজন হচ্ছেন ‘মহা-সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থের লেখক আর্ষভট। এই গ্রন্থের সর্বত্র প্রথম জনকে আর্ষভট ও দ্বিতীয় জনকে দ্বিতীয় আর্ষভট বলে উল্লেখ করব। আর্ষভট পঞ্চম শতাব্দীর, আর দ্বিতীয় আর্ষভট দশম শতাব্দীর—উভয়ের মধ্যে ৫০০ বছরের ব্যবধান।

অলবিকণী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে দু’জন আর্ষভটের উল্লেখ করেছেন,—একজন কুসুমপুর-নিবাসী, অপরজন তাঁরও পূর্ববর্তী। অলবিকণীর মতে আর্ষভটীয় গ্রন্থের লেখক পূর্ববর্তী আর্ষভটের অনুসরণকারী। অলবিকণীর কথা সত্য হলে আমরা তিনজন আর্ষভটের নাম পাচ্ছি। কিন্তু তাঁর কথা মেনে নেওয়ার অসুবিধা আছে।

কারণ তাঁর গ্রন্থের সব বিবরণ নিভুল ও ক্রটিমুক্ত নয়,—এমন কি অনেক অসঙ্গতিও আছে।

কিন্তু দ্বিতীয় আর্ষভট তাঁর গ্রন্থের সূচনায় একটি প্লোকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন ‘বৃদ্ধ আর্ষভটের’ সিদ্ধান্তগুলি খুব প্রাচীন এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর গ্রন্থে নানা ধরনের ভুল-ক্রটির অল্পপ্রবেশ ঘটেছে। সে অল্পই তিনি নিজের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। দ্বিতীয় আর্ষভট কথিত ‘বৃদ্ধ আর্ষভট’ যদি পঞ্চম শতাব্দীর আর্ষভট হন, তাহলে তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে আর্ষভটীয় গ্রন্থের সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। কারণ সূচনায় পূর্ববর্তী আর্ষভটের ভুল-ক্রটি সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আর্ষভটীয় ও মহা-সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। এমন কি উভয় গ্রন্থের প্রাথমিক নীতিও ভিন্ন প্রকৃতির। এই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় হয়তো দ্বিতীয় আর্ষভটের পূর্ববর্তী কোন এক আর্ষভট ছিলেন, কিন্তু তিনি ‘আর্ষভটীয়’ গ্রন্থের লেখক নন। তাহলে কি তৃতীয় কোন আর্ষভট ছিলেন?

তৃতীয় আর্ষভটের অস্তিত্ব ব্রহ্মগুপ্তের দুটি উক্তি থেকে সম্ভাবনাময় করে তোলে। প্রথম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত ‘ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে কুসুমপুর নিবাসী আর্ষভটের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, আর্ষভট তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত স্বীকৃত মতবাদ অগ্রাহ্য করে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি ‘খণ্ড-খাণ্ডক’ গ্রন্থে আর্ষভটের প্রশংসা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু খণ্ড-খাণ্ডকের গ্রন্থাবস্থানের সঙ্গে আর্ষভটীয় গ্রন্থের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তা হলে কি ব্রহ্মগুপ্ত প্রশংসিত আর্ষভট কুসুমপুর নিবাসী আর্ষভট নন? দুর্ভাগ্যবশত: তিনি কোন আর্ষভটের প্রশংসা করেছেন তার উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালের ভাষ্যকারগণ এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন বৃদ্ধ বয়সে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ভুল বুঝতে পেয়ে কুসুমপুর নিবাসী আর্ষভটের প্রশংসা করেছেন। যা হোক, সমস্যাটি যে তিমিরে সে তিমিরেই রইল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিস্কৃত হলে তখন হয়তো এ-সমস্যার সমাধান হবে।

আর্ষভটীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আর্ষভটীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মাত্র ১২১টি প্লোকে সংক্ষিপ্তাকারে গ্রন্থটি রচিত। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি অটল এবং স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য। পতঞ্জলির যোগ-দর্শনের মত এই গ্রন্থটি চারটি পাদে বিভক্ত।

প্রথম পাদে নাম গীতিকা-পাদ। মোট 13টি শ্লোকের মধ্যে দশটি শ্লোক গীতিকা ছন্দে রচিত। এটি ‘দশগীতিকা’ নামেও পরিচিত। এখানে মূল সংজ্ঞা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে, বৃহত্তর কাল মানের এককের সংজ্ঞা, বৃত্তীয় এককের সংজ্ঞা আলোচিত হয়েছে।

43,20,000 বছর পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সূর্য, চন্দ্র ও অন্ত্রাশ্র গ্রহদের আবর্তনের সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে এবং পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও অন্ত্রাশ্র গ্রহদের ব্যাস নির্ণয় করাও হয়েছে, আর সাইন-পার্থক্যের তালিকা এই পাদে অত্যন্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় পাদে নাম ‘গণিত-পাদ’। মোট শ্লোক সংখ্যা 33। এখানে তিনি বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রফল, বৃত্ত, পিরামিডের আয়তন, সমান্তর শ্রেণী, শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়, সূদকবা, ত্রৈরাশিক-নিয়ম, ভগ্নাংশ, ত্রিকোণমিতির সাইন-তালিকা প্রস্তুতি, দ্বিঘাত সমীকরণ, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় পাদে নাম ‘কালক্রিয়া-পাদ’। এখানে মোট 25টি শ্লোকে নানান সময়ের একক এবং সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান বিষয়ে আলোচনা আছে। এখানে বছরের মাস, দিন প্রভৃতিতে বিভাগ ও বিভিন্ন ধরনের বছর, মাস, দিনের আলোচনা আছে।

50টি শ্লোকে ‘গোল-পাদ’-এ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। গোলায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানান সমস্তার নিয়ম এখানে প্রদত্ত হয়েছে। গ্রহ ও গ্রহ-দর্শন সম্পর্কিত গণনা ও লৈখিক চিত্রের অবতারণা এই পাদে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষেপে আর্ষভট্টীয় গ্রন্থের কয়েকটি বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হলো। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অনির্ণেয় সমীকরণ ভারতীয় গণিতজ্ঞদের একটি প্রিয় বিষয়। আর্ষভট্টের পর অন্ত্রাশ্র গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে আরো গবেষণা করেন এবং ‘কুট্টক’ অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। জ্যামিতিক সম্প্রাচ, শ্রেণী প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপর আর্ষভট্টের বিশেষ অবদান নাই। মনে হয় তাঁর পূর্ব থেকেই এ-সব বিষয় এমন বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি আর এ-বিষয়ে অগ্রসর হননি। জৈন-গণিত, বকশালী পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের পর অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু যে-সব বিষয়ে আর্ষভট্টের বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে, তা হচ্ছে π -এর মান নির্ণয়, সাইন-তালিকা প্রস্তুতি, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি ও

বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতি সংখ্যাকে তার পূর্ববর্তী সংখ্যার দশগুণ হিসাবে ধরা হয়েছে। এক (1), দশ (10), শত (100), সহস্র (1000) এভাবে 10^৯ পর্যন্ত সংখ্যার কথা আছে।

মাঝে মাঝে এমন মৌলিক ও সুদূর্বপ্রসারী আবিষ্কার হয়, যার মূল্যায়ন তখন সম্ভব হয় না। ফলে আবিষ্কারকের কপালে জুটে অশেষ লাঞ্ছনা। বিজ্ঞান জগতে গ্যালিলিও তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর ক্যান্টর তো পাগল হবার উপক্রম হয়েছিলেন। আর্থাভট-প্রতিভার বিশ্বয়কর অবদান “আর্থাভটীয়” ও “গণক-চক্র-চূড়ামণি” ব্রহ্মগুপ্তের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়েছিল।

॥ π-এর মান ॥

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনায় π একটি অপরিহার্য ঞ্জবক। সে-কারণে ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে π-এর মান নির্ণয় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতে বৈদিক যুগ ও তার পূর্ববর্তী সময় থেকেই π-এর ধারণা প্রচলিত ছিল। শুক্লসূত্রে ও জৈন গণিতে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে π-এর মান 3, $\sqrt{10}$ ও 3.0883 ধরা হয়েছে। কিন্তু গণিতজ্ঞরা বস্তু সূক্ষ্মতর গণনার বিষয় চিন্তা করেছেন, ততই π-এর সূক্ষ্মতর মানের প্রয়োজন হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত π-এর মূল ও সূক্ষ্মমান হিসাবে যথাক্রমে 3 ও $\sqrt{10}$ ধরেছেন। এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে π-এর মান 3 ধরেছেন। কিন্তু দশমিক চতুর্থ স্থান পর্যন্ত সূক্ষ্ম মান নির্ণয়ের কৃতিত্ব আর্থাভটের। পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত গণিতের ইতিহাসে এই কৃতিত্বের নজির আর কারো নেই। আর্থাভট গণিত-পাদেদর দশম স্কন্ধে এই সূত্রটি দিয়েছেন :

চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাম্।

অনুত্তরয়বিহতস্তাসমো বৃত্তপরিণাহঃ।

100-এর সঙ্গে 4 যোগ করে 8 দিয়ে গুণ করে 62,000 যোগ কর। এই ফলটি 20,000 ব্যাস-বিশিষ্ট বৃত্তের আনুমানিক পরিধি হবে।

অঙ্কে প্রকাশ করলে,

$$\pi = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = \frac{8(100+4)+62000}{20000} = 3.1416$$

π-এর আসন্ন মানটি অবশ্যই ভ্রাংশে ছিল। কারণ ভারতে দশমিকের প্রচলন অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। আর্থাভট এই মান নির্ণয় বৃত্তের পাদ বিভাজন

দ্বারা কবেছিলেন বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞরা π -এর আসন্ন মান দিয়েছেন ভ্রামাংশে— $\frac{3927}{1250}$ । এক্ষণে মনে করা হয় যে, তাঁরা এটি আর্ঘভটের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। আবার এক্ষণে অনুমানও করা হয় যে স্বয়ং আর্ঘভট হয়তো কোন লুপ্ত সূর্য-সিদ্ধান্ত থেকে মানটি পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় আর্ঘভটের ‘মহা-সিদ্ধান্ত’ ও ভাস্করের ‘নীলাবতী’-তে π -এর মান $\frac{22}{7}$ দেখা যায়। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও ভাস্কর্যকারগণ π -এর আরো শুদ্ধ মান নির্ণয় করেছেন, $\pi=3.141592653$ ।

π -এর আর্ঘভটীয় মানটি সম্পর্কে কোন কোন গণিত-ইতিহাসকার বলেন—এই মানটির উদ্ভব গ্রীসে। কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস π -এর মান $3\frac{1}{7}$ থেকে $3\frac{10}{71}$ বলেছেন অর্থাৎ $\frac{22}{7}$ হচ্ছে আর্কিমিডিস নির্ণীত মান। অল্প কোন গ্রীক গণিতজ্ঞ পৃথক আর কোন মান দেননি,—এক টেনেমী ছাড়া।

বর্গমূল ও ঘনমূল

বর্গমূল নির্ণয়ের ইতিহাস অতি প্রাচীন। জৈন গণিতে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয়ের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আর্ঘভটই প্রথম বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বাক্য করেন যা জৈন গণিতজ্ঞরা করেননি। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর পদ্ধতির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। শূন্যসহ দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে স্থানিক-মান দ্বারা সংখ্যা লিখনের অস্তিত্ব তাঁর বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি থেকেই প্রমাণিত হয়। এ থেকে অনুমিত হয়, সংখ্যা-লিখনের এই পদ্ধতি বহু পূর্বে প্রচলিত। ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধর, ভাস্করাচার্য, কমলাকর প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা আর্ঘভট প্রদর্শিত বর্গমূল নির্ণয়ের নিয়ম ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি ষোড়শ শতাব্দীর আগে পাশ্চাত্যে দেখা যায়নি। ক্যাটালনিও (1546 খ্রীঃ) এবং কার্টালডি (1613 খ্রীঃ) তাঁদের গ্রন্থে এই পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সপ্তদশ চীনদেশে এই দুই পদ্ধতির প্রয়োগ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দেখতে পাওয়া যায়। চীনা ভাষায় বর্গমূলের নাম “খাই ফ্যাং” এবং ঘনমূলের নাম “খাই সি ফ্যাং”। যা হোক, বর্গমূল নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি মহান

গণিতজ্ঞ আৰ্ঘভটের অবদান। গণিত পাদেব চতুৰ্থ শ্লোকটিতে বৰ্গমূল নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ :

ভাগং হরেন্দ বর্গান্নিত্যং দ্বিগুণেন বর্গমূলেম ।

বর্গবর্গেণ্ডে সঙ্ঘং স্থানান্তরে মূলম ॥

ঘনমূল নির্ণয়ের প্রাচীন কোন ইতিহাস জানতে পারা যায় না। অল্পমান করতে কষ্ট হয় না আৰ্ঘভট-পূর্ব যুগে কোন-না-কোন প্রকারে এই পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল; হয়তো আৰ্ঘভটই প্রথম এই পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও নিয়ম দেন। আৰ্ঘভটের পর প্রাচীন ভারতের অন্য গণিতজ্ঞরা এই পদ্ধতির উদাহরণসহ উল্লেখ করেছেন।

আৰ্ঘভট যে সংখ্যাটির ঘনমূল নির্ণয় করতে হবে তার ডান দিক থেকে সংখ্যাটিকে ঘন-, প্রথম অঘন- এবং দ্বিতীয় অঘন-স্থানে ভাগ করে তিনটি করে ছোড়া করেছেন। এভাবে সর্বশেষ ঘন-স্থান থেকে নিকটতম ঘন-সংখ্যাটি নির্ণয় করে প্রথম ঘনমূল নির্ণয় করেছেন। এ-পদ্ধতি আৰ্ঘভটের সঙ্গে আমাদের বর্তমান পদ্ধতির কোন অমিল নাই। ঘনমূল সম্পর্কিত গণিত-পাদেব পঞ্চম শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হলো :

অঘনান্দ ভজেন্দ দ্বিতীয়াং দ্বিগুণেন ঘনস্ত মূলবর্গেন ।

বর্গদ্বিগুণিতঃ শোভ্যঃ প্রথমান্দ ঘনস্ত ঘনাং ॥

ভাবাহ্বাদ :—(সর্বশেষ ঘন-স্থান থেকে নিকটতম বৃহত্তম ঘন বিয়োগ করে), দ্বিতীয় অঘন-স্থানকে প্রাপ্ত ঘনমূলের বর্গের তিনগুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে ; তারপর প্রথম অঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের বর্গ দ্বারা পূর্বঘনমূলের তিনগুণ বিয়োগ করতে হবে। তারপর ঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের ঘন বিয়োগ করতে হবে। এভাবে পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে মূল নির্ণীত হবে।

আৰ্ঘভট কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রটির বিশ্লেষণ করলে ঘনমূল নির্ণয়ের পদ্ধতির চারটি পর্যায় পাওয়া যায় :

(1) সর্বশেষ ঘন-স্থানের নিকটতম বৃহত্তম ঘন নির্ণয়

(এখানে আমরা প্রথম ঘনমূল-অঙ্কটি পাই)

(2) দ্বিতীয় অঘন-স্থানকে প্রথম ঘনমূল-অঙ্কটির বর্গের তিনগুণ দ্বারা ভাগ

(3) প্রথম অঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের বর্গ দ্বারা পূর্ব ঘনমূলের তিনগুণ

দ্বারা বিয়োগ

(৪) ঘন-স্থান থেকে পূর্বভাগফলের ঘন বিয়োগ

যদিও চারটি সোপানে পদ্ধতিটি বিশ্লেষিত হলো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটির তিনটি সোপান। কারণ চতুর্থ সোপানে আমরা প্রথম সোপানের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি।

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতিটির প্রয়োগ দেখানো যাক।

$$\begin{array}{rcl}
 \text{নিকটতম বৃহত্তম ঘন } 5^3 & 14805667 & | \quad 5 = \text{ঘনমূলের প্রথম অঙ্ক} \\
 \text{প্রথম ঘনমূলের বর্গের তিনগুণ} & 125 & \\
 \quad - 3 \times 5^2 = 75 & \boxed{180} & | \quad 2 = \text{ভাগফল} \\
 & \quad \quad \quad \boxed{150} & \quad - \text{ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্ক} \\
 \text{ভাগফলের বর্গ} \times \text{ঘনমূলের} & 305 & \\
 \text{তিনগুণ} = 2^3 \times 3 \times 5 = 60 & \boxed{60} & \\
 & 2455 & \\
 \text{ভাগফলের ঘন} = 2^3 = 8 & 8 & \\
 \text{ঘনমূলের বর্গের তিনগুণ} = & \boxed{24476} & | \quad 3 = \text{ভাগফল} = \text{ঘনমূলের} \\
 \quad 3 \times 5^2 = 8112 & \quad \quad \quad \boxed{24336} & \quad \text{তৃতীয় অঙ্ক} \\
 \text{ভাগফলের বর্গ} \times \text{ঘনমূলের তিনগুণ} & 1406 & \\
 \quad - 3^3 \times 3 \times 5^2 = 1404 & 1404 & \\
 & 27 & \\
 \text{ভাগফলের ঘন} = 3^3 = 27 & 27 & \\
 & \times &
 \end{array}$$

∴ নির্ণেয় ঘনমূল = 523

॥ প্রগতি ॥

ভারতীয় গণিতে প্রগতির ইতিহাস অতীব প্রাচীন। ‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’, ‘বাজসেনীয় সংহিতা’, ‘পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ’ ও অগ্ন্যজ্ঞ বৈদিক গ্রন্থে সমান্তর শ্রেণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর ‘বৃহদেবতা’ গ্রন্থে $2+3+4+\dots+1000=500499$ —এই সমান্তর শ্রেণীর সমষ্টি দেখতে পাওয়া যায়। প্রগতির প্রাচীন নাম ‘শ্রেণী-ব্যবহার’। উল্লিখিত গ্রন্থাদিতে শ্রেণীর সমষ্টির নির্ভুল গণনা আছে বটে, কিন্তু কোন সাধারণ নিয়ম উল্লিখিত হয়নি। জৈন-গণিত ও বকশালী পাণ্ডুলিপিতে শ্রেণী সম্পর্কিত সমস্তা এবং তার নিয়ম আছে। কিন্তু আর্থভট শ্রেণীর সমষ্টি, মধ্যক, পদসংখ্যা নির্ণয়ের নির্ভুল নিয়ম ব্যক্ত করে ভারতীয় গণিতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

প্রগতিতে এই পারিভাষিক শব্দ সমূহ প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। প্রথম পদ=আদি, মূল, বদন; সাধারণ অন্তর=চর, প্রচর, উত্তর; মধ্যপদ=মধ্য; শেষ-পদ=অন্ত্য; পদসংখ্যা=পদ, পঙ্খ; শ্রেণীর সমষ্টি=ফল, গণিত, সর্ববদ, সকলিত।

সমান্তর শ্রেণীর আংশিক সমষ্টি নির্ণয়ে নিম্নরূপ সূত্রটি গণিতপাদের উনিশতম শ্লোকটিতে দেখা যায় :

ইষ্টং ব্যেকং দলিতং সপূর্বমুত্তরগুণং সমুখমধ্যম্ ।

ইষ্টগুণিতমিষ্টদদং ত্বথাভ্যন্তং পদার্থহন্তম্ ॥

ভাবাহুবাদ :—প্রদত্ত পদসংখ্যার 1 হ্রাস করে, 2 দ্বারা ভাগ করে, পূর্বপদসংখ্যা (যদি থাকে) যোগ করে, সাধারণ অন্তর দ্বারা গুণ করার পর প্রথম পদটি যোগ করলে সমান্তর শ্রেণীর মধ্যক পাওয়া যাবে। এবং এই মধ্যককে প্রদত্ত পদসংখ্যা দ্বারা গুণ করলে প্রদত্ত পদসংখ্যার সমষ্টি পাওয়া যাবে। অপর পক্ষে, প্রথম ও শেষপদের সমষ্টিকে পদসংখ্যার অর্ধ দ্বারা গুণ করলে শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণীত হবে।

আধুনিক বীজগাণিতিক সঙ্কেতে প্রকাশ করলে,—

$a + (a + d) + (a + 2d) + \dots$ সমান্তর শ্রেণী হলে,

$(a + pd) + (a + p + 1d) + \dots + \{a + (p + n - 1)d\}$ এই n পদের,

$$(1) \text{ সমান্তরীয় মধ্যক} = a + \left(\frac{n-1}{2} + p \right) d$$

$$(2) \text{ সমষ্টি} = n \left\{ a + \left(\frac{n-1}{2} + p \right) d \right\}$$

এখানে প্রথম পদ= a , সাধারণ অন্তর= d , n =পদসংখ্যা।

আবার, প্রথম পদ= A এবং শেষপদ= L হলে,

সমান্তর শ্রেণীর সমষ্টি= $\frac{1}{2} (A + L)$

বিংশতম শ্লোকটিতে পদসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র প্রদত্ত হয়েছে।

গচ্ছোহষ্টোত্তরগুণিতাদ্ দ্বিগুণাদ্যুত্তরবিশেষবর্গমুতং ।

মূলং দ্বিগুণাদ্যুতং ত্বোত্তরভজিতং সন্নপার্বম্ ॥

“শ্রেণীর সমষ্টিকে সাধারণ অন্তরের ৪ গুণ দিয়ে গুণ কর এবং তার সঙ্গে প্রথম পদের দ্বিগুণ ও সাধারণ অন্তরের বিরোগফলের বর্গকে যোগ করে ঐ যোগফলের বর্গমূল নাও। এর থেকে প্রথম পদের দ্বিগুণকে বাদ দাও। এরপর ঐ প্রাপ্ত ফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে ভাগ কর এবং ঐ ভাগফলে 1 যোগ কর। এবার সর্বশেষ প্রাপ্ত এই ফলের অর্ধেক নাও।” (জ্ঞান ও বিজ্ঞান)

যদি $a+(a+d)+(a+2d)+(a+3d)+\dots+n$ পর্যন্ত শ্রেণীর সমষ্টি s হয়, তা হলে,

$$n=\frac{1}{2}\left[\frac{\sqrt{8ds+(2a-d)^2}-2a}{d}+1\right]$$

এক প্রকার স্বাভাবিক সংখ্যার শ্রেণীকে আর্ষভট ‘উপচিতি’ বলেছেন।

$1+2+3+4+\dots+n$ —এই শ্রেণীটির প্রথম পদ ১ এবং সাধারণ অন্তর ১ বলে আর্ষভট এর নাম দিয়েছেন “একোত্তরাঙ্গি-উপচিতি”। আবার, $1+(1+2)+(1+2+3)+\dots$, এই শ্রেণীটির নাম দিয়েছেন ‘চিতিঘন’। ‘আর্ষভটীয়’ গ্রন্থে এই শ্রেণীটির সমষ্টির দু’রকম সূত্র পাওয়া যায় :

$$(1) \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \text{ এবং } (2) \frac{(n+1)^3-(n+1)}{6}$$

এ-ছাড়া স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ ও ঘন-সমষ্টি আর্ষভট দিয়েছেন। বলা হয়, এই অভেদ নির্ণয়ে তিনিই পথিকৃত।

$$(1) 1^2+2^2+3^2+\dots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$


$$(2) 1^3+2^3+3^3+\dots+n^3=(1+2+3+\dots+n)^2, \\ =\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$$

উপরের দু’প্রকার শ্রেণীর নাম আর্ষভটের মতে ‘বর্গ-চিতিঘন’ এবং ‘ঘন-চিতিঘন’। অবশ্য ‘আর্ষভটীয়’ গ্রন্থের বিখ্যাত ভাষ্যকার প্রথম ভাস্কর ওই শ্রেণী দুটির নামকরণ করেছেন যথাক্রমে “বর্গ-সঙ্কলনা” এবং “ঘনসঙ্কলনা”।

॥ সাইন-এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

সাইন-তালিকা প্রস্তুতি আর্ষভটের গাণিতিক প্রতিভার আর এক অনন্ত সাধারণ দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রাপ্য কিনা ঠিক বলা যায় না। আর কি পদ্ধতিতে তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তা-ও অসমাধানিত রয়ে গেছে। অবশ্য পরবর্তীকালের ভাষ্যকারদের সূত্র অবলম্বন করে দু’একজন বিশেষজ্ঞ সম্ভাব্য পদ্ধতি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। দু’কুহ ও জটিল এই পদ্ধতিটি আর এখানে বিবৃত হলো না। কিন্তু আবার এখানে সাইন-এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

চিত্রে O বৃত্তের কেন্দ্র, PAP' বৃত্তের চাপ এবং A মধ্যবিন্দু। PAP'-কে ভারতীয় গণিতে 'ধনু' বলা হয় এবং PNP' ধনুকের ছিলা বা জ্যা। কালক্রমে



চিত্র—16

PN জ্যা, অর্ধ-জ্যা বা জীব-তে পরিণত হয়। ভারতীয় গণিতে PN-ই 'সাইন'—যদি $POA = \theta$ হয়, তা হলে জ্যা $\theta = PN = r \sin \theta$ (r —ব্যাসার্ধ)। অর্থাৎ আধুনিক গণিতের সাইন-কে ব্যাসার্ধ দিয়ে গুণ করলে 'ভারতীয় সাইন' পাওয়া যায়।

বর্তমান সাইন-এর উদ্ভব 'জ্যা' শব্দটি থেকে। আমরা জানি শব্দের অর্থান্তর ঘটে। ফলে কোন কোন শব্দ তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হারিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাংলা ভাষায় 'দাক্ষণ' তেমনি একটি শব্দ। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'কাষ্ঠ' বা 'কাঠ'। কিন্তু বর্তমানে 'দাক্ষণ' শব্দটি আমরা কি অর্থে ব্যবহার করি তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। 'জ্যা'-এর এক অর্থান্তরের ইতিহাস থেকে কেমনভাবে সাইনের উৎপত্তি হলো সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বাক। 'জ্যা'-এর একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জীব'। আরবদের হাতে পড়ে 'জীব' হয় 'জিব্', পরে আবার পরিবর্তিত হয়ে 'জৈব্' হয়। আরবী অনুরূপ উচ্চারণ-যুক্ত অল্প একটি শব্দের অর্থ হচ্ছে 'হৃদয়'। পরবর্তীকালে রোমানরা ভুলক্রমে জিব → জৈব্-এর হৃদয় অর্থটি গ্রহণ করে। অর্থান্তরের স্তবগুলি দাঁড়াল : জ্যা > জীব

>জৈব>হৃদয়>সাইনাস (Sinus)। 'সাইনাস' থেকেই উদ্ভব হলো বর্তমান 'সাইন'। গণিতের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিয়ল।

॥ একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ॥

কোন একঘাত সমীকরণে দুটি অজ্ঞাত রাশি থাকলে একটির যে কোন মান ধরে অপরটির মান নির্ণয় করা যায়।

$2x - y = 1$ সমীকরণটিতে x এক y দুটি অজ্ঞাত রাশি। x -এর ভিন্ন ভিন্ন মান ধরলে y -এরও ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, $x=1, y=1$; $x=2, y=3$; $x=4, y=7$ ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অজ্ঞাতরাশি দুটির অসংখ্য মান দ্বারা সমীকরণটি সিদ্ধ হয়। এক্ষেপে সমীকরণের অসংখ্য বীজ থাকে, তাকে অনির্ণেয় সমীকরণ বলে।

বিশুদ্ধ গণিতে আৰ্ঘভটের এক মহৎ অবদান হচ্ছে একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির উদ্ভাবন। কোন্ সমস্তার সম্মুখীন হয়ে তিনি এই সমীকরণের সমাধান আবিষ্কার করেন এবং এক্ষেপ সমাধান পদ্ধতি বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

॥ কয়েকটি জ্যামিতিক সূত্র ॥

একথা স্বীকার্য, ভারতীয় জ্যামিতি গণিতধর্মী,—পাটীগণিতিক প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যেই ভারতীয় গণিতজ্ঞদের আনন্দ। আৰ্ঘভট জ্যামিতির উপপাত্ত ও সম্পাত্ত বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। তাঁর 'আৰ্ঘভটী' গ্রন্থে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সূত্রাকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে সূত্র জিভুজের বাহুগুলির অল্পপাত্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন, শঙ্কু ও ছায়া সম্পর্কিত সমস্তার বিশেষ প্রয়োগও করেছেন। তথাকথিত পীথাগোরাসের উপপাত্তটি সূত্রাকারে আৰ্ঘভট বলেছেন : "যট্টেচর দুজাবর্গঃ কোটিবর্গশ্চ কর্ণবর্গঃ সঃ"। অর্থাৎ ভুজ ও কোটির বর্গ বা কর্ণের বর্গও তাই।

জিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র :—

জিভুজস্ত কলশরীরং সমদলকোটি দুজার্ঘ সংবর্গঃ।

এখানে 'সমদলকোটি'-র অর্থ নির্ণয়ে জটিলতা আছে। বর্তমান ভাষায় সূত্রটি,—
জিভুজের ক্ষেত্রফল— $\frac{1}{2} \times$ ভূমি \times উচ্চতা।

বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র :—

সমপরিণাহস্থার্ধঃ বিকৃত্তার্ধহতমেব বৃত্তফলম্ ।

বৃত্তের ক্ষেত্রফল— $\frac{1}{2} \times$ পরিধি \times ব্যাসার্ধ ।

ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল— $\frac{1}{2} h (a + b)$; a, b —সমান্তরাল বাহু, h —উচ্চতা ।

গোলকের ক্ষেত্রফল— $\pi r^2 \times \sqrt{\pi r^2} = \pi r^2 \sqrt{\pi}$; r —ব্যাসার্ধ ।

॥ আচার্য আর্যভট ॥

আর্যভট কেবলমাত্র গবেষণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি। সর্বদা সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলীর মাঝে যে তিনি গণিত ও জ্যোতিষের জ্ঞান বিতরণ করতেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে আর্যভটের প্রদর্শিত নীতি ও পথে ‘আর্যভটীয় গোষ্ঠী’ গড়ে উঠে। ফলে আর্যভটের জনপ্রিয়তা এতখানি ছড়িয়ে পড়ে যে ব্রহ্মগুপ্ত ‘খণ্ড-খাতক’ গ্রন্থ লিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। কুহমপুর আচার্যরূপে আর্যভটকে পেয়েই তৎকালে গণিত ও জ্যোতিষ চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। আচার্য আর্যভটের তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিষ্য পরম্পরা প্রচারিত হয়েছে এবং আর্যভটীয় গ্রন্থের উপর সংস্কৃত ও আঞ্চলিক ভাষায় বহু টীকা-ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ-সব থেকেই জানতে পারা যায় তিনি কী অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

আর্যভটের প্রধান ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন প্রথম ভাস্কর (629 খৃঃ) । গুরুর আবিষ্কৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা রচনা ও প্রচারে তাঁর অবদান অসামান্য ; অগ্র শিষ্য লাটদেশ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সর্বসিদ্ধান্তগুরু সম্মান লাভ করেছিলেন। রোমক ও সুর্ধ-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাকার হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বরাহমিহির এই গণিতজ্ঞ সর্বদা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। অগ্রান্ত শিষ্যদের মধ্যে প্রভাকরের নাম উল্লেখযোগ্য ।

অষ্টম অধ্যায়

"In mathematics, it is even more important to be able to ask questions.
than to be able to answer them."
—A. H. Read.

বরাহমিহির

বরাহমিহিরের সময়কাল ধরা হয় খ্রীষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দী। তাঁর বিখ্যাত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থের রচনা কাল ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে মনে করা হয়। বরাহমিহির জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু জৈন ধর্মাবলম্বী আর একজন বরাহমিহিরের নাম পাওয়া যায়। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁকে গণধর ভদ্রবাহুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে খেতাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সুপণ্ডিত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত 'কল্পসূত্র' গ্রন্থ থেকে কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হলো :

"তাহারা (খেতাবর) বলেন, প্রতিষ্ঠান (গোদাবরী তীরস্থিত পৈথান) নগর-বাসী ভদ্রবাহু ও বরাহমিহির দুই সহোদর ছিলেন। ভদ্রবাহুর গুরু শোভিত্র তদীয় শিষ্য সমুত্তরবিজয় ও ভদ্রবাহুকে আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করার বরাহমিহির ক্রুদ্ধ হইয়া জৈনধর্ম ত্যাগ করেন। 'বৃহৎ সংহিতা' নামক বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া বরাহমিহির বিমর্ষ দেশে বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সেই দেশের অশিক্ষিত জনগণের মনোহরণ করিবার জন্য তিনি প্রচার করিলেন যে, সূর্যদেবের আহ্বানে তিনি [বরাহমিহির] সৌর যথেষ্ট আরোহণ করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং সকল গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া আদিয়াছেন। এই প্রচার কার্যের ফলে ঐ দেশের রাজা বরাহমিহিরের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে উক্ত দেশের জৈনদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। জৈনদিগের এই দুর্দশা দেখিয়া ভদ্রবাহু তাহার অলৌকিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা তর্ক যুদ্ধে তাঁহার সহোদর বরাহমিহিরকে পরাজিত করেন। কোভে ও ক্রোধে বরাহমিহির পঞ্চম লাভ করিয়া একটি 'হৃষ্টবাস্তব' অর্থাৎ অনিষ্টকারী অপদেবতারূপে আবিস্কৃত হইয়া জৈনদের ঘরে ঘরে নানাবিধ রোগের বীজ ছড়াইয়া দেন।"

‘ভাদ্রবাহবী সংহিতা’ অবলম্বনে এই কাহিনীর মধ্যে সত্যতা আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন না। বা হোক, আমাদের আলোচ্য বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। যদিও ‘বৃহৎ সংহিতা’ নামে তাঁর একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে, তবুও ইনি ভাদ্রবাহুর কল্পিত সহোদর নন।

বরাহমিহিরের ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ‘বৃহৎজাতক’ গ্রন্থের উপসংহারে সামান্য একটু উল্লেখ আছে। একটি শ্লোক থেকে জানতে পারা যায় :

“আদিত্যাদাসতনয়স্তদবাণ্ডবোধঃ কাপিথকে সবিতুলক বরপ্রসাদঃ।” অর্থাৎ আদিত্যাদাস তাঁর পিতা এবং তাঁর কাছে জ্ঞানলাভ করেন। কাপিথ নামক স্থানে সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করে তিনি বর লাভ করেন। অন্নস্থান সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে, তিনি অবন্তীনগরের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মগধের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে উজ্জয়িনীতে এসে গ্রন্থ রচনা করেন।

গণিতজ্ঞ হিসাবে বরাহমিহিরের তেমন নাম নাই। এমন কি জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর কোন মৌলিক অবদান বা আবিষ্কার নাই। তাঁর খ্যাতি জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসকার হিসাবে। অবশ্য এটা আমাদের কম পাণ্ডনা নয়। কারণ তখনকার ও পূর্ববর্তী যুগের জ্যোতিষকার ও গণিতজ্ঞদের বিষয়ে নানান ইঙ্গিত আমরা এই ইতিহাসকারের রচনা থেকেই জানতে পারি। বরাহমিহির কোন মৌলিক আবিষ্কার নাই করুন, কিন্তু পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকার দ্বারা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় তিনি মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে পাঁচখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের সার সংকলিত হয়েছে। এগুলি পৌলিশ সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত, বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, সৌর সিদ্ধান্ত ও পৈতামহ সিদ্ধান্ত। বরাহমিহিরের মতে এই পাঁচখানি সিদ্ধান্তের মধ্যে সৌরসিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিভুল, আর পৈতামহ ও বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত সর্বাধিক নিকৃষ্ট। ‘বৃহৎজাতক’ ও ‘বৃহৎসংহিতা’ নামে দুটি জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। এই দুই গ্রন্থ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে—সময় নির্ধারণ, গ্রহদের অবস্থান, গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাঁর জ্যোতিষ গ্রন্থাদিতে ও হোরা শাস্ত্রে গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান। সে-কারণ তাঁর গ্রন্থে গ্রীক পারিত্যবিক শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায়।

আর্যভট্ট আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য যদি পরবর্তীকালে সমর্থিত হতো, তা হলে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষের ইতিহাস হয়তো অল্প রকম হতো। বিশেষ করে

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক নতুন আবিষ্কারের জন্ত তিনি কঠোর ভাবে সমালোচিত হন। “বরাহমিহির আর্ষভটের ‘সূ-ভ্রমণবাদ’ সমর্থন করেননি। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মেঘরাশির আদিবিন্দু থেকেই নক্ষত্রচক্রের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। আর্ষভটের আর্ষভটীয়তেও মেঘ রাশির আদি বিন্দুতেই বর্ষ গণনার সূত্রপাত। এমন হওয়া সম্ভব যে, বরাহমিহির আর্ষভট অবলম্বনেই মেঘ রাশির আদিবিন্দুতে নক্ষত্র চক্রের প্রারম্ভ নির্দিষ্ট করেন।” (—ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস)।

॥ প্রথম ভাস্কর ॥

ভারতীয় গণিতে দু’জন ভাস্করের নাম পাওয়া যায়। আলোচ্য ভাস্কর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। ইনি গণিতের ইতিহাসে প্রথম ভাস্কর নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ভাস্কর যিনি অসামান্য প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন, তিনি ষাটশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনি সাধারণত ভাস্কর নামেই পরিচিত।

কুম্ভমপুর নিবাসী আর্ষভটের প্রিয় শিষ্য প্রথম ভাস্করের গণিতে মৌলিক অবদান বেশী না থাকলেও তাঁর গুরুর মত ও পথ অবলম্বনে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাতেই তাঁর নাম কালের গ্রাস এড়িয়ে বাবার পক্ষে বখেটে। হয়তো প্রতিভাধর এই তরুণ ছাত্রটি গুরুর অলৌকিক প্রতিভার এমনভাবে প্রভাবিত ও সমাজের হয়েছিলেন যে, তাঁর আর মৌলিকতা প্রকাশের সুযোগ ঘটেনি। আর্ষভটের শিষ্যরা গুরুর প্রতি এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে, তাঁরা তাঁকে ‘ভগবান’ বা ‘প্রভু’ নামে সম্বোধন করতেন। এ-সম্পর্কে প্রথম ভাস্কর কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করতেন সে সম্বন্ধে ‘মহা-ভাস্করীয়’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “None except Āryabhaṭa has been able to know the motion of the heavenly bodies. Others merely move in the ocean of utter darkness of ignorance (Āryabhaṭiya ; K. S. Shukla).

প্রথম ভাস্কর তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন,—‘মহা-ভাস্করীয়’, ‘লঘু-ভাস্করীয়’ এবং ‘আর্ষভটীয়’ গ্রন্থের উপর সুবিখ্যাত টীকা ‘আর্ষভটীয় সূত্রভাস্ক’ বা ‘আর্ষভটীয় তন্ত্রভাস্ক’। ‘মহা-ভাস্করীয়’ গ্রন্থটি আর্ষভটীয় গ্রন্থের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত তিনটি অধ্যায় অবলম্বনে আট অধ্যায়ে বিভক্ত ভাস্কর। এখানে অনির্ণয়ের সমীকরণ, স্থান, কাল, দিক, গোলায় জিকোণমিতি, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহদের

উদয় ও অস্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থক, তিথি ও বিবিধ বিষয়ের উদাহরণ-সহ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। খ্রীস্বেপূর্বতন ভট্টাচার্য 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে মহা-ভাস্করীর-এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো বলেছেন : "এটিতে দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য এবং এক বর্ষে অধিমাস নির্ণয়ের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা আছে। গ্রন্থটিতে গ্রহদের অবস্থান নির্দেশ সঠিক কিনা তার নিরূপণের প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থটিতে গ্রহকর্ম বিষয়ের বিবরণ আছে। এ বিষয়টি প্রথম আর্ষভট্টের আর্ষভটীয়াতে প্রায় অনালোচিত।"

'লঘু-ভাস্করীর'-ও আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এটি মহা-ভাস্করীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। নবীন শিক্ষার্থীদের দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রবেশের সহজতম পথ।

একথা সত্য, আর্ষভট্ট অনির্ণয়ের সমীকরণের আবিষ্কারক। কিন্তু এর সম্পূর্ণ রূপ, পদ্ধতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে প্রথম ভাস্করের বিস্তৃত গবেষণার জন্মই। এমন কি 'হিম্মেদগ্র' নামে তিনি এর একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনও করেন। গণিতে এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রথম ভাস্কর কেবলমাত্র গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন না, জ্ঞানের অগ্ৰাঙ্ক শাখায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। 'আর্ষভট্টীয় সূত্রভাষ্য' গ্রন্থে নানা বিষয়ের উদ্ধৃতি তাঁর প্রতিভার বহুমুখীতা প্রমাণ করে। সেখানে ব্যাকরণ, বেদান্ত থেকে উদ্ধৃতি আছে, আর আছে মীমাংসা, অর্থশাস্ত্র, মহন্যূতি প্রভৃতি থেকে।

বিক্ষিপ্ত নানা উল্লেখ থেকে মনে হয় ভাস্করের পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কেবলের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সম্ভবত তিনি ওই দু'জায়গার কোন এক জায়গায় জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। দুটি জায়গার উল্লেখ থেকে মনে হয় তিনি একটি জায়গা থেকে উঠে গিয়ে অল্প জায়গায় বসবাস করে থাকবেন। যতদূর জানা যায় 629 খ্রীষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের বনভী-তে তিনি আর্ষভট্টীয় সূত্রভাষ্য রচনা করেন।

নবম অধ্যায়

“The history of mathematics may be instructive as well as agreeable ; it may not only remind us of what we have, but may also teach us how to increase our store.”

—F. Cajori.

ব্রহ্মগুপ্ত

মুষ্টিমের ধো কয়জন ভারতীয় গণিতজ্ঞ দেশ-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এমন কি বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্তের নাম সর্বপ্রথম করতে হয়। অর্জ সাটন এই গণিতজ্ঞ সম্বন্ধে বলেছেন, “One of the greatest scientists of his race and the greatest of his time.” সপ্তম শতাব্দীর বিশ্বগণিতের ইতিহাসে এমন মৌলিক প্রতিভা খুব কমই দেখা যায়।

মৌভাগ্যের বিষয় ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ‘ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে বংশপরিসর, আবির্ভাবকাল এবং গ্রন্থ প্রণয়নকাল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছেন। স্লেোক দুটি উদ্ধৃত করা হলো :

শ্রীচাপবংশভিলকে শ্রীব্যাভ্রযুখে নৃপে শকমৃপালাং

পঞ্চাশৎসংস্কৃতৈর্বর্ষভট্টৈঃ পঞ্চভিন্নভট্টৈঃ ।

ব্রাহ্মস্মৃতিসিদ্ধান্তঃ সঙ্কল্পনগণিতজ্ঞ গোলবিংপ্রীতৈত্যা

জিংশদর্শেণ কৃতো জিফুযুতব্রহ্মগুপ্তেণ ।

—অর্থাৎ চাপবংশীয় নৃপ ব্যাভ্রযুখের রাজত্বকালে ৫৫০ শকে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে গণিত ও গোলবিদগণের প্রীতির জন্য জিফুযু পুত্র ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মস্মৃতিসিদ্ধান্ত রচনা করেন।

উদ্ধৃত স্লেোকটি থেকে জানতে পারা যায়, ব্রহ্মগুপ্তের জন্মকাল ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর পিতার নাম জিফুগুপ্ত। অনবিরুদ্ধের মতে মূলতান ও অহিলওয়ার নামক স্থানের মধ্যবর্তী ভিলমাল নামক স্থানে ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎলায়ের মতে

শুজরাটের উত্তর সীমান্তবর্তী ভীনমাল বা শ্রীমালই হচ্ছে অলবিকুণী কথিত ভিলমাল। পূর্ব প্রচলিত ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ সাধন করে যুগোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর গ্রন্থের নাম দেন ‘ব্রহ্ম-স্মৃট-সিদ্ধান্ত’।

॥ ব্রহ্ম-স্মৃট-সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

আর্ষভট্টীয়-এর মত এই গ্রন্থটি ক্ষুদ্র নয়। এতে মোট অধ্যায় চব্বিশ,—অবশ্য ধ্যান-গ্রন্থ অধ্যায়টি বাদ দিলে। অলবিকুণী এই অধ্যায়টি বর্জন করার কথা বলেন। “কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, অধ্যায়টিতে বিভিন্ন প্রম্ভাবলীর গাণিতিক সমাধানের চেয়ে অহুমাননির্ভর প্রচেষ্টাই নজরে আসে।” যা হোক,—এতে মোট শ্লোক সংখ্যা ১,০২২। প্রথম দশটি অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। - গ্রহদের গড় গতি ও প্রকৃত গতি, স্থান-কাল-দূরত্ব সম্পর্কিত সমস্যা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহদের উদয় ও অস্ত সম্পর্কিত আলোচনাই অধ্যায়-গুলির বিষয়বস্তু। বাইশ সংখ্যক অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে। একাদশ অধ্যায়টি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ, এই ‘তত্ত্ব-পরীক্ষাধার’-এ অস্ত্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মতের আলোচনা আছে। আর্ষভট্ট, লাট, ক্রীসেন, বিয়ুচেন্স ও প্রত্ময় কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন মতবাদ এই অধ্যায়ে সমালোচিত হয়েছে। এমন আত্ম-নির্ভরশীল ও দৃঢ় সমালোচনা প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। ব্রহ্মগুপ্তের ত্রায় প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের পক্ষেই ওইরূপ সমালোচনা সম্ভব। বেদান্তের যুগ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, জৈনদের দুই সূর্য, দুই চন্দ্র প্রভৃতি উদ্ভট কল্পনার তীব্র সমালোচনা এখানে দেখা যায়। তিনি আর্ষভট্টের ‘রাহ-কেছু তত্ত্ব’ উপেক্ষা করে বলেন যে, গ্রহণ হওয়ার কারণ চন্দ্র ও পৃথিবী কর্তৃক ছায়া বিস্তার। অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তির বোধ হয় কিছুটা বক্ষণশীল হন। আইনস্টাইন তার এক উদাহরণ। ব্রহ্মগুপ্ত সে-কারণে বোধ করি আর্ষভট্টের “জু-ভ্রমণবাদ” স্বীকার করেননি।

গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। মাত্র সাড়ে চারটি অধ্যায় গণিতের জগৎ নির্দিষ্ট হয়েছে। দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে গণিত ও কুট্টকের আলোচনা আছে। প্রচলিত প্রথা ও রীতি অহুসারে গণিতে পাটীগণিত, শ্রেণী, জ্যামিতি প্রভৃতির সংমিশ্রণ আছে। কুট্টক অধ্যায়ে আছে বীজগণিতের আলোচনা।

মাতৃষের প্রকাশের প্রথম ভাষা কবিতা। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে পুস্তকের আবির্ভাব গুপ্তের অনেক আগে। এই ঐতিহাসিক দিকটি বিচার করলে ভারতীয় রীতি কোন ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের প্রায় সব বিষয়ই ছন্দাকারে রচিত হয়েছে। অবশ্য এর অন্য কারণ থাকলেও রীতি ও ঐতিহ্যের যে অল্পবর্তন আছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থের দ্বারা ‘ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্ত’-ও ঘনপিন্ড ছন্দে রচিত বলে এর ব্যাখ্যা সহজ নয়। নবম শতাব্দীতে পৃথুদকস্বামী এর ভাষ্য রচনা করেন। বহু উদাহরণের সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্তের গাণিতিক নিয়ম ও ফলের ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটি বোঝার পথ সুগম করেন। কিন্তু একপ সম্বন্ধ করা হয়, উদাহরণগুলি পৃথুদকস্বামীর না ব্রহ্মগুপ্তের। সেকালের রীতি ও ঐতিহ্য অল্পস্বামী গুরুত্ব বিজ্ঞা ও শিক্ষা শিল্প পরম্পরায় বাহিত হতো। স্মরণ্য এমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে না যে ব্রহ্মগুপ্তের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ শিল্প পরম্পরায় পৃথুদকস্বামীর নিকট পৌঁছায়নি। তাছাড়া ব্রহ্মগুপ্তের দ্বারা প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞ তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম ও সূত্রাদি উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেননি,—একপ কল্পনা করা যায় না।

॥ ব্রহ্মগুপ্তের অবদান ॥

ব্রহ্মগুপ্তের গাণিতিক প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনা গণিতের ইতিহাসের সম্পূর্ণ বাইরে। তবুও এখানে আমরা তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামান্য আলোচনা করব।

পাটীগণিতে ব্রহ্মগুপ্তের উল্লেখযোগ্য বিশেষ অবদান নাই। কিন্তু বীজগণিতে রয়েছে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তথাকথিত ‘পেলিয়াস সমীকরণ’ নামে খ্যাত দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের বীজ নির্ণয়ে তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। কিন্তু বিষয়টি সাধারণ পাঠকের পক্ষে জটিল হবে বলে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। অন্তত আমরা এ-বিষয়ের সামান্য অবতারণা করব।

A. দ্বিঘাত সমীকরণ

চতুঃস্থ ও বকশালী পাণ্ডুলিপিতে দ্বিঘাত সমীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এই সমীকরণ সমাধানের কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে সূত্রটি থাকলেও সমাধান পদ্ধতির কোন বিবরণ নাই।

আর্ধভট ও ব্রহ্মগুপ্ত সূদকবা অঙ্কে এই সমীকরণের সমাধান সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নের সূদকবা অঙ্কটি ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত দ্বিঘাত সমীকরণ সংক্রান্ত একটি উদাহরণ।

উদাহরণ : সমগ্রহণে 500 টাকার 4 মাসের সুদ 10 মাসের জন্য ধার দেওয়া হলে মোট সুদ 78 টাকা হয়। মাসিক সুদের হার নির্ণয় কর।

500 টাকার 4 মাসের সুদ x হলে,

সর্তাহসারে, সুদের মাসিক হার $\frac{x}{20}\%$

$$\text{সুতরাং, } \frac{x^2}{200} + x = 78$$

$$\text{বা, } x^2 + 200x - 15600 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-200 \pm \sqrt{(200)^2 + 4 \cdot 15600}}{2}$$

$$= \frac{-200 \pm 320}{2} = \frac{120}{2} = 60$$

$$\therefore \text{মাসিক সুদের হার } \frac{1}{20} \times 60 = 3\%$$

B. দু'একটি সূত্র

ভারতে দশমিকের প্রচলন অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে ভগ্নাংশ-বিষয়ের ধারণা প্রচলিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভগ্নাংশ-ঘটিত সূত্রের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এ-বিষয়ে ভগ্নাংশ প্রক্রিয়া সহজ ও সরল করার ব্যাপারে ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র আছে।

$\frac{a}{b}$ এই আকারের ভগ্নাংশকে সহজ ও সরল করার ব্রহ্মগুপ্ত প্রদর্শিত সূত্রটি

নিম্নরূপ :

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b+h} + \left(\frac{a}{b+h} \right) \frac{h}{b}$$

উদাহরণ : (i) $\frac{1920}{93} - \frac{1920}{93+3} + \left(\frac{1920}{93+3}\right) \frac{3}{93}$

$$= \frac{20}{93} + \frac{20}{93} \cdot \frac{3}{93} = 20 \frac{60}{93}$$

এখানে $h=3$ ধরা হয়েছে।

(2) $\frac{9999}{97} - 101 + \frac{202}{97} - 101 + 2 \frac{2.4}{97} - 103 \frac{8}{97}$

এখানে $h=2$ এবং 4 ধরা হয়েছে।

(3) কোম সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ের সূত্র :

$$x^2 - (x-y)(x+y) + y^2$$

উদাহরণ :

$$77^2 - 74.80 + 9 = 5929$$

এখানে $y=3$ ধরা হয়েছে।

এই নিয়মটি গ্রীকদের জানা ছিল। গ্রীক গণিতে এই সূত্রটি ‘নিকোম্যাকাস সূত্র’ নামে পরিচিত। নিকোম্যাকাস খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

C. শ্রেণী

আর্যভট্টের ছায় ব্রহ্মগুপ্তও শ্রেণী বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত স্বাভাবিক সংখ্যা শ্রেণীর নাম দিয়েছেন ‘একোত্তরমেকাভ’। অবশ্য ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণী ভারতীয় গণিতে অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম এই ধারাটি মধ্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যযুগের অল্প খ্যাতিসম্পন্ন গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে এক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। মধ্যযুগের ধারাটি যদি রাজনৈতিক কারণে অবলুপ্ত না হতো, তা হলে ভারতীয় গণিত তথা ভারতীয় মনীষার এমন অধঃপতন ঘটত না। ব্রহ্মগুপ্ত স্বাভাবিক বর্গ-সংখ্যা ও ঘন-সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ দিয়েছেন :

$$(1) 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(2) 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

সমাস্তর শ্রেণীর আলোচনায় আর্ষভটের চেয়ে ব্রহ্মগুপ্ত বেশি আরো স্পষ্ট। শেষপদ, মধ্যপদ ও সমষ্টি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর ব্রহ্মসুটসিদ্ধান্তের গণিতাধ্যায়ে ১৭ নং সূত্র নিম্নরূপ :

পদমেকহীনমুত্তরগুণিতং সংযুক্তমাদিনাঃ সত্যধনম্ ।

আদিসুতাস্যধনার্থং মধ্যধনং পদগুণনং গণিতম্ ॥

অর্থাৎ “প্রথম পদ, সাধারণ অন্তর এবং পদসংখ্যা জানা থাকিলে শেষ পদ কত সংখ্যা, মধ্য পদ কত সংখ্যা এবং যে কোন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা যেতে পারে। পদ সংখ্যা থেকে এক বিয়োগ করে ঐ বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ করে তারপর প্রথম পদ যোগ করলে শেষ পদ পাওয়া যাবে। এই শেষ পদের সঙ্গে প্রথম পদ আবার যোগ দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ দিলে মধ্য পদ পাওয়া যাবে। এই মধ্য পদকে পদসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমগ্র পদের সমষ্টি পাওয়া যাবে।” (প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা)

এখন, সমাস্তর শ্রেণীর প্রথম পদ— a , সাধারণ অন্তর— b হলে,

$$(1) \text{ শেষতম পদ বা } n\text{-তম পদ} = a + (n-1)b$$

$$(2) \text{ মধ্যপদ} = \frac{1}{2} \{2a + (n-1)b\}$$

$$(3) \text{ সমষ্টি} = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)b\}$$

ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি বর্তমানে প্রচলিত সূত্রটির অল্পরূপ নয়,—একটু তফাৎ আছে। বর্তমানে আমরা $a + ar + ar^2 + \dots$ n পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে $\frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ সূত্রটি ব্যবহার করি। কিন্তু ভারতীয় গণিতজ্ঞরা r^n -এর স্থলে N ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ভারতীয় সূত্রটি $\frac{a(N-1)}{r-1}$ । ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাস্করাচাৰ্য্যের সুপণ্ডিত পৃথুদকস্বামীর ব্যাখ্যা থেকে জানতে পারা যায় N -সঙ্কেতের অর্থ হচ্ছে ‘ r^n ’। কিন্তু গুণোত্তর শ্রেণীর এই সূত্রটি অয়ং ভাস্করাচার্যের উদ্ভাবিত না ব্রহ্মগুপ্তের—এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না।

“গণিতজ্ঞদের রাজপুত্র” গাউস পাটীগণিতিক সমাধানে আনন্দ পেতেন। ভারতীয় গণিতজ্ঞরাও সর্বত্র পাটীগণিতিক প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে আনন্দ পেতেন। তাই, গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের পদ্ধতির মধ্যে পাটীগণিতের চলিত-নিয়ম

লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে নিয়মটি ও পরে একটি উদাহরণ দ্বিধে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা N -অৰ্থে যে ' r^n ' বোঝাতেন সেটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

নিয়ম ৪:—কোন গুণোত্তর শ্রেণীর পদসংখ্যা n যুগ্ম হলে, একটি স্তম্ভে $\frac{n}{2}$ লিখে ঠিক তার পাশের অল্প একটি স্তম্ভে বর্গ বোঝার জন্ম ' S ' (Square) লিখতে হবে, এবং n অযুগ্ম হলে একটি স্তম্ভে $(n-1)$ লিখে ঠিক তার পাশে অল্প একটি স্তম্ভে গুণ বোঝাবার জন্ম ' m ' (multiply) লিখতে হবে। পদসংখ্যা যুগ্ম অথবা অযুগ্ম হলে যথাক্রমে ২ দ্বারা ভাগ এবং ১ বিয়োগ দ্বারা বাকশি পর্যন্ত প্রথম পদ বা ১-সংখ্যায় পৌঁছানো না যায়, ততক্ষণ এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অতঃপর উদ্ব্যক্রমে m -স্থানে ' r ' দ্বারা গুণ এবং ' S '-স্থানে বর্গ করে একেবারে শেষপদে পৌঁছতে হবে।

ধরা যাক, কোন গুণোত্তর শ্রেণীর পদসংখ্যা $(n)=29$ -অযুগ্ম। সুতরাং উপরের নিয়মামুসারে,—

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
29-1	$m=r \times r^{28}=r^{29}$
$\frac{29}{2}$	$S=(r^{14})^2=r^{28}$
$\frac{29}{2}$	$S=(r^7)^2=r^{14}$
7-1	$m=r \times r^6=r^7$
$\frac{7}{2}$	$S=(r^3)^2=r^6$
3-1	$m=r \times r^2=r^3$
$\frac{3}{2}$	$S=(r)^2=r^2$
1	$\rightarrow r$

সুতরাং $N=r^{29}=r^n$

৥ প্রাচীন উৎস ও ঐতিহাসিক উপাদান ৥

পাটিগণিতের অঙ্কের বিভিন্ন প্রকার উদাহরণের সঙ্গে আমরা প্রায় লবাই পরিচিত। কিন্তু ভারতেও অবাক লাগে :সেই একই উদাহরণ বহু বহু শতাব্দী ধরে প্রায় অবিকল চলে আসছে। পার্থক্য কেবল এককে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতের এই দিকটি বেশ চিত্তাকর্ষক। এমন কি, যে ঐতিহাসিক উপাদানের অঙ্কে

আমরা হস্তে করে চিঠিপত্র-দলিল-দস্তাবেজ, লিপিমাল্য, শিলালিপি, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতিতে অমূল্যসন্ধান চালাই, তার উপাদান প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু অঙ্কের উদাহরণের মধ্যে নিহিত আছে, এ-কথা আমাদের ঐতিহাসিকদের মনে উদয় হয় না। আমাদের মনে হয়, গণিতের স্তায় অতি বাস্তব বিষয়ের উদাহরণগুলি ঐতিহাসিকদের অনেক প্রামাণিক উপাদান যোগাতে পারে। কিন্তু সে-কথা থাক। আমরা এখানে ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থ থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে বর্তমানে প্রচলিত অঙ্কের প্রাচীনতা দেখাব।

1. উদাহরণ : চারটি নল যথাক্রমে 1 দিন, $\frac{1}{2}$ দিন, $\frac{1}{3}$ দিন ও $\frac{1}{4}$ দিনে একটি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে। নলগুলি এক সঙ্গে খুলে দিলে কখন চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে ?

2. উদাহরণ : চারটি বিড়ালকে সম-সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। কোন পূজার্ত্তান উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে বিড়ালগুলি থেকে $\frac{1}{2}$ অংশ, $\frac{1}{3}$ অংশ, $\frac{1}{4}$ অংশ ও $\frac{1}{5}$ অংশ একত্রিত হলো। প্রত্যেক বিড়ালকে থেকে আগত ছাত্রদের সঙ্গে যথাক্রমে 1, 2, 3 ও 4 যোগ করলে 87 হয়। আবার ওই সংখ্যাগুলি বিয়োগ করলে 67 হয়। তা হ'লে প্রত্যেক বিড়ালকে থেকে ক'জন করে ছাত্র এসেছিল ?

দুটি অঙ্কই অতি সহজ। সেজন্য সমাধান করা হলো না। আমাদের বক্তব্য উপরের অঙ্ক দুটির মত উদাহরণ এখনো পাটীগণিতের উদাহরণরূপে ব্যবহার করা হয়। প্রায় তেরো-চৌদ্দ শ' বছর ধরে বংশ পরম্পরায় আমরা একই ধরনের অঙ্ক কবে আসছি। সেই Tradition সমানে চলেছে, কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি,—এস. ওয়াজেদ আলীর কথাটি বার বার মনে পড়ে।

॥ জ্যামিতি ॥

বৈদিক গ্রন্থে ত্রিভুজের উল্লেখ আছে, শুদ্রশ্রেণী ত্রিভুজ বিষয়ক আলোচনা আছে। কিন্তু জৈন গণিতজ্ঞরা ত্রিভুজ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। আর্ঘটত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন এবং সমকোণী ত্রিভুজের ধর্ম বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু ত্রিভুজ বিষয়ক আরো বিস্তৃত আলোচনা আমরা ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থে দেখতে পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ব্রহ্মগুপ্ত ত্রিভুজকে “একবাহু হীন চতুর্ভুজ” বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

তুলনয় ত্রিভুজ একবাহুপ্রতিবাহুযোগদলঘাতঃ ।

ভূজযোগার্ঘ্যচতুর্ভুজভূজোনঘাতাৎ পদং সূত্রম্ ॥

অর্থাৎ a, b, c ও d কোন চতুর্ভুজের বাহু হলে, স্থূল ক্ষেত্রফল $= \frac{a+c}{2}$.

$\frac{b+d}{2}$ এবং ত্রিভুজের স্থূল ক্ষেত্রফল $= \frac{\text{ভূমি}}{2}$. অপর বাহুদ্বয়ের সমষ্টি $= \frac{a}{2} \cdot \frac{b+c}{2}$

কিন্তু স্লোকের শেষাংশ থেকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূক্ষ্মতম মান পাওয়া যায়।
ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, এখানে, $s =$ অর্ধপরিমাপ $= \left(\frac{a+b+c}{2} \right)$

প্রমাণ ব্যতিরেকে তিনি মূলদ সমষ্টিবাহু ত্রিভুজের সমাধান নিম্নরূপ দিয়েছেন :

কৃত্তিমুতিরসদৃশরাশোর্বাহুর্ঘাতী হিসংগুণো লঘঃ ।

কৃত্যন্তরমসদৃশরাশিগুণং হিসমত্রিভুজ ভূমিঃ ॥

অর্থাৎ m ও n দুটি অসম মূলদ রাশি হলে, সমষ্টিবাহু ত্রিভুজের বাহু m^2+n^2 , ভূমি m^2-n^2 এবং উচ্চতা $2mn$ হবে। এই সূত্র থেকে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির পরিমাপ ভূজ $= m^2-n^2$, কোটি $= 2mn$ এবং অতিভূজ $= m^2+n^2$ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের বাইশতম অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশতম স্লোকে ব্রহ্মগুপ্ত সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর পরিমাপ নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র দিয়েছেন। 'a' যদি সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহু হয়, তা হলে বাহু তিনটির পরিমাপ হবে, $a, \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{m} - m \right)$ এবং $\frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{m} + m \right)$, m যে-কোন একটি মূলদরাশি।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজ বাদে অষ্ট দুটি বাহুর যে-কোন একটি প্রদত্ত হলে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর পরিমাপ জানা যায়। আবার, অতিভূজ প্রদত্ত হলে বাহুগুলির পরিমাপ কিভাবে নির্ণীত হবে সে-পদ্ধতিও ব্রহ্মগুপ্তের অজানা ছিল না। কিন্তু প্রত্যকভাবে এই সূত্রটি পাওয়া যায় না। মহাবীরাচার্য বাহুদ্বয়ের পরিমাপ দিয়েছেন $c, \frac{2mnc}{m^2+n^2}$ এবং $\frac{m^2-n^2}{m^2+n^2} \cdot c$


কিন্তু সূত্রটি মহাবীরের মৌলিক আবিষ্কার নয়। ব্রহ্মগুপ্তের সমকোণী ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের পরিমাপ নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র থেকেই এই সূত্রটি পাওয়া যায়।

কিন্তু "History of Theory of Numbers"-এর গ্রন্থকার ডিকসন উপরের সূত্র দুটির আবিষ্কারের সব কৃতিত্ব ফিবোনাচ্চি (Fibonacci) ও ভিয়েটাকে (Vieta) প্রদান করেছেন। প্রথম জন ত্রয়োদশ ও দ্বিতীয় জন ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর ব্রহ্মগুপ্ত এঁদের কত পূর্ববর্তী সেকথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নাই। তবে মনে হয়, ডিকসন ভারতীয় জ্যামিতি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না।

॥ একটি সম্পাত্ত ॥

যে দুটি সূত্র বিষয়ে আলোচনা হলো তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মগুপ্ত একটি সম্পাত্তের অবতারণা করেছেন। এটি একটি অমুসিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হতে পারে।

সম্পাত্তাঃ দুটি বাহুর ছেদবিশ্লুগামী উচ্চতাসহ এমন একটি ত্রিভুজ অঙ্কন কর যার বাহুগুলিকে মূলদরাশিতে প্রকাশ করা যায়।



চিত্র—17

চিত্রে ABC দ্বিপিত ত্রিভুজ। দুটি সমকোণী ত্রিভুজকে পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে যাদের একটি বাহু প্রদত্ত মূলদরাশি x । ABD এবং ADC দুটি সমকোণী ত্রিভুজাঙ্কনের দ্বারা ই এক্ষণ সম্ভব।

ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র অনুসারে,—

$$AB = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a} + a \right), BD = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a} - a \right),$$

$$AC = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{b} + b \right), DC = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{b} - b \right)$$

$$\begin{aligned} \text{অতরাং } BC &= BD + DC = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a} - a \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{b} - b \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{a} + \frac{x^2}{b} - a - b \right) \end{aligned}$$

এখানে a এবং b যেকোন মূলদরাশি, ব্রহ্মগুপ্ত কথিত ‘ঐচ্ছিক’ রাশি এবং x হচ্ছে ‘ইষ্ট’ অর্থাৎ প্রদত্ত মূলদরাশি।

12 একক উচ্চতা বিশিষ্ট কোন ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হলে, বাহুত্রয় 13, 14, 15 অথবা 13, 4 ও 15 একক বিশিষ্ট হবে। লক্ষণীয়, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ইউরোপীয় গণিতে এ ধরনের সমস্যা ও তার সমাধান নাই।

॥ চতুর্ভুজ ॥

চতুর্ভুজ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতে দুটি গোষ্ঠী দেখা যায়। একদল চতুর্ভুজ বলতে বুঝতেন বৃত্তের চারটি জ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, আর অন্য দল বর্তমানে প্রচলিত ধারণা পোষণ করতেন। বেশীর ভাগ ভারতীয় গণিতজ্ঞ প্রথম মতাহুসারী। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, মহাবীর এবং পরবর্তীকালের আর্যভট্টীয় গোষ্ঠী আছেন। আর্যভট্ট কোন্ মতাহুসারী সেন-সম্বন্ধে স্থম্পষ্ট কিছু না বলা গেলেও তিনি প্রথম দলভুক্ত হবেন বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় দলে আছেন দ্বিতীয় আর্যভট্ট এবং তাক্ষরাচার্য। দ্বিতীয় আর্যভট্ট সর্বপ্রথম ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রের বাণার্থ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যদিও এটা চূর্ভাগ্যজনক, তিনি ব্রহ্মগুপ্তের তত্ত্বের সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি, তবুও গণিতে চতুর্ভুজ সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ কম পাওয়া নয়। কারণ, এর ফলেই সাধারণ চতুর্ভুজ সম্পর্কীয় গবেষণার সূত্রপাত হয়।

বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ব্রহ্মগুপ্তের বিস্ময়কর অবদান আছে। কিন্তু তাঁর সূত্রে কোথাও ‘অন্তর্লিখিত’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর গবেষণা, সূত্র এবং পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি থেকে মনে হয় এই উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। খুব সম্ভব, তাঁর সময়ে চতুর্ভুজ বলতে বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজই বোঝানো হতো। দ্বিতীয় আর্যভট্টের পর থেকে বা তাঁর কিছু পূর্ববর্তী সময় থেকে সম্ভবত এই ধারণার পরিবর্তন হয়ে থাকবে। ফলে ব্রহ্মগুপ্তের তত্ত্ব

প্রশংসা ও নিন্দা এই উভয়ই কুড়োতে থাকে। বাই হোক,—ভারতীয় গণিতে বৃন্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের দুটি তত্ত্ব ব্রহ্মগুপ্তের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

(1) ভূজযোগার্ঘ্যচতুর্ভুজভূজানঘাতঃ পদং সূক্ষ্মম্ ॥

a, b, c এবং d বৃন্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বাহু হলে, এর ক্ষেত্রফল

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}; \quad \left[s = \frac{a+b+c+d}{2} \right]$$

(2) কর্ণৈজ্জিতভূজঘাতৈক্যমুভয়ধাযোগ্যভাজিতঃ গুণয়েৎ ।

যোগেন ভূজপ্রতিভূজবৰ্যোঃ কর্ণো পদে বিষয়ে ॥

বৃন্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য a, b, c ও d হলে এবং x এবং y উহাদের কর্ণ হলে, উপরের সূত্র থেকে লেখা যায়,

$$x = \sqrt{\frac{(ab+cd)(ac+bd)}{ad+bc}}$$

$$\text{এবং } y = \sqrt{\frac{(ad+bc)(ac+bd)}{ab+cd}}$$

এ-সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্তটি বিস্ময়কর : তিনি বলেন, বৃন্তে অন্তর্লিখিত সকল চতুর্ভুজের বাহু, কর্ণ, লম্ব, ক্ষেত্রফল, এমন কি, পরিলিখিত বৃন্তের ব্যাস পর্যন্ত মূলদরাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এ-ধরনের চতুর্ভুজ “ব্রহ্মগুপ্তের চতুর্ভুজ” নামে খ্যাত।


এ-বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্তের তৃতীয় অবদান হচ্ছে দুটি সমকোণী ত্রিভুজের ‘ভূজ’ ও ‘কোটি’-কে পরস্পরের অতিভূজের গুণনের দ্বারা বিষমবাহু চতুর্ভুজের বাহু নির্ণয়। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

জাত্যদ্বয়কোটিভূজাঃ পরকর্ণগুণাঃ ভূজাস্তচতুর্বিষয়ে ।

অধিকো ভূয়ঃ হীনো বাহুদ্বিতয়ঃ ভূজাবতো ॥

অর্থাৎ দুটি ‘জাত’-র কোটি ও ভূজকে পরস্পরের অতিভূজ দ্বারা গুণ করে বিষম চতুর্ভুজের বাহু পাওয়া যাবে। ‘অধিক’টি ভূমি, ‘হীন’-টি সম্মুখীন বাহু এবং অন্য দুটি পার্শ্ব বাহু।

পূর্ব পৃষ্ঠার সূত্রটি থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, চতুর্ভুজ অঙ্কনে দুটি সমকোণী ত্রিভুজ অপরিহার্য।



চিত্র—18

ধরা যাক, দুটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলি যথাক্রমে (a, b, c) এবং (α, β, γ) এবং এদের বাহুগুলি $c^2 = a^2 + b^2$ এবং $\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2$ এরূপ সম্বন্ধযুক্ত।


চিত্রে BOC এবং COD ত্রিভুজ দুটি অঙ্কন করা হলো এবং এদের বাহুগুলি যথাক্রমে $(a\alpha, a\beta, a\gamma)$ এবং $(\alpha a, \alpha b, \alpha c)$ । BD -র অপর দিকে DOA এবং AOB দুটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা হলো এবং এদের বাহুগুলি যথাক্রমে $(b\alpha, b\beta, b\gamma)$ এবং $(\beta a, \beta b, \beta c)$ । সুতরাং $ABCD$ চতুর্ভুজের বাহুগুলি $(c\beta, a\gamma, c\alpha, b\gamma)$ । এখানে কর্ণদ্বয় পরস্পর সমকোণে ছেদ করেছে।

এটি ব্রহ্মগুপ্তের চতুর্ভুজ।

এখন যদি $(3, 4, 5)$ এবং $(5, 12, 13)$ বাহুবিশিষ্ট সমকোণী ত্রিভুজ দ্বারা চতুর্ভুজ অঙ্কন করা যায়, তাহলে চতুর্ভুজের বাহুগুলি হবে 60, 39, 25, ও 52 একক বিশিষ্ট।

॥ ট্রাপিজিয়াম ॥

বৈদিক ও জৈন ধর্মে ট্রাপিজিয়ামের বিশিষ্ট স্থান ছিল। বিশেষ করে সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামের অঙ্কশীলন উভয় ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর জ্যোতির্বিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যাপকতার অরণ্যে এটি হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু ভারতীয় গণিতের সব যুগেই এর কিছু-না-কিছু অঙ্কশীলন হয়েছে। আর্থটট ট্রাপিজিয়াম বিষয়ে মাত্র একটি সূত্র দিয়েছেন, ব্রহ্মগুপ্ত এর ক্ষেত্রকল সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু তিনি এর অত্যন্ত জ্যামিতিক ধর্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকটিতে এই ধর্মের আভাস আছে। পৃথুদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক ব্যবহৃত ‘অবিষম’-এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন শব্দটি ‘বর্গ’, ‘আয়তক্ষেত্র’ এবং ‘সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম’ অর্থে প্রযোজ্য। ডঃ টি. এ. সরস্বতী আশ্বার মতে ‘অবিষম’-র অর্থ “দুটি কর্ণ অসম নয়” (having the two diagonals not unequal) হতে পারে। বাই হোক, ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র অবলম্বনে সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামের কর্ণ নির্ণয় করা যায়।



চিত্র—19

ধরা যাক, $ABCD$ ট্রাপিজিয়ামের বাহুর দৈর্ঘ্য a, b, c ও d

$DE \perp AB$ এবং B ও D যুক্ত করা হলো। তাহলে,


$$BD^2 = DE^2 + BE^2 = AD^2 - AE^2 + BE^2$$

$$= d^2 - \left\{ \frac{(a-c)}{2} \right\}^2 + \left\{ \frac{(a+c)}{2} \right\}^2$$

$$= d^2 + ac$$

$$= bd + ac \quad [\because b = d]$$

যে চতুর্ভুজের বিপরীত দুটি বাহু সমান, সে-বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত বাহুগুলির পরিমাপ $c, \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{k} - k \right) + b, c$, এবং $\frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{k} - k \right) - b$



চিত্র—২০

ADL ত্রিভুজের বাহুত্রয় c, a , এবং b । ব্রহ্মগুপ্তের সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত সূত্র অনুসারে ALC সমকোণী ত্রিভুজের একটি বাহু প্রদত্ত হলে, তিনটি বাহুর পরিমাপ হবে $a, \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{k} - k \right)$ এবং $\frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{k} + k \right)$ । সুতরাং $LC = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{k} - k \right)$, $AC = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{k} + k \right)$ । অতএব $DM = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{k} - k \right)$ । অতএব AB এবং CD বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় সম্ভব। এখন, যদি $AL \parallel BM$ হয়, তাহলে $ABCD$ একটি সমান্তরাল ট্রাপিজিয়াম বলে গণ্য হয়।

॥ এক নতুন তত্ত্বের দিশারী ॥

ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্ত ছাড়া ব্রহ্মগুপ্ত বিস্তৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ‘খণ্ড খণ্ডক’ নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। ৫৮৭ শকাব্দে বা ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি এটি রচনা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিমিত। আর্ধভট সাইন-তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই সাইন-তালিকা থেকে যথ্যবর্তী সাইন-কোণ নির্ণয়ের এক অভিনব পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর ‘খণ্ড খণ্ডক’ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে তিনি যে সূত্রটি দিয়েছেন তা প্রায় এক হাজার বছর পরে নিউটন প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা আবিষ্কার করেন। পদ্ধতিটি প্রক্ষেপ তত্ত্ব (Theory of Interpolation) বলে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,

পরবর্তীকালের কোন গণিতজ্ঞের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ হয়নি। ভাস্করের আয় প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে নিশ্চয় তত্ত্বটি সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারত। এমন কি মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতীয় গণিতজ্ঞরা যারা আধুনিক গণিতের অনেক উচ্চতর গবেষণা করে গেছেন তাঁরাও হয়তো এক অভিনব মাফিয়া লাভ করতে পারতেন।

॥ বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ॥

“গণক-চক্র-চূড়ামণি” ব্রহ্মগুপ্ত কেবল স্বদেশেই পূজিত হতেন না, বিদেশেও তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধার আগুনটি ছিল সংরক্ষিত। খলিফা অল-মনসুর নামে বিখ্যাত আরব সুলতান টাইগ্রীস নদীর তীরে বাগদাদ নগরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমন্ত্রণে কঙ্ক নামে উজ্জয়িনীর এক পণ্ডিত গণিতজ্ঞ 770 খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে গিয়ে আরবদের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পাটীগণিত শিক্ষা দেন। সুলতানের আদেশে 796 বা 806 খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ ইবন ইব্রাহিম অল-ফজারী কর্তৃক ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্ত আরবী ভাষায় অনূদিত হয় ‘সিন্দ-হিন্দ’ বা ‘হিন্দ-সিন্দ’ নামে। ইয়াকুব ইবন তারিখ্ ‘খণ্ড খাণ্ডক’ গ্রন্থটি ‘আর-কন্দ’ বা ‘অল-কন্দ’ নামে অনূদিত করেন। ভারতীয়দের পক্ষে এটা কম গৌরবের নয়।

॥ সংযোজন ॥

॥ বররুচি ॥

আর্যভট-পূর্ব কোন গণিতজ্ঞের নাম প্রায় আরবা জানি না। কিন্তু ভারতের দক্ষিণে হ্রদর কেরালা রাজ্যে দু’একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় যাদের একজন অন্তত আর্যভট-পূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন। তিনি হচ্ছেন কেরালার জ্যোতির্বিজ্ঞান ঐতিহ্যের জনক প্রথম বররুচি। এরূপ মনে করা হয় তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। এই সময় তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু দিন থেকে অনুমিত হয়। অনুমিত সময় হচ্ছে বর্ষাক্রমে 343 ও 378 খ্রীষ্টাব্দ। 248টি চক্র-বাক্যের রচয়িতা হিসাবে বররুচির পরিচয়। এই চক্র-বাক্যাংশটি “বররুচি বাক্য” নামে জনপ্রিয়। তাছাড়া ‘কটপয়সি’ পদ্ধতির প্রচারক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে।

॥ হরিদত্ত ॥

ব্রহ্মগুপ্তের পর ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে যদি আর কারো নাম করতে হয়, তাঁর নাম হরিদত্ত। তিনি সম্ভবত ৬৫০ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতি ‘পরহিত’ পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্ম। কেবলমাত্র ঐতিহ্য থেকে জানতে পারা যায় মালাবার উপকূলের তিরুনাবে অস্থগীত দ্বাদশ বর্ষীয় ‘মহামাঘ’ উৎসবের দিনে এই পদ্ধতির উদ্বোধন হয় এবং সেদিন ছিল কলিযুগের ৩৭৮৫ বর্ষ বা ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ‘শকাব্দ-সংস্কার’ বা ‘ভটসংস্কারের’ প্রবর্তক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। ‘গ্রহচার্ননিবন্ধন’ ও ‘মহামার্গনিবন্ধন’ নামে দুটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থটি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি,—প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টির নাম জানতে পারা যায়।

॥ শ্রীধরাচার্য ॥

আর্যভট্টীয় পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা হরিদত্ত ‘পরহিত’ পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্ম বিখ্যাত হলেও কতখানি মৌলিক গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে-বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। হরিদত্তের পর প্রকৃত মৌলিক গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শ্রীধর। তাঁর সময়কাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবকাশ আছে। ৭৫০ থেকে ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে ধরা হয়। ডঃ কে. এস. শুল্ক মনে করেন তিনি ৮৫০ থেকে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। ডঃ টি. এ. সরস্বতী আশ্বা মনে করেন তিনি মহাবীরের পূর্ববর্তী।

শ্রীধর বিখ্যাত ‘পাটীগণিত-সার’ গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে মোট তিনশ’ শ্লোক আছে। সে-জন্ম একে ‘ত্রিশতিকা’-ও বলা হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ও পরবর্তী-কালের গণিতজ্ঞরা যে-সব বিষয় পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তিনিও তাঁর ব্যতিক্রম নন। গুণনের ক্ষেত্রে ‘প্রত্যুৎপন্ন’ নামে একটি নতুন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর গ্রন্থে গুণনের ‘কপাট-সঙ্ঘ’ পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা আছে।

শ্রীধর একখানি বীজগণিত গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে-গ্রন্থটি বর্তমানে অবলুপ্ত। যদি এই গ্রন্থটির কোন দিন বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মত বা বকশালী পাণ্ডুলিপির মত হঠাৎ আবিষ্কার হয়, তাহলে ব্রহ্মগুপ্ত থেকে মহাবীর পর্যন্ত মধ্যবর্তী দু’শ বছরের গণিতের ইতিহাসের ধারা-বাহিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। ভাস্করাচার্যকে ধনুবাদ, তিনি স্থানে স্থানে শ্রীধরের

গাণিতিক প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন এবং নিজ মত দৃঢ় ও স্থাপিত করার জন্য দু'এক জায়গায় শ্রীধরের হারিয়ে যাওয়া বীজগণিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শ্রীধরের বীজগণিতের টুকরো টুকরো খবর ভাস্করের সোজাতেই পাওয়া যায়। দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ নির্ণয়ের পদ্ধতি আমরা অগ্রজ আলোচনা করব।

এখানে ত্রি-শতিকার একটি অঙ্ক উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো :

এক বারবনিতার সঙ্গে তার শ্রিয়তমের প্রেম-কলহে একটি মুক্তামালার এক-তৃতীয়াংশ মেঝেতে এবং এক-পঞ্চমাংশ শয্যায় পড়ে গেল। এক-ষষ্ঠাংশ বারবনিতাটি রক্ষা করল, কিন্তু এক-দশমাংশ তার শ্রিয়তমের কবলে গেল। যদি ৬টি মুক্তা তখনো মালার ঝুলতে থাকে, তা হলে কটি মুক্তা দিয়ে মালাটি নির্মিত হয়েছিল ?

মালার মুক্তার সংখ্যা x হলে, সর্তাহুয়ারী,—

$$x - \left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{5}x + \frac{1}{6}x + \frac{1}{10}x\right) = 6$$

$$\text{বা, } x - \frac{24x}{30} = 6$$

$$\text{বা, } x = 30$$

এই অঙ্কটি সমাজ-ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। ষট্ঠম-নবম শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে স্থাপিত সম্ভব্য বাণ্য পক্ষে গণিতের এই উদাহরণটি নিঃসন্দেহে প্রামাণিক। নাগর-জীবনের এমন বাস্তব চিত্র কি খুব বেশী লভ্য ?

শ্রীধর ট্রাপিজিয়ামের অর্থে 'চতুরঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য শব্দটি 'বর্গ' এবং 'সামান্তকোণ' বোঝাতেও তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি বর্গ ও আয়তের ক্ষেত্রফল দিয়েছেন ভূমি ও উচ্চতার গুণফল। অস্ত্র চতুর্ভুজের ক্ষেত্র ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} (\text{ভূমি} + \text{সম্মুখীন বাহু}) \times \text{উচ্চতা}$ । ট্রাপিজিয়ামের আর একটি নাম দিয়েছেন "কঙ্ক-বন্ধন-চতুর্বাহ"।

শ্রেণীর চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপনা শ্রীধরের অগ্রতম একটি বৈশিষ্ট্য। সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামের সাহায্যে সমান্তর শ্রেণীর উপস্থাপনা শ্রীধরের ত্রি-শতিকার 'জ্যেষ্ঠাক্ষেত্রে' আছে। ট্রাপিজিয়ামের উচ্চতা নির্ণয়ের পদ্ধতিটি শ্রীধরের নিজস্ব আবিষ্কার। কারণ, ভারতীয় কোন গণিতজ্ঞ আর এরূপ পদ্ধতির কথা বলেননি।

॥ গোবিন্দস্বামিন্ ॥

৪০০ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর যে খ্যাতনামা ভারতীয় গণিতজ্ঞ বর্তমান ছিলেন, তাঁর নাম গোবিন্দস্বামিন্। তিনি বিখ্যাত রাজজ্যোতিষী শঙ্করনারায়ণের গুরু ছিলেন। গোবিন্দস্বামিন্ গণিতে তেমন কোন অসাধারণ সাফল্য লাভ করেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রথম ভাস্করের প্ৰথম ভক্ত এবং আর্ধভট্টীয় পদ্ধতি প্রচারের অত্যন্ত সমর্থক। ‘মহাভাস্করীয়’ গ্রন্থের উপর তাঁর ‘ভাষ্য’ রচনার মধ্যে গণিতের অনেক নতুন তথ্য আছে বলে মনে করা হয়। ‘গোবিন্দকৃতি’ নামে তাঁর মৌলিক গ্রন্থ পরবর্তীকালের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদদের রচনা থেকে এ-কথা জানতে পারা যায়। কিন্তু আজও ওই গ্রন্থটি আবিস্কৃত হয়নি।

॥ শঙ্করনারায়ণ ॥

শঙ্করনারায়ণ ছিলেন গোবিন্দস্বামিনের শিষ্য। তিনি সম্ভবত ৪২৫ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন বোরাখৌর চের (Cera) বংশীয় রাজা রবিবর্মার রাজজ্যোতিষী। শঙ্করনারায়ণ কোল্লাপুরীর অধিবাসী ছিলেন। গণিতে তাঁর বিশেষ অবদান সম্পর্কে কিছু জানতে পারা যায় না। তিনি ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘লঘুভাস্করীয়’ গ্রন্থের উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁর সময় রাজকীয় অর্থাহীনতায় কেবলমাত্র একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বোধ করি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দশম অধ্যায়

“Mathematicians are like Frenchman ; whatever you say to them, they translate into their own language, and forthwith it is something entirely new.”

—Goethe.

॥ মহাবীরাচার্য ॥

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে মহাবীরের অস্তুত প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনিই সম্ভবত প্রথম গণিতজ্ঞ যিনি বিপুলগণিত ছাড়া অল্প কোন বিষয় তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। নবম শতাব্দী পর্যন্ত প্রধান অগ্রদূত সব গণিতজ্ঞই ছিলেন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। তাঁদের গ্রন্থের বেশীর ভাগ অংশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম মহাবীর।

জৈন ধর্মাবলম্বী মহাবীর জৈন ঐতিহ্য অনুসারে গণিতের চর্চা করেছেন। মাত্র অর্ধশতাব্দিক বৎসর পূর্বে তাঁর ‘গণিত-সার-সংগ্রহ’ আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও এই গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারত ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন গণিতজ্ঞ এই গ্রন্থের উল্লেখ করেননি। ‘গণিত-সার-সংগ্রহ’ এম. রত্নাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ ভারতে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ছিল। কানাড়ী ও তেলেগু ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য পাওয়া যায়।

মহাবীর নবম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তিনি রাজদরবারে সম্মানের আসন পেয়েছেন ; রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ (814—877) হস্ততো স্বনামধন্য এই গণিতজ্ঞের উজ্জ্বল প্রতিভার নিদর্শন পেয়ে আনন্দিত চিত্তে তাঁকে পুরস্কৃত করতেন। জানিনা, জৈন ধর্মাবলম্বী এই গণিতজ্ঞ পার্থিব কোন সম্মান ও পুরস্কার গ্রহণ করে গর্ববোধ করতেন কি না ! কিন্তু জৈন ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, গণিতের স্থায়ী বিমূর্ত বিষয়ের ধ্যানধারণায় সর্বদা যিনি মগ্ন থাকতেন, তিনি রাজ্য সম্মানের লোভ পোষণ করতেন না। হস্ততো রাজা অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ তাঁর

দরবারের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্তই এই গণিতাচার্যকে রাজসভায় উপস্থিত হবার অনুরোধ জানাতেন।

॥ গণিত-সার-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবীর 'গণিত-সার-সংগ্রহ' রচনা করেন। এই গ্রন্থটি মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্রীধর ছাড়া মহাবীরের মত আর কোন ভারতীয় গণিতজ্ঞ বিস্তৃত গণিত গ্রন্থ রচনা করেননি। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের মত তিনিও উপাস্ত দেবতার প্রার্থনা জানিয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন। কিন্তু এখানে মহাবীরের দেবতা কোন ব্রাহ্মণ্য দেবতা নন। তাঁর দেবতা জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্তের মত তাঁর গ্রন্থে অতি প্রাথমিক পাটীগণিতিক প্রক্রিয়া যোগ-বিয়োগের কোন আলোচনা নাই। এতে বর্গ, বর্গমূল, ঘন ও ঘনমূল নির্ণয়, সমাস্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়, একক-ভগ্নাংশ বিষয়ে বিতৃত আলোচনা, ত্রৈয়াশিক, বীজগণিতের দ্বিঘাত ও অনির্ণয় সমীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে। পাটীগণিতিক প্রক্রিয়ায় তিনি সর্বত্র দশগুণোত্তর স্থানিক-মান ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির নামকরণ করেছেন। কোন সংখ্যার চব্বিশটি অঙ্ক পর্যন্ত নামকরণের পরিচয় তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর্যভট প্রবর্তিত বর্গমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের ব্যবহারও তাঁর গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। মহাবীরের জৈন ও ব্রাহ্মণ্য উভয় প্রকার গণিতে ব্যুৎপত্তি ছিল। যে শ্রেণীর প্রথম কয়েকটি পদ নাই তার নাম দিয়েছেন 'ব্যুৎকলিত'। ভগ্নাংশিক প্রক্রিয়ায় ল. সা. গু-র ব্যবহার মহাবীরের প্রতিভার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি ল. সা. গু-র নাম দিয়েছেন 'নিরুঙ্ক'। পরিস্থিতিতে ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির জায় সমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, এমন কি কোন কোন বিষয়ে তিনি অগ্রণীর ভূমিকাও নিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে শূন্য (০) সম্পর্কিত সূত্র দেখতে পাওয়া যায় এবং ঋণাত্মক রাশির গুণন প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর শূন্য (০) দ্বারা ভাগের সিদ্ধান্তটি ত্রুটিপূর্ণ। তিনি বলেছেন কোন সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে।

॥ আচার্য মহাবীরের অবদান ॥

সত্য কথা বলতে কি, গণিতে মহাবীরের কোন মৌলিক অবদান নাই। তাঁর গাণিতিক প্রতিভার স্বজ্ঞানাত্মক দিকটির পরিচয় গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে

পাওয়া যায় না। কিন্তু এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের আবিষ্কৃত নানা সূত্র ও ফল নিজ প্রতিভার কষ্টিপাথরে ঘাটাই করে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সংস্কার করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ‘বিশেষ’ (particular) থেকে ‘সাধারণ’ (general)-এ পৌঁছেছেন। এখানেই মহাবীরের প্রধান কৃতিত্ব।

A. ॥ পাটীগণিত ॥

‘গণিত-সার-সংগ্রহ’ পাটীগণিত ও বীজগণিতের অঙ্কের আকর গ্রন্থ। নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক অঙ্ক এখানে আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত অঙ্কের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। মনে হয়, ‘গণিত-সার-সংগ্রহ’ একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের মত গ্রন্থটিতে আলোচনার একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হলো :

১. উদাহরণ : কোন আসলের 5, 7 ও 9 মাসে সুদাসল বথাক্রমে 50, 58 ও 60 হলে, সুদ নির্ণয় কর।

[এই অঙ্কটির সমাধানে $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$ অভেদের সাহায্য গ্রহণ করা যায়]

২. উদাহরণ : মোট 8520-কে বিভিন্ন অংশে প্রতি মাসে শতকরা 3, 5 ও 8 হারে খাটানো হলো। 5 মাস পরে আসলগুলি থেকে তাদের সুদ বাদ দিলে, আসলগুলি সমান হয়। আসল নির্ণয় কর।

• x , y ও z আসল হলে, প্রদত্ত মর্ত্যমুদারে,

$$x + y + z = 8520 \dots\dots (1)$$

এখন, x -এর 5 মাসের সুদ $\frac{3}{20}x$

$$y \text{ এর } " " " \frac{1}{4}y$$

$$z \text{ এর } " " " \frac{2}{5}z$$

$$\text{সুতরাং } x - \frac{3}{20}x - y - \frac{1}{4}y - z - \frac{2}{5}z$$

$$\text{বা } \frac{17}{20}x - \frac{3}{4}y - \frac{3}{5}z = k$$

(1) নং সমীকরণ থেকে k -এর মান পাওয়া যায় 2040

$$\left. \begin{aligned} \therefore x &= 2400 \\ y &= 2720 \\ z &= 3400 \end{aligned} \right\}$$

3. উদাহরণ : কোন্ সংখ্যাকে 7 দ্বারা ভাগ, 3 দ্বারা গুণ এবং বর্গ করার পর 5 যোগ করে $\frac{3}{5}$ দ্বারা ভাগ ও অর্ধ করে বর্গমূল নিলে 5 হয় ?

এ ধরনের অঙ্কের নিয়ম ‘আর্ষভট্টীয়’ গ্রন্থে দেওয়া আছে। খুব সম্ভব আর্ষভট্টের পূর্ব থেকে এ ধরনের অঙ্ক ভারতে প্রচলিত ছিল। আর্ষভট্টের সূত্রটি :

গুণকারা ভাগহরা ভাগহরান্তে ভবন্তি গুণকারাঃ ।

যঃ ক্ষেপঃ সোহপচয়োহপচয়ঃ ক্ষেপশ্চ বিপরীতে ॥

একই নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণনা ব্রহ্মগুপ্তের পর থেকে প্রায় সব ভারতীয় গণিতজ্ঞরা করে গেছেন। মহাবীর কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মটি অনুবাদ করে দেওয়া হলো।

নিয়ম : শেষ থেকে শুরু করে গুণ-স্থানে ভাগ, ভাগ-স্থানে গুণ, যোগ-স্থানে বিয়োগ, বিয়োগ-স্থানে যোগ, বর্গ-স্থানে বর্গমূল করে দ্রষ্টব্য সংখ্যা পাওয়া যায়।

অঙ্কটি প্রাথমিক স্তরের, তবুও কবে দেখানো হলো।

(1) $(5)^2 = 25$

(2) $25 \times 2 = 50$

(3) $50 \times \frac{3}{5} = 30$

(4) $30 - 5 = 25$

(5) $\sqrt{25} = 5$

(6) $5 \div 3 = \frac{5}{3}$

(7) $\frac{5}{3} \times 7 = \frac{35}{3} = 11\frac{2}{3}$

\therefore নির্ণেয় সংখ্যা $11\frac{2}{3}$

4. উদাহরণ : এক ব্যক্তি বাড়ীতে কিছু আম নিয়ে এলো। ছোট পুত্র

একটি আম নিয়ে অবশিষ্টের অর্ধেক নিল; অতঃপর কনিষ্ঠ পুত্রও তাই করল। অবশিষ্ট আম বাড়ীর অত্যাচারী নিলে ব্যক্তিটি কতগুলি আম নিয়ে এসেছিল?

এই অঙ্কটি অনির্ণয়ের সমীকরণের এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত। এ ধরনের অঙ্কের নির্দিষ্ট কোন উত্তর পাওয়া যায় না,—অসংখ্য উত্তর হতে পারে। ‘ y ’ আমের সংখ্যা এবং ‘ x ’ অত্যাচারী পেয়ে থাকলে অনির্ণয়ের সমীকরণটি হয়, $y=4x+3$

এখন, x এর ঐচ্ছিক মান ধরে y এর অসংখ্য মান পাওয়া যায়। যেমন, $x=1, 2, 3, \dots$ ধরলে $y=7, 11, 15, \dots$ হয়।

॥ মাল্য-গুণন (“Garland product”) ॥

নিম্নলিখিত গুণফলসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেগুলি যেন মালার মত সজ্জিত আছে। তাই এদের মাল্য-গুণন বা ‘Garland product’ বলা হয়। মজার কথা এই যে ডান দিক বা বাম দিক যে-দিক থেকেই পড়া যাক না কেন সংখ্যার অঙ্কগুলি অপরিবর্তিত থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত রবার্ট মে-এর ‘অঙ্ক পুস্তকং’-এ বেশ মজার এক ধরনের মাল্য-সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।

- (1) $139 \times 109 = 15151$
- (2) $12345679 \times 9 = 111, 111, 111$
- (3) $152207 \times 73 = 111, 11, 111$
- (4) $27994681 \times 441 = 12345654321$
- (5) $333333666667 \times 33 = 11000011000011$
- (6) $14287143 \times 7 = 100010001$
- (7) $142857143 \times 7 = 1000000001$
- (8) $11011011 \times 91 = 1002002001$

॥ একক ভগ্নাংশ ॥

এই লেখকের ‘গণিতের কথা ও কাহিনী’-তে মিশরীয় একক-ভগ্নাংশের সামান্য আলোচনা আছে। তাই সে-বিষয়ে এখানে আর আলোচনা করা হলো না। ভগ্নাংশের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে আছে, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার ‘গুপ্তন’ এবং ‘স্কেল’ থেকে প্রমাণিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর

পূর্বেও ভারতে ভগ্নাংশের প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে ‘অর্ধ’, ‘ত্ৰিপাদ’ প্রভৃতি শব্দ $\frac{1}{২}$, $\frac{৩}{২}$ সূচিত করে। প্রাচীন গুণসূত্রে পঞ্চদশ-ভাগ = $\frac{1}{15}$, সপ্ত-ভাগ = $\frac{1}{7}$ । আবার কখনো ‘ভাগ’-এর উল্লেখ না করেই ভগ্নাংশ বোঝানো হয়েছে। ত্রি-অষ্টম = $\frac{৩}{8}$, দ্বি-সপ্তম = $\frac{2}{7}$ প্রভৃতি। বর্তমানে ভগ্নাংশ রাশি পড়ার প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্য অঙ্গদারী।

একক-ভগ্নাংশ বিষয়ে মহাবীর যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তেমনটি অন্য কোন ভারতীয় গণিতজ্ঞ দেখাননি। একক-ভগ্নাংশের ভারতীয় নাম “রূপাংশক রাশি” অর্থাৎ যে রাশির লব একক।

১. ১-কে ‘n’-সংখ্যক একক ভগ্নাংশে পরিণত কর।

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^{n-2}} + \frac{1}{2 \cdot 3^{n-2}}$$

সূত্র ১—একক লব বিশিষ্ট বিভিন্ন রাশির সমষ্টি ১ হলে হরগুলিকে ১ থেকে শুরু করে ক্রমাগত ৩ দ্বারা গুণ করতে হবে যার প্রথম ও অন্ত্যহরকে যথাক্রমে ২ এবং $\frac{2}{3}$ দ্বারা গুণ করতে হবে।

মহাবীরের ভাষায় সূত্রটি নিম্নরূপ :

“রূপাংশকরাশীনাং রূপাত্তাত্রিগুণিতা হরা ক্রমশঃ।

দ্বিবিজ্যেৎশাভ্যন্তাবাদিমচরমৌ ফলে রূপে ॥”

১-কে ৫টি একক ভগ্নাংশে পরিণত করতে হলে প্রথম পদ = $\frac{1}{2}$, শেষ পদ = $\frac{1}{2 \cdot 3^{5-2}} = \frac{1}{2 \cdot 27} = \frac{1}{54}$ এবং মধ্যবর্তী রাশিগুলি হবে $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3^2}$ এবং $\frac{1}{3^3}$

$$\text{সুতরাং } 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{54}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{54}$$

২. যে-কোন ভগ্নাংশকে একক ভগ্নাংশে পরিণত কর।

$\frac{p}{q}$ প্রদত্ত ভগ্নাংশ ($p < q$) হলে, t এমন একটি ঐচ্ছিক রাশি যে $\frac{q+t}{p}$ একটি

অখণ্ড রাশি এবং তা p -এর সমান হলে,

$\frac{p}{q} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r.q}$ । পুনরায় $\frac{1}{r.q}$ রাশিতে পূর্বোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরবর্তী পদ পাওয়া যাবে। এভাবে পদ্ধতিটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা সমগ্র একক ভগ্নাংশ নির্ণয় করা যায়।

সূত্র : প্রদত্ত ভগ্নাংশের হর কোন ঐচ্ছিক রাশির সঙ্গে যুক্ত করে লব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হলে একক ভগ্নাংশের প্রথম পদ পাওয়া যায়। ঐচ্ছিক রাশিকে পূর্বের ভাগফল ও হরের গুণফল দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ভগ্নাংশ পূর্বোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরবর্তী একক-ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। সমগ্র একক-ভগ্নাংশটি না পাওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

উদাহরণ : $\frac{7}{8}$ -কে একক ভগ্নাংশে পরিণত কর।

$$\text{পূর্বোক্ত নিয়মে প্রথম পদ} = \frac{8+6}{7} - 2 \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\text{দ্বিতীয় পদ} = \frac{8+1}{3} - 3 \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$\text{তৃতীয় পদ} = \frac{1}{3.8} - \frac{1}{24}$$

$$\text{সুতরাং } \frac{7}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{24}$$

একক ভগ্নাংশ সম্পর্কিত আরো কয়েকটি সূত্র গণিত-নার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। ১-কে অব্যুৎ সংখ্যক একক ভগ্নাংশে প্রকাশ, প্রদত্ত একক ভগ্নাংশকে n -সংখ্যক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার লবগুলি হবে $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, কোন একক ভগ্নাংশকে দুটি একক ভগ্নাংশের সমষ্টিরূপে প্রকাশ প্রভৃতি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহাবীরই প্রথম ভারতীয় গণিতজ্ঞ যিনি ল. সা. গু. বা নিরুদ্ধ-এর সাহায্যে ভগ্নাংশ-প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির কথা বলেছেন। নিকটের সংজ্ঞা : “The product of the common factors of denominators and their resulting quotients is called Niruddha.”

॥ কয়েকটি সূত্র ॥

মহাবীর চতুস্তলকের আয়তন নির্ণয়ের দুটি সূত্র দিয়েছেন। একটি স্থূল ও অপরটি স্থন্ম। সূত্রটি উদ্ধৃত করা হলো :

ভূজকৃতিদলঘনগুণদশপদমবহুং ব্যাবহারিকং গণিতম্ ।

ত্রিগুণং দশপদভুজং শৃঙ্গটিকহৃদঘনগণিতম্ ॥

অর্থাৎ প্রান্তিকীর বর্গের অর্ধ করার পর ঘন করে দশ দ্বারা গুণ করে বর্গমূল করে নয় দ্বারা ভাগ করলে স্থূল আয়তন পাওয়া যাবে। আর একে তিন দ্বারা গুণ ও দশের বর্গমূল দ্বারা ভাগ করলে স্থূন আয়তন পাওয়া যাবে।

$$\text{স্থূত্রাং স্থূল আয়তন} = \frac{\sqrt{\left(\frac{a^2}{2}\right)^2 \cdot 10}}{9} = \frac{\sqrt{10 \cdot a^2}}{18\sqrt{2}}$$

$$\text{স্থূন আয়তন} = \frac{\sqrt{10 \cdot a^2}}{18\sqrt{2}} \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{a^2}{6\sqrt{2}}$$

[এখানে a —চতুস্তলকের প্রান্তিকী]

চতুস্তলকের আয় গোলকের আয়তন নির্ণয়েরও দুটি স্থত্র গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যাসার্ধঘনার্ধগুণা দ্বব গোল ব্যাবহারিকং ফলম্ ।

ভদ্রদশমাংশং নবগুণমশেষসূত্রং ফলং ভবতি ॥

অর্থাৎ ব্যাসার্ধের ঘন-র অর্ধেককে নয় দ্বারা গুণ করলে স্থূল আয়তন পাওয়া যায় এবং একে নয়-দশমাংশ দ্বারা গুণ করলে স্থূন আয়তন পাওয়া যায়।

$$\text{স্থূল আয়তন} = r^3 \cdot \frac{9}{2} = \frac{3}{2} \pi r^3 \text{ [যেহেতু } \pi = 3 \text{ মহাবীরের মতে]}$$

$$\text{স্থূন আয়তন} = r^3 \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{9}{10} = \frac{81r^3}{20}$$

$$\text{মহাবীর } \pi = \sqrt{10} \text{ স্থূন মনে করেন বলে, স্থূন আয়তন} = 1 \cdot 3 \pi r^3$$

মহাবীর কর্তৃক নির্ণীত গোলকের আয়তন বর্তমানে প্রচলিত আয়তন $\frac{4}{3} \pi r^3$ —এর প্রায় কাছাকাছি।

ইতিমধ্যে সমবায় ও বিন্যাসের প্রাচীনত্বের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। নিঃসন্দেহে জৈন গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন,—“যেক্স-প্রস্তর” তাঁদের রচনা। কিন্তু সমবায়ের সাধারণ সূত্রটির জন্ত আমরা মহাবীরের নিকট ঋণী। সে-कारणे বিশ্বগণিতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অবশ্যই নির্দিষ্ট হবে। সমবায়ের সাধারণ সূত্র :

$$nC_r = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots r}$$

॥ জ্যামিতি ॥

জ্যামিতিতে মহাবীরের উল্লেখযোগ্য অবদান তেমন কিছু নাই বললেই চলে। পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের পথ অনুসরণ ছাড়া মহাবীর আর কিছু করেননি। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম উপবৃত্ত প্রসঙ্গের উত্থাপন। ব্রহ্মগুপ্তের মত তিনিও বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন। এবং তিনিও চতুর্ভুজটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত কিনা উল্লেখ করেননি। মহাবীর পাঁচ প্রকার চতুর্ভুজের উল্লেখ করেছেন :

1. 'সম'—চারটি বাহুই সমান অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র ও বর্ষস।
2. 'দ্বি-দ্বিসম'—বিপরীত বাহুযুগল সমান অর্থাৎ আয়তক্ষেত্র ও সামান্তরিক।
3. 'দ্বিসম'—দুটি বাহু সমান অর্থাৎ সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম।
4. 'ত্রিসম'—তিনটি বাহু সমান অর্থাৎ তিন বাহু সমান বিশিষ্ট ট্রাপিজিয়াম।
5. 'বিষম'—বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ।

মহাবীর ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন,—

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)s}$$

[s —অর্ধপরিসীমা]

এবং $A = \frac{1}{2} (\text{ভূমি} + \text{সম্মুখীন বাহু}) \times \text{উচ্চতা}$ ।

বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$

একপ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \text{ফলক প্রতিস্থগার্ধম} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$

[d_1, d_2 —কর্ণ]

মহাবীর কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের পরিব্যাসের সূত্রটি ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা স্পষ্ট।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রে মহাবীরের বিস্তৃত আলোচনা আছে। তিনি ত্রিভুজকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন,

- (1) 'সম'—সমবাহু ত্রিভুজ।
- (2) 'দ্বিসম'—সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।
- (3) 'বিষম' (scalene)—বিষমবাহু ত্রিভুজ।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের হ'রকম সূত্রই গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়।

$$(1) A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$(2) A = \frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$$

সমবাহু ত্রিভুজের স্থল ক্ষেত্রফল $-\frac{a}{2} \cdot a - \frac{a^2}{2}$


এবং স্থল ক্ষেত্রফল $-\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

সমবাহু ত্রিভুজের ভূমি ও বাহু নির্ণয়ের স্থত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, এর উচ্চতা ভূমিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। তাঁর পরিব্যাসের স্থত্রটি,

$$r = \frac{\text{বাহুগুলির গুণফল}}{2 \times \text{উচ্চতা}}$$

মহাবীর সর্বপ্রথম ত্রিভুজে অন্তর্নিখিত বৃত্তের এবং ব্যাসের কথা বলেন। কিন্তু অন্তঃক্ষেত্রটি ত্রিভুজের কোণগুলির সমদ্বিখণ্ডের উপর অবস্থিত হবে কিনা, এ-বিষয়ে কিছু জানতে পারা যায় না।

তিন বা ততোধিক সমবৃত্ত পরস্পর স্পর্শ করে যে স্থান সীমাবদ্ধ করে, তাঁর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের স্থত্র গণিত-সার-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য নারায়ণ পণ্ডিতও অল্পরূপে স্থত্র দিয়েছেন।




চিত্র—21

d যদি বৃত্তের ব্যাস হয়,

তা হলে চারটি সমবৃত্ত কর্তৃক সীমাবদ্ধ স্থানের ক্ষেত্রফল $-d^2 - \frac{\pi d^2}{4}$

আবার, তিনটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল অঙ্কুরূপ সীমাবদ্ধ স্থানের ক্ষেত্রফল—ব্যান-বাহ
 ' বিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4} \times (\text{যে কোনো বৃত্তের ক্ষেত্রফল})$



চিত্র—২২

ভারতীয় গণিতে মহাবীর সর্বপ্রথম উপবৃত্তের পরিধি ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রয়াস পান। অবশ্য ভ্রামিতির এই বিশেষ দিকটিতে গ্রীক গণিতজ্ঞরা বহুদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে অ্যাপোলোনিয়াসের নাম সর্বাগ্রগণ্য। সেই তুলনায় মহাবীর যে খুব কৃতিত্বপূর্ণ কিছু করেছিলেন তা বোধ হয় না। তবে ভারতীয় গণিতে যে এ-বিষয়ে তাঁর স্থান সর্বপ্রথম, সন্দেহ নাই। যাই হোক, তিনি উপবৃত্তকে 'আয়তবৃত্ত' বলে আখ্যাত করেন। a ও b উপবৃত্তের প্রধান অক্ষ ও উপাক্ষ হলে অর্থাৎ 'আয়্যাম' ও 'ব্যান' হলে,

$$\text{পরিধি} = 2 \left(a + \frac{b}{2} \right)$$

$$\text{এবং ক্ষেত্রফল} = \text{পরিধি} \times \frac{b}{4} = \frac{1}{4} b \cdot 2 \left(a + \frac{b}{2} \right) = \frac{1}{2} b \left(a + \frac{b}{2} \right)$$

কিন্তু তাঁর এই সূত্র দুটি শুদ্ধ নয়। এ-বিষয়ে গ্রীক গণিতজ্ঞ অ্যাপোলোনিয়াসের তুলনা মেলা ভার। অধ্যাপক এম. রঙ্গাচার্য a ও b -কে অর্ধ-অক্ষ (Semi-axes) ধরে পরিধি সম্পর্কিত সূত্রটি সংশোধন করেছেন।

$$\text{পরিধি} = \sqrt{24b^2 + 16a^3},$$

আবার, e যদি উৎকেন্দ্র হয়, তাহলে $b^2 = a^2(1 - e^2)$ বসিয়ে এবং $\sqrt{10} = \pi$ লিখে সূত্রটির আর একটি রূপ পাওয়া যায়,—

$$\text{পরিধি} = 2\pi a \left(1 - \frac{3}{5}e^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

একথা সত্য, ভারতীয় গণিতের তিন মহাবীরা আর্ঘ্যভট-ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্কর্যের প্রতিভার সঙ্গে মহাবীরের তুলনা চলে না। কিন্তু তিনি ছিলেন নবম-দশম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ এবং দু-একটি ক্ষেত্রে নতুন পথের প্রবর্তক।

॥ সংযোজন ॥

খ্রীষ্টীয় যুগে যে-সব জৈন ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়েছে, তাতে গণিত বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়। বেশীর ভাগ গ্রন্থই মহাবীরের কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছে। ‘ধবলা-টীকা’-র রচয়িতা বীরসেন রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা জগদ্বল্লভদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বীরসেন মহাবীরের কিছু পূর্ববর্তী। ধবলা টীকায় গণিত বিষয়ে নানা আলোচনা দেখা যায়। গ্রন্থটি অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত বলে অনুমান করা হয়। ‘ত্রিলোক-প্রজ্ঞপ্তি’ নামে আর একটি গ্রন্থ অন্তত দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে ধরা হয়। এই গ্রন্থের প্রথম চারটি ‘মহাবীকার’-এ অনেক গাণিতিক সূত্র দেখতে পাওয়া যায়,—জ্যামিতির বৃত্ত, ট্রাণিজিয়াম ও চোঙ সম্পর্কিত এবং বীজগণিতে ত্রৈণী সম্পর্কিত। নেমিচন্দ্রের ‘ত্রিলোকসার’ ও ‘পোন্নতসার’ গ্রন্থ দুটিতেও প্রাচীন জৈন গণিতের নানান পরিচয় রয়েছে।

বীরসেন π -এর মান নিম্নরূপ দিয়েছেন :

ব্যাসং ষোড়শগুণিতং ষোড়শসহিতং ত্রিংশকুপৈর্ভুক্তম্ ।

ব্যাসং ত্রিগুণিতং সূক্ষ্মাদপি তদন্তবেৎ সূক্ষম্ ॥

গণিতের ভাষায়,

$$\pi = \frac{16d+16}{113} + 3d, \quad d = \text{ব্যাস}।$$

ডঃ টি.এ. সরস্বতী 16-এর উপস্থিতি অসৌক্যিক বলেছেন। তিনি বলেন

$$16 \text{ না থাকলে } \pi = \frac{355}{113}$$

॥ দ্বিতীয় আর্ষভট ॥

আর্ষভট সমস্ত আলোচনার সময় আমরা এই আর্ষভটের উল্লেখ করেছি। ইনি সেই আর্ষভট যিনি “বৃদ্ধ আর্ষভট”-এর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংস্কার করার অভিপ্রায়ে “মহাসিদ্ধান্ত” রচনা করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি; নতুন কিছু তিনি করতে পারেন নি। কেবল গতানুগতিক ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন মাত্র।

তাঁর ‘মহা-সিদ্ধান্ত’ বা ‘আর্ষসিদ্ধান্ত’ বা ‘আর্ষভটসিদ্ধান্ত’ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মধ্যগতি এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অতি প্রিয় বিষয় অনির্ণয় সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এমন কি দ্বিতীয় আর্ষভট এই সমীকরণের সংস্কার করে সমাধানের একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন। সে কারণে তাঁর কুটকাধার সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। তাঁর অন্নগতি সংক্রান্ত চিন্তার উল্লেখ গ্রন্থের শুরুতে বৃদ্ধি করেছে। আর্ষভটের দ্বারা তিনিও বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের এক কৌশল উদ্ভাবন করেন। অবশ্য দুই আর্ষভটের এই পদ্ধতির মধ্যে বড়ই পার্থক্য আছে।

তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত গাণিতিক বিষয়গুলিই আলোচিত হয়েছে। পাটীগাণিতিক প্রক্রিয়া,—প্রাথমিক চার নিয়ম, শূন্যের ব্যবহার, বর্গমূল ও ঘনমূল, ভগ্নাংশ, ত্রৈয়াশিক ও দ্বিঘাত সমীকরণ প্রভৃতির আলোচনা দেখা যায়।

তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের এবং শ্রীধরের ট্রাণিজিয়ামের উচ্চতা নির্ণয় বিষয়ক সূত্রের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমালোচনা যথার্থ না হলেও এতে কাকতালীর মতো ফল ফলেছিল। একটি কর্ণ প্রদত্ত হলে সামান্তরিক ও বহুসের দ্বিতীয় কর্ণ নির্ণয়ের সূত্র তিনি দিয়েছেন,—

সমচতুরজের্হসমে বাডীষ্ট্রবণ বর্গোমাৎ ।

সর্বদুজবর্গযোগমূলং কর্ণো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ ॥


অর্থাৎ বাহুগুলির বর্গের সমষ্টি থেকে কর্ণের বর্গ বিয়োগ করে বর্গমূল করলে বহুস ও সামান্তরিকের দ্বিতীয় কর্ণ পাওয়া যাবে।

ABCD সামান্তরিকের (চিত্র-23) CE এবং DF উচ্চতা, এবং AC ও BD দুটি কর্ণ।

$$\text{এখন, } AC^2 = AE^2 + CE^2 = (AB + BE)^2 + BC^2 - BE^2$$

$$BD^2 = BF^2 + DF^2 = (AB - BE)^2 + BC^2 - BE^2$$

$$\begin{aligned}\therefore AC^2 + BD^2 &= (AB + BE)^2 + (AB - BE)^2 + 2BC^2 - 2BE^2 \\ &= 2AB^2 + 2BE^2 + 2BC^2 - 2BE^2 \\ &= 2AB^2 + 2BC^2\end{aligned}$$



চিত্র—২৩

$$\therefore AC^2 = 2AB^2 + 2BC^2 - BD^2$$

বা $AC = \sqrt{2AB^2 + 2BC^2 - BD^2}$, যখন $BD =$ প্রথম কর্ণ।

$$\text{আবার, } BD^2 = 2AB^2 + 2BC^2 - AC^2$$

বা, $BD = \sqrt{2AB^2 + 2BC^2 - AC^2}$, যখন $AC =$ অপর কর্ণ।

দ্বিতীয় অর্ধভট রহস্যের ক্ষেত্রফল দিয়েছেন—

প্রতিঘাতঃ সমচতুরক্ষেত্রঃ অর্ধিতঃ ফলং স্যাৎ।

d_1 এবং d_2 কর্ণ হলে,

$$A = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2$$

এখানে, রহস্যের কর্ণদ্বয় যে পরস্পর সমকোণে ছেদ করে তার প্রমাণ রয়েছে।

॥ ত্রীপতি ॥

ত্রীপতি দ্বিতীয় অর্ধভটের পরবর্তী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। সম্ভবত তিনি দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম নাগদেব এবং পিতামহের নাম ভট্টকেশব। তিনি সম্ভবত কাশ্মীরের অধিবাসী এবং অলবিহুনীর ভারতভ্রমণের সময় জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়।

তঁার রচিত মোট চারখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তিনখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক ও একখানি গণিত সম্পর্কিত। “বীকোটিকরণ” গ্রন্থটি প্রথম আর্থভটের-আর্থভটীয় অবলম্বনে রচিত এবং লম্বের নির্দেশ অল্পসারে সংশোধিত। এটির রচনাকাল 1039 খ্রিষ্টাব্দ। ‘ক্রবমানস’ গ্রন্থটি মৃৎকালের ‘লঘুমানস’ অবলম্বনে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটির প্রণয়নকাল 1056 খ্রিষ্টাব্দ। গণিতভিলকের বিষয়বস্তু গণিত। শ্রীপতির ‘সিদ্ধান্তশেখর’ গ্রন্থটি 1039 খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত।” (প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান)। জয়োদশ শতাব্দীতে সিংহভিলক সুরী ‘গণিত ভিলক’-এর একটি ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীপতি গণিত-ভিলকে বীজগণিত ও জ্যামিতি অন্তর্ভুক্ত করেননি।

দ্বিতীয় আর্থভট ও শ্রীপতি কোন্ সূর্তে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ অঙ্কন সম্ভব সে-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শ্রীপতি তঁার সিদ্ধান্তশেখরে এই সূর্তের সরাসরি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি ত্রিভুজের উল্লেখ করেননি।

চতুর্ভুজারামখিলন্ত বা স্তাদবক্রবাহোরথিকা (৭) ভূজাচ্চেৎ।

উন্মন্সমো বেতরবাহবোণো জেরং তদকেত্বদারবীভিঃ ॥

—চতুর্ভুজের সরল বাহুগুলির সমষ্টি বৃহত্তমটির চেয়ে ছোট বা সমান হলে, জানীরা জানেন যে এটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র নয়।

সিদ্ধান্তশেখর গ্রন্থে ‘ভূজ’ প্রদত্ত হলে কিভাবে মূলদ সমকোণী ত্রিভুজের ‘কোটি’ ও ‘অতিভূজ’ নির্ণয় করতে হবে তার সূত্রও দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে বৃন্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের আলোচনাও আছে।

শ্রীপতির পর আর কোন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় গণিতজ্ঞের নাম পাওয়া যায় না। তবে দক্ষিণ ভারতের কেবলা রাজ্যে ভাস্করের পূর্ববর্তী কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু গণিতে বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁদের উল্লেখযোগ্য বিশেষ অবদান নাই। তবুও নিঃসন্দেহে এটুকু বলা যায় ওই সময় দক্ষিণ ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত ছিল এবং তার সঙ্গে গণিতের চর্চাও হতো।

একাদশ অধ্যায়

"Gentleman", he said, 'that is surely true, it is absolutely paradoxical ; we cannot understand it, and we don't know what it means, but we have proved it, and therefore, we know it must be the truth."

—Kasner and Newman.

॥ ভাস্করাচার্য ॥

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে 'জয়ী'-র অস্বতন্ত্র ভাস্কর বা দ্বিতীয় ভাস্কর। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বেদবিদ ও দৈবজ্ঞ। দক্ষিণ ভারতের সহ্য পর্বতের পাদদেশে বিজ্জড়বিড় অর্থাৎ বিজাপুর নামক স্থানে 1114 খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ভাস্কর পিতার নিকট বিজ্ঞাপিকা লাভ করেন। বেদজ্ঞ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে হনিপূর্ণ পিতার নিকট পাঠ গ্রহণ করে ক্রমে ভাস্কর জ্ঞানের নানান বিভাগে কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু 'লীলাবতী' সম্পর্কে একটি উপকথা ছাড়া তাঁর ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

ভাস্করের অস্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'। আর্কডটর-এর গ্রায় এটি কোন গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত,—লীলাবতী, বীজ-পণিত, গ্রহণপণিত ও গোলাধ্যায়। লীলাবতী অংশে পাটীগণিতিক আলোচনা, বীজগণিতে কূটক, বর্গ-প্রকৃতি প্রভৃতির আলোচনা আছে। অস্বতন্ত্র অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা আছে। গোলাধ্যায়ের একটি অংশে নিঃসর্গ প্রকৃতির বর্ণনা আছে এবং সেখানে ভাস্কর নিজেকে 'সুখবি' বলে আখ্যাত করেছেন। এই প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে গতানুগতিক সংস্কৃত-কাব্য-রীতির অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়; মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় মহাকবি কালিদাসের কাব্যোৎকর্ষ স্বরণ করিয়ে দেয়।

মবিনয়ে ভাস্কর জানিয়েছেন 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' রচনার তাঁর বিশেষ মৌলিকতা নাই। পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের গ্রন্থ থেকে এ-গ্রন্থের উপাদান

সংগৃহীত হয়েছে এবং তাঁর ভূমিকা কেবলমাত্র সঞ্চলকের। আচার্য ভাস্করের উল্লেখ থেকেই আমরা শ্রীধর ও পদ্মনাভের বীজগণিত বিষয়ে অবগত হই। তা না হলে বীজগাণিতিক হিসাবে রাঢ়ের শ্রীধরের নামটুকুও জানতে পারতাম না, আর পদ্মনাভ তো অবলুপ্ত হয়ে গেছেন! তাঁর পরিচয়টুকু আজ ভাস্করের কৃপায় আমরা পেয়েছি, কিন্তু শ্রীধরের বীজগণিত ও পদ্মনাভের গ্রন্থ অবলুপ্ত হওয়ায় ভাস্কর এঁদের কাছে কতটুকু ঋণী তার মূল্যায়ন আজ সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী গণিতাচার্যদের ভাস্কর সর্বিনয়ে শ্রদ্ধা আনিয়েছেন। কিন্তু কেন যে নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ মহাবীরের নাম উল্লেখ করেননি, সে বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। গণিত-সার-সংগ্রহের অনেক অঙ্ক ভাস্কর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সত্যসত্যই অঙ্কগুলি মহাবীরের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত কিনা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ, আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, প্রাচীনকাল থেকে বহু অঙ্ক প্রায় অবিকল চলে আসছে। হয়তো ভাস্কর এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকবেন। তা হলেও যিনি ব্রহ্মসুপ্ত, শ্রীধর ও পদ্মনাভের গণিত বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন, তিনি কিভাবে মাত্র আড়াইশ' বছর পূর্ববর্তী মহাবীর বিষয়ে কিছু জানতেন না—এটি বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা। অথচ উভয়েই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। তবে কি মধ্যযুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকৃত অবস্থাটি তাঁর মনঃপুত ছিল না? কিন্তু গোলাধ্যায়ের একস্থানে জৈন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ লঙ্কের যুক্তি যে-ভাবে খণ্ডন করেছেন, তাতে জৈন গণিত বিষয়ে তাঁর ধারণা উচ্চ ছিল বলেই মনে হয়।

বিনয়বশত ভাস্কর 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি'-কে সঞ্চলন গ্রন্থ বললেও ওই গ্রন্থের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি যেভাবে সহজ ও সুন্দর ভাষায় জটিল গাণিতিক সূত্র ও তথ্য সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তথ্যসমূহ এমন সুপরিষ্কৃতভাবে বিস্তার করেছেন, তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। তা ছাড়া গণিতে তিনি অনেক নতুন অধ্যায়ের সূচনাও করেছেন এবং পূর্ববর্তী অনেক সূত্র ও পদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কার করে গণিতে সাধারণীকরণের গুরুত্ব এনেছেন। সত্যই ভাস্কর আপন প্রতিভার ভাস্কর।

॥ লীলাবতী-উপকাহিনী ॥

সিদ্ধান্ত-শিরোমণির লীলাবতী অধ্যায়ের নামকরণ বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে ওই-কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক পটভূমি আছে কি না

তার প্রামাণিক উৎস আমাদের জানা নাই। একরূপ প্রচলিত আছে লীলাবতী ভাস্করের কন্যার নাম। ভাগ্যবিড়ম্বিত স্নেহের কন্যার নাম গ্রন্থটির সঙ্গে জড়িত করে ভাস্কর সামান্ত সাধনা পেয়ে থাকলে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নাই। কাহিনীটি বিবৃত করা হলো :

ভাস্কর ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ, আবার শ্রেষ্ঠ দৈবজ্ঞও। কন্যার ঠিকুজি গণনা করে তিনি জানতে পারলেন তার বিবাহিত-জীবন অতি স্বল্প। কিন্তু উপায় কি? তবে কি কন্যার বিবাহ দেবেন না? অসম্ভব। সমাজে অনুচ্চ কন্যা রাখা বিধি নয়,—সামাজিকতায় কলঙ্ক-স্বরূপ। এই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি জ্যোতিষের সূক্ষ্ম গণনার মনোনিবেশ করলেন। একটি পথ তিনি খুঁজে পেলেন। যদি কন্যার বিবাহ একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট মুহূর্তে দেওয়া যায়, তা হলে এই ঘোর দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ক্রমে কন্যা বয়স্কা হয়ে উঠল, এবং যথারীতি তিনি তার বিবাহের আয়োজন করলেন। সঠিক ও যথার্থ মুহূর্তটি জানবার জন্য তিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। নিউটনের সূর্য-ঘড়ি ও জল-ঘড়ির মত এটি একটি বালুকা-ঘড়ি। একটি পাত্রে বালুকা রেখে তার নীচে ছিদ্র দিয়ে বালুকা পড়তে দেওয়া হলো। অন্য একটি পাত্রে বালুকা-ঘড়ি থেকে বালি জমা হতে থাকল।

শব্দ আয়োজন সম্পূর্ণ,—ভাস্কর কর্তৃক বিধির বিধান পাণ্টে দেওয়ার মত আয়োজন সম্পূর্ণ। কিন্তু তা কি সম্ভব?

Man proposes, God disposes—বিধির বিধান থগুনের কোন উপায় মানুষ্যের হাতে নাই। লীলাবতীর ক্ষেত্রেও সে-নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হলো না। যবনিকার অন্তরালে বিধাতার মুচকি হাসি কি ভাস্কর লক্ষ্য করেছিলেন?

বিবাহের পূর্ব দিন। অসামান্য পিতার নির্মিত এই কাল নির্ধারণের বালুকা-ঘড়ি দেখার জন্য লীলাবতী কোতূহলী হলো। হায়! বালিকা লীলাবতী, কেন তোমার এমন কোতূহল হলো? সালঙ্কারা লীলাবতী বুকে পড়ল কেমন করে বালুকা-কণা ধীরে ধীরে ছিদ্রপথে বহির্গত হচ্ছে। কালপুরুষ এই স্বেচ্ছা নিলেন। লীলাবতীর অজ্ঞাতে খসে পড়ল ক্ষুদ্র একটি মুক্তাখণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির বালুকা-কণায় হারিয়ে গেল। ঘড়ি আর সূক্ষ্ম সময় নির্দেশ করল না। বিবাহ অন্তত মুহূর্তেই অচ্যুত হলো সবার অজ্ঞাতে। আর বিধাতাও তাঁর কার্যটি সিদ্ধি করলেন।

লীলাবতী বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলো। ভাস্করের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হয়তো সাময়িকভাবে নিজ প্রতিভা ও গণনার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রতিভাবান পুরুষেরা বিপদে কাতর হলেও আত্মহারা হন না। অহুমান করা ব্যয় অহুস্কানে যখন সব ব্যাপার জানলেন, তখন হয়তো কপালে করাঘাত করে বলে উঠেছিলেন,—“বিধির বিধান!”

লীলাবতী নাটকের পরবর্তী দৃশ্য সম্ভবত এরকম ছিল : গণিতাচার্য ভাস্কর কতৃকে সম্মেহে নিজের কাছে রেখে পাঠদান করেছিলেন। লীলাবতীও গণিতে যথেষ্ট পারদর্শিনী হয়ে পিতার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

এ-কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। বরং আভ্যন্তরীণ টুকরো টুকরো তথ্য থেকে মনে হয় লীলাবতী একটি কাল্পনিক নাম। এমন কি এ-নামের গ্রন্থও অপ্রতুল নয়। মেমিচন্দ্র তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন ‘লীলাবতী’।

॥ লীলাবতীর বিষয়বস্তু ॥

পাটীগণিত এ-অংশের আলোচ্য বিষয় হলেও ভারতীয় রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী জ্যামিতি,—বিশেষত সমকোণী ত্রিভুজ সংক্রান্ত সমস্যা ও কিছু কিছু পরিমিতি এখানে আলোচিত হয়েছে। পাটীগণিতের ছাত্রেরা যাতে বীজগাণিতিক সমীকরণের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে সেহেতু এখানে কুট্টকের অবতারণা করা হয়েছে, তবে সংক্ষিপ্তাকারে। একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের আলোচনাও এই অধ্যায়ে দেখা যায়।

ভাস্কর স্বয়ং লীলাবতীর কোন বিভাগ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালের ভাস্করাবগণ লীলাবতীর বিষয়বস্তুকে তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলি (1) পরিভাষা ; (2) সঙ্কলিত-ব্যবকলিত, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল শূন্য-পরিচর্য ; (3) ব্যাস্তবিধি, ত্রৈরাসিক ; (4) মিজ-ব্যবহার ; (5) জেটী-ব্যবহার ; (6) ক্ষেত্র-ব্যবহার ; (7) খাত-ব্যবহার ; (8) চিতি ; (9) জট-ব্যবহার ; (10) রাশি-ব্যবহার ; (11) ছায়া-ব্যবহার ; (12) কুট্টক, ও (13) অঙ্কশাশ-ব্যবহার।

॥ বীজগণিতের বিভাগ ॥

বীজগণিত অংশ এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি,—(1) ঘন-বিবরণ, (2) শূন্য-বিবরণ, (3) বর্গ-বিবরণ, (4) করণী-বিবরণ, (5) কুট্টক-বিবরণ,

(৬) বর্ণ-বিবরণ (৭) একবর্ণ-বিবরণ, (৮) মধ্যমাহরণ, (৯) অনেকবর্ণ-সমীকরণ, (১০) অনেকবর্ণ-মধ্যমাহরণ ও (১১) ভাবিতা ।

॥ সমবাস্ত ও বিস্তাস ॥

জৈন গণিতে সমবাস্ত ও বিস্তাস ‘বিকল্প’ নামে পরিচিত । মহাবীর সমবাস্তের সাধারণ সূত্র দিয়েছেন । ভাস্কর নীলাবতীর ‘অঙ্কশাস-ব্যবহার’ অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন । ভাস্করের কৃতিত্ব এই যে, তিনি বিষয়টির স্থূলষ্ট ধারণা দিয়েছেন এবং সাধারণ সূত্র প্রদান করেছেন ।

ভাস্কর সর্বপ্রথম r -সংখ্যক বস্তুর মধ্যে k, l , প্রভৃতি ভিন্ন প্রকার বস্তু হলে তাদের বিস্তাস নির্ণয়ের সূত্র দিয়েছেন— $\frac{r!}{k!l!....}$

উদাহরণ : ৫টি অঙ্ক দ্বারা গঠিত কোন সংখ্যার অঙ্ক-সমষ্টি ১৩, শূন্যকে সংখ্যা হিসাবে না ধরলে কতগুলি সম্ভাব্য সংখ্যা গঠন করা যায় ?

এই অঙ্কটি সমাধানের একটি সাধারণ সূত্র ভাস্কর দিয়েছেন । কিন্তু কোন প্রমাণ দেননি ।

যদি কোন সংখ্যার অঙ্ক-সংখ্যা n, s সমষ্টি এবং $9+n>s$ হলে মোট অঙ্ক-সংখ্যার সূত্রটি $s-1 C_{n-1}$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং } s-1 C_{n-1} &= \frac{(s-1)(s-2)...(s-n+1)}{(n-1)!} \\ &= \frac{(s-1)!}{(s-n)! (n-1)!} \end{aligned}$$

এই সূত্রে উপরের অঙ্ক থেকে n ও s -এর মান বসালে উত্তরটি ৪৭৫ হয় ।

॥ ভাস্করীয় গণিতে শূন্য—০ ॥

গণিতে শূন্যের উৎপত্তি, তাৎপর্য ও ব্যবহার সম্পর্কে আমরা পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করব । এখানে শূন্যের তাৎপর্য ও ব্যবহার বিষয়ে ভাস্করের ধারণার নক্সে পরিচিত হওয়া যাক ।

ব্রহ্মগুপ্ত যোগ, বিয়োগ ও গুণন প্রক্রিয়ার শূন্যের প্রয়োগ দেখিয়েছেন । মহাবীর শূন্য দ্বারা ভাগে ক্রটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন । কিন্তু ভাস্কর ভুল করেন নি । কারণ, আধুনিক গণিতের অনন্ত বিষয়ে ধারণা তাঁর অনেকখানি স্বচ্ছ ছিল । তিনি

বলেছেন কোন রাশিকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল অনন্ত হয়। তাঁর প্রাসঙ্গিক স্মৃতিটি এরূপ :

যোগে অংক্ষেপ সমং বর্গাদৌ অং খডাক্তিতো রাশিঃ। অহরঃ সাং
সত্ত্বগঃ অং খত্তগচ্চিস্ত্যচ্চ শেষবিরোধী। শূন্তে গুণকে জ্ঞাতে অং হারশ্চেন্
পুমান্তদা রাশি। অবিকৃত এব জ্জয়ন্তৈব খেনোনিতক্ষ যুতঃ।

অর্থাৎ কোন রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে একই থাকবে। শূন্তের সঙ্গে গুণে
শূন্য হবে; শূন্য দ্বারা ভাগ অশেষ হবে। শূন্তের বেলায় শূন্য হলেও শূন্য গুণনরূপে
থেকে যাবে; শূন্য ভাজকরূপে ধরলে অবিকৃত রাশি যা উহ্য আছে, তা
অপরিবর্তিত থাকবে।

ভাস্কর প্রদত্ত দুটি উদাহরণে $\frac{a \times 0}{b \times 0} = \frac{a}{b}$ দেখা যায়। বলা বাহুল্য এখানে
শূন্যকে অপরিমেয় ক্ষুদ্রতম রাশি হিসাবে ধারণা করা হয়েছে। আধুনিক গাণিতিক
সংস্কৃতিতে লেখা যায়,—

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{a \times \epsilon}{b \times \epsilon} = \frac{a}{b}$$

নিউটন ও লিবনিজের পাঁচশ' বছর পূর্বে ভাস্করের পক্ষে অপরিমেয় ক্ষুদ্রতম
রাশির (Infinitesimal) চিহ্ন ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, আর তিনি তা
করেন নি। কিন্তু সন্দেহ নাই তাঁর এ-সম্পর্কে ধারণা ছিল।

বীজগণিতাংশে শূন্য ও অনন্ত বিষয়ে ভাস্কর আলোচনা করেছেন। $\infty \pm \infty = \infty$
—এই বিবৃতির বর্ণনায় তিনি বলেছেন বিশ্বের স্বজন-কালে সমস্ত শক্তির অধিকারী
প্রীতগবান কোটি কোটি জীবের সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়-কালে সমস্ত জীব তাঁর
দেহে লীন হয়। কিন্তু তাতে সেই সর্বশক্তিমানের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না।
ব্যাক্তিরের আটশ' বছর আগে অনন্ত বিষয়ে এ-ধারণা বিশ্বের বৈকি!

॥ করণী ॥

a, b, c ও d মূলদ রাশি হলে, $a + \sqrt{b}$ এবং $a + \sqrt{b} + \sqrt{c} + \sqrt{d}$ -এর
বর্গমূল নির্ণয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাস্কর, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্বদা সম্ভব নয় বলে ইঙ্গিত
করেছেন। এরকম একটি উদাহরণ দিয়েছেন $10 + \sqrt{32} + \sqrt{24} + \sqrt{8}$ ।

১. উদাহরণ : ত্রিভুজের বাহুদ্বয় $\sqrt{13}$, $\sqrt{5}$ এবং কোণকল ৪ হলে তার ক্ষেত্র কত ?

ভাষ্কর উত্তর দিয়েছেন ৪ ; অথ একটি উত্তর $2\sqrt{5}$ দেননি ।

২. উদাহরণ : ত্রিভুজের বাহুদ্বয় $\sqrt{10}-\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ এবং ক্ষেত্র $\sqrt{18}-1$ হলে তার উচ্চতা কত ?

ভাষ্করের উত্তর $\sqrt{2}-1$

॥ কয়েকটি উদাহরণ ॥

স্বজনশীল রস-সাহিত্য শ্রষ্টারাই যে উচ্চ কল্পনার অধিকারী, আর কেউ নয়, এমন কথা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যারা অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা সবাই বড় কাল্পনিক ছিলেন। প্রথমে একটি ভাব আসে ; তাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে প্রকৃষ্ট রূপ-দান করাই প্রতিভার অত্যন্ত প্রধান কাজ। ভাষ্কর একদিকে যেমন ছিলেন কুশাগ্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ, অতীক্ষ্ণ তেমনই ছিলেন উচ্চ কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন রসশ্রষ্টা। লীলাবতীতে এমন কতকগুলি অঙ্ক আছে যার কাব্যসৌন্দর্য উপেক্ষা করা যায় না। এক ক্যাজরি এই অঙ্কগুলি সম্পর্কে বলেছেন “pleasing poetic garb”. লীলাবতী চিত্তাকর্ষক ও আনন্দজনক অঙ্কের জন্ম বিখ্যাত। মনে হয় আচার্য ভাষ্কর এই সত্যটি বিশ্বাস করতেন “It is only amusing oneself that one can learn”.

১. উদাহরণ : বালে মরালকুলমূল দলনিস্ত
তীরে বিলাস ভরমহুরগাণরপশু
কুর্বৎকেলি কলহং কলহংসমুগম
শেষং জলে বদমরালকুল প্রমাণম্ ।

—বালিকা ! একদল রাজহংসের বর্গমূলের $\frac{7}{2}$ অংশ একটি দীঘির তীরে বিচরণ করছে, অবশিষ্ট দুটি জলে কেলি করছে। রাজহংসের সংখ্যা কত ?

রাজহংসের সংখ্যা x হলে, সর্তীহুসারে,

$$\frac{7}{2}\sqrt{x+2}=x$$

এই দ্বিঘাত সমীকরণটি সমাধান করলে x -এর অর্থও মান ১৬ পাওয়া যায়।

২. উদাহরণ : একগুচ্ছ পদ্মফুলের মধ্য থেকে এক-তৃতীয়াংশ, এক-পঞ্চমাংশ ও এক-ষষ্ঠাংশ যথাক্রমে ভগবান শিব, বিষ্ণু ও সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করা হলো। এবং দেবী ভবানীর উদ্দেশ্যে এক-চতুর্থাংশ নিবেদিত হলো। অবশিষ্ট ৬টি ফুল পূজনীয় আচার্যকে প্রদান করা হলে, পদ্মফুলের সংখ্যা কত ?

এই অঙ্কটির সমাধানে ভাস্কর 'ইষ্টকর্ম' পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে অজ্ঞাত সংখ্যাটি x ধরে সমাধান করা হলো।

পদ্মফুলের সংখ্যা x হলে, সর্তাহুসারে,

$$x - \left(\frac{x}{3} + \frac{x}{5} + \frac{x}{6} + \frac{x}{4} \right) = 6$$

$$\text{বা, } \frac{x}{20} = 6$$

$$\text{বা, } x = 120$$

৩. উদাহরণ : এক বাঁক মক্ষিকার অর্ধের বর্গমূল এবং ৬ অংশ মালতী পুষ্প বনে মধু সংগ্রহে গেল; একটি মক্ষিকা পদ্মফুলের শূগড়ে প্রমুগ হয়ে সন্ধ্যাকালে পদ্মফুলের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার মক্ষিরাদীটি সেখানে গুণগুণ করে বেড়াতে লাগল। হে ভদ্রে, মক্ষিকার সংখ্যা কত ?

[উত্তর—72]

৪. উদাহরণ : 100 (টাকার) 1 মাসের সুদ 5 (টাকা) হলে 16 (টাকার) 12 মাসের সুদ কত ? সুদ ও আসল প্রদত্ত হলে সময় নির্ণয় কর; সময় ও সুদ প্রদত্ত হলে আসল নির্ণয় কর।

সুদ নির্ণয় :

অঙ্কটি কবতে দুটি পক্ষের কথা বলা হয়েছে,—‘প্রমাণ-পক্ষ’ ও ‘ইচ্ছা-পক্ষ’। ‘প্রমাণ-পক্ষে’ কোন অজ্ঞাত রাশি থাকে না, কিন্তু ‘ইচ্ছা-পক্ষে’ অজ্ঞাত রাশি থাকে। প্রদত্ত অঙ্কটিতে,

প্রমাণ-পক্ষ : 100 1 মাস 5 (ফল)

ইচ্ছা-পক্ষ : 16 12 মাস '0' বা x

উপরোক্ত দুটি পক্ষকে নিম্নরূপ ছকে সাজানোর রীতি ছিল :

100	16
1	12
5	0

প্রথম পক্ষে 5 (ফল), কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে নাই। সুতরাং তারা প্রতিস্থাপিত হবে :

100	16
1	12
0	5

ছকটির দ্বিতীয়ার্ধের বৃহত্তম সংখ্যা $= 16 \times 12 \times 5 = 960$ এবং প্রথমার্ধের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা $= 100 \times 1 = 100$

$$\therefore \text{সুদ} = \frac{960}{100} = \frac{48}{5} = \frac{48}{5}$$

সময় নির্ণয় :

এখানে, প্রমাণ-পক্ষ : 100 1 মাস 5

ইচ্ছা-পক্ষ : 16 — 0 বা x $\frac{48}{5}$

পূর্বের মত ছকে সাজিয়ে :

100	16
1	0
5	48 ₅

পূর্বের স্থায় পক্ষান্তর ক'রে,—

100	16
1	0
48 ₅	5

এবার হরের পরিবর্তন ক'রে,—

100	16
1	0
48	5 ₅

প্রথমার্ধের বৃহত্তর সংখ্যা = $100 \times 1 \times 48 = 4800$

দ্বিতীয়ার্ধের ক্ষুদ্রতর সংখ্যা = $16 \times 5 \times 5 = 400$

$$\therefore \text{নির্ণয় সময়} = \frac{4800}{400} = \frac{4800}{400} = 12 \text{ মাস}$$

ত্রৈমাসিক, পঞ্চমাসিক প্রভৃতিতে ব্যবহৃত পয়সিভাণ্ডা ও নিয়ম সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত

বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে ভাস্কর কর্তৃক প্রদত্ত সূত্রটি বিবৃত করা হলো :

পঞ্চসপ্ত নবরাশিকানিকেক্ষেত্রোক্ত পঞ্চনয়নং কলচ্ছিদায় ।

সংবিধায় বহুরাশিজে বধে স্বল্পরাশিব্যভাষিতে কলম্ ॥

ভাবার্থ : পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক, নবরাশিক বা ততোধিক রাশির ক্ষেত্রে ‘কল’ ও ‘ছিদ’-কে পরস্পরের পক্ষ থেকে মধ্য স্থাপন করে বৃহত্তর সংখ্যাকে ক্ষুদ্রতর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে দ্বিগুণিত ফল পাওয়া যায়।

5. উদাহরণ : যদি সম ভূমি বেণুছিজিগাণিপ্রমাণো

গণক পবনবেগাদেকদেশে সত্ত্বঃ

ভূবিন্দুপমিত হস্তেঘংগলম্বং তত্রগ্রং

কথয়কতিস্থ মূলাদেঘত্বঃ করেষু ।

অর্থাৎ সমতলে একটি 32 (ফুট) বাঁশ ঝড়ে ভেঙে পাদদেশ থেকে 16 (ফুট) দূরে মাটি স্পর্শ করল। হে গণক, বাঁশটি কত উচ্চে ভেঙেছিল ?

অঙ্কটি খুবই সহজ। স্কুল গণিতের সাহায্যেই কথা যায়। বলা বাহুল্য, এটি সমকোণী ত্রিভুজের ধর্মের প্রয়োগ মাত্র।

॥ পরিমিতি ॥

গণিতের অঙ্গস্বরূপ পরিমিতির আলোচনাও ভাস্কর করেছেন। লীলাবতীর 201-তম শ্লোকটিতে বৃত্তের ক্ষেত্রফল, গোলকের পৃষ্ঠফল ও ঘনফলের সূত্র প্রদত্ত হয়েছে :

$$(1) \text{ বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \text{পরিধি} \times \frac{d}{4} = \frac{\pi d^2}{4} = \pi r^2$$

এখানে, d = ব্যাস ও r = ব্যাসার্ধ

$$(2) \text{ গোলকের পৃষ্ঠফল} = \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} \times 4 = 4 \times \pi r^2 = 4\pi r^2$$

$$(3) \text{ গোলকের ঘনফল} = \text{পৃষ্ঠফল} \times \frac{2r}{6} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

লীলাবতীর 217-তম শ্লোকে স্ফিট্রম, চোঙ, পিরামিড ও শঙ্কু সম্পর্কীয় সূত্রও দেখতে পাওয়া যায়।

(1) যে পিরামিডের ভূমি আয়তক্ষেত্র, তার আয়তন $= \frac{a \times b \times h}{3}$ । এখানে, a, b ও h যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা।

(2) শঙ্কুর আয়তন $= \pi \frac{d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$

॥ জ্যামিতি ॥

জ্যামিতিতে বৃত্ত ও গোলক বিষয়ে ভাস্করের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়াম ও চতুর্ভুজ বিষয়ে তাঁর তেমন লক্ষণীয় অবদান নেই বললেই চলে। তবে সমকোণী ত্রিভুজ ও সদৃশ ত্রিভুজের প্রাত্যহিক সমস্যা ও জ্যোতি-বিজ্ঞানে প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে তাঁর বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও গোলকের পৃষ্ঠফল ও ঘনফলের সূত্র বিবৃত হয়েছে। আরো কয়েকটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাক।

॥ ত্রিভুজ ॥

প্রকৃতপক্ষে, ত্রিভুজ বিষয়ে ভাস্কর পূর্বসূরী ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর ও মহাবীরের সিদ্ধান্তের প্রায় কোন পরিবর্তন করেননি। এমন কি, ত্রিভুজের যে পরিলিখিত বৃত্ত থাকতে পারে এ-কথা ভাস্করের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তিনি সমকোণী ত্রিভুজের সাংখ্যিক সমাধানে সমকোণ সন্নিহিত একটি বাহু প্রদত্ত হলে অপর বাহুদ্বয় নির্ণয়ের এক নতুন পদ্ধতি দিয়েছেন। লীলাবতীর 141-তম শ্লোক থেকে জানতে পারা যায়, a প্রদত্ত ভুজ এবং m যে-কোন ঐচ্ছিক রাশি হলে,

$$\text{কোটি} = \frac{2am}{m^2 - 1}, \text{ এবং কর্ণ (অতিভুজ)} = \frac{2am^2}{m^2 - 1} - a$$


ত্রিভুজ বিষয়ে ভাস্কর অতিভুজের উপর বর্গ উপপাদ্যের সাংখ্যামানে প্রমাণ দিয়ে তাঁর প্রতিভার উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘বীজগণিত’ অধ্যায়ে এ-বিষয়ে সূত্রটি হচ্ছে :

দোঃ কোট্টয়ন্তরবর্গেণ দ্বিন্নো ঘাতঃ সমন্বিতঃ ।

বর্গযোগসমঃ স স্তাদ্ধ্রয়োন্নব্যক্তয়োর্ধ্বা ॥

দুটি বীজগাণিতিক রাশির মত ভুজ ও কোটির অন্তরের বর্গের সহিত উভয়ের গুণফলের দ্বিগুণ যুক্ত করলে উভয়ের বর্গের সমষ্টির সমান হবে।

ভাস্করের কাছ থেকে আমরা সূত্রটির ব্যাখ্যা পাইনি। : হুন্দের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ পাই ভাস্করাকার কৃষ্ণ ও গণেশের কাছ থেকে।



চিত্র—২৪

ABC সমকোণী ত্রিভুজ। উপরের চিত্রের মত চারটি সমান ও সদৃশ সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ বর্গের একটি বাহু হিসাবে ধরা হলো। তা হলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কেন্দ্রে ভুজ ও কোটির অন্তরের দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন হয়েছে।

$$\text{প্রত্যেক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \text{ভুজ} \times \text{কোটি}$$

$$\text{সুতরাং চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = 2 \times \text{ভুজ} \times \text{কোটি}$$

$$\therefore \text{বৃহত্তর বর্গ} = (\text{ভুজ} - \text{কোটি})^2 + 2 \times \text{ভুজ} \times \text{কোটি} \\ = (\text{ভুজ})^2 + (\text{কোটি})^2$$

এই প্রমাণটিকে ভারতীয় জ্যামিতিতে ‘জ্যামিতিক-বীজগণিতীয়’ (geometrico-algebraical) প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

॥ ট্রাপিজিয়াম ॥

বৈদিক ও জৈন গণিতে ট্রাপিজিয়ামের উচ্চ আসন ছিল। কিন্তু জ্যোতি-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর আর দে-আসনটি রইল না। কিন্তু তা বলে এ-বিষয়ে গবেষণা একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। যুগ যুগ ধরে ট্রাপিজিয়াম বিষয়ে গণিতজ্ঞরা নানা সিদ্ধান্ত করে এর বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখ করেছেন। ভাস্কর সর্ব প্রথম ট্রাপিজিয়ামের সূত্রটিই নামকরণ করেছেন ‘সমলম্বচতুর্ভুজ’। আর ট্রাপিজিয়াম অঙ্কনের সর্বো নীলাবতীর ১৪৫-তম শ্লোকে দেখতে পাওয়া যায় :

ট্র্যাপিজিয়ামের একটি তির্যক বাহু ও সম্মুখীন বাহুর সমষ্টি ক্ষুদ্রতর তির্যক বাহু ও ভূমির সমষ্টি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হবে।

॥ বৃত্ত ॥

ভাস্কর কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বৃত্তের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, বহিঃস্থুল বলে ভাস্কর উল্লেখ করেছেন। বৃত্তের পরিধি C , ব্যাস d এবং চাপ a -এর জ্যা c হলে,

$$c = \frac{4d(C-a)a}{5C^2/4 - (C-a)a}$$

॥ ত্রিকোণমিতি ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ত্রিকোণমিতি পৃথক বিষয় হিসাবে অঙ্গীকৃত হয়নি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনেই এর উদ্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বিশুদ্ধ গাণিতিক চিন্তার চেয়ে এর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। সামন্তলিক ও গোলায় ত্রিকোণমিতি আবির্ভূত হলো কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য। সাইন-তালিকার উদ্ভব হলো গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতি-নির্ণয়ে সম্ভাব্য নিভুলতা আনয়নে। আর্ঘভট ত্রিকোণমিতির আবিষ্কারক নন। কারণ, তাঁরও পূর্বে সূর্য-সিদ্ধান্তে এ-বিষয়ের আলোচনা ও ব্যবহার আছে। বরাহমিহির পৌলিশ-সিদ্ধান্তে $(R \sin 30)^\circ$, $(R \sin 45)^\circ$ এবং $(R \sin 60)^\circ$ -এর মান দিয়েছেন যথাক্রমে $R^2/4$, $R^2/2$ এবং $3R^2/4$ । আর্ঘভট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, লল্ল, দ্বিতীয় আর্ঘভট প্রভৃতি গণিতজ্ঞদের রচনায় কিছু-না-কিছু ত্রিকোণমিতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস্করের সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধায়ে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায় :

$$(1) \sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$(2) \sin \frac{A+B}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{[(\sin A + \sin B)^2 + (\cos A - \cos B)^2]}$$

$$(3) \sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \cdot R$$

$$(4) \sin 36^\circ = \sqrt{\frac{5R^2 - \sqrt{5}R^4}{8}}, \quad R = \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ।}$$

॥ কলন (Calculus) ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা প্রায় একই বিষয়সমূহের অল্পবর্তন করে কেউ কেউ পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তের সামান্য কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন করেছেন মাত্র। এমন কি উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের কোন কোন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনাও করেছেন। যেমন, আর্ষভট্টের জু-জমণবাদ উত্তরসূরীদের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হয়। দ্বিতীয় আর্ষভট্ট ও ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক আবিষ্কৃত রক্তে অন্তর্নিখিত চতুর্ভুজ বিষয়েও সমালোচনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের ‘প্রক্ষেপভঙ্গ’ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তেমনি ভাস্করের অন্তর-কলন সম্পর্কীয় ধারণাটিও অল্পবেই বিনষ্ট হয়েছে। মধ্যযুগের গণিতজ্ঞরা গণিতে অনেক উচ্চতর গবেষণা করে নিউটন, লিবনিজ, গাউস প্রভৃতির পূর্বসূরীরূপে সম্মানিত হবার অধিকারী বটে, কিন্তু তাঁরাও ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের দুটি নতুন তত্ত্বের প্রতি কেন উদাসীন ছিলেন, তার কারণ নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। গ্রীক গণিতে সমাকলনের ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। ভাস্করও একই পদ্ধতিতে গোলকের ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয় করেন।

কিন্তু ভাস্করের বিস্ময়কর গাণিতিক প্রতিভার একটি নিদর্শন অন্তর কলন (Differential Calculus)-এর স্বরূপ আবিষ্কার। এই ধারণাটির ক্ষুদ্র বিশ্বগণিতে তাঁর পশ্চিৎ-এর সম্মান পাওয়া উচিত। গ্রহের প্রাত্যহিক গতি নির্ধারণের ক্ষমতা তিনি ‘ভংকালিকা’ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন,—দিনকে অতি ক্ষুদ্রসংখ্যা মুহূর্তে ভাগ করে প্রতি দুটি মুহূর্তে গ্রহাবস্থানের তুলনা করেছেন। ‘ভংকালিক’ গতি বলতে বোঝায় সেই মুহূর্তের গতি।

এ-বিষয়ে সাইন অপেক্ষকের অন্তর-কলন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। তাঁর সূত্রটি :

বিবার্ষন্ত কোটি জ্যাগুণ জিজ্যাহর : ফলং দোর্জ্যায়োস্তরং ।

আধুনিক অন্তর-কলনের ভাষায় :—

$$d(\sin \theta) = \cos \theta d\theta$$

Limit বা সীমা ছাড়া অন্তর-কলনের উন্নতি সম্ভব নয়। অথচ এই ধারণাটি নিউটন ও লিবনিজের পরবর্তীকালের। নিউটনের পাঁচশ’ বছর আগে অন্তর-কলনের ধারণা যে বিশ্বের কোন গণিতজ্ঞের মনে স্থান পেতে পারে, এ-কথা সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। অবশ্য গ্রীক গণিতে যে এ-ধারণা ছিল না, তা নয়। কিন্তু ভাস্করের ধারণা যেন আরো স্পষ্ট,—স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন।

॥ সিদ্ধান্ত-শিরোমণির জনপ্রিয়তা ॥

ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্তের পর আর যদি কোন ভারতীয় গণিতগ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত-শিরোমণির নাম করতে হয় সর্বাগ্রে। বিভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি ভারতে সর্বত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশের ভাষ্য রচনাও বহু হয়েছে। আবুল ফজল লীলাবতী অংশের পার্শী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বীজগণিত অংশের অনুবাদ করেন উজ্জ্বল-উজ্জ্বল রসহুদি।

সংযোজন

॥ নারায়ণ পণ্ডিত ॥

প্রখ্যাত ও অল্পখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে অস্তুত সাত-আটজন নারায়ণ পাওয়া যায়। আর্ঘভট সমস্তার মত এ-সমস্তা অত জটিল না হলেও বিভ্রান্তিকর। এঁদের মধ্যে নারায়ণ পণ্ডিতের গাণিতিক প্রতিভা উপেক্ষণীয় নয়।

নারায়ণ পণ্ডিতের পিতার নাম ব্রহ্মসিংহ দৈবজ্ঞ। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহের (1351-88 খ্রিঃ) রাজত্বকালে ইনি বর্তমান ছিলেন। পাটীগণিত ও বীজগণিত বিষয়ে এঁর দুটি গ্রন্থ আছে,—‘গণিত কোমুদী’ এবং ‘বীজগণিতা-বতঃশ’। পূর্বসূরী ভাস্কর কর্তৃক ইনি যে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, এঁকে সঠিকভাবে আর্ঘভটায়-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ‘গণিত কোমুদী’ গ্রন্থে তাঁর যুগের গণিত বিষয়ক জ্ঞানের বিস্তৃত ও পূর্ণ আলোচনা আছে। বীজগণিত গ্রন্থটি তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। এটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চিহ্ন-সূত্র, পাটীগণিতে শূঙ্খের ব্যবহার, অজ্ঞাত রাশির প্রক্রিয়া, করণী, চূর্ণন, বর্গ-প্রকৃতি, চক্রবাল-পদ্ধতির আলোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে সরল সমীকরণ প্রভৃতির আলোচনা দেখা যায়। দু’একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সর্বত্রই তিনি পূর্বসূরীদের অনুবর্তন করেছেন।

শ্রেণী বিষয়ক আলোচনার তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখা যায় না। এমন কি *g*-এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা বিদ্যিত করে।

নারায়ণ সংখ্যার বর্গ নির্ণয়ের নিয়রূপ শ্রুত দিয়েছেন :

$$A^2 = (a+b)^2 - (a-b)^2 + 4ab$$

। শ্রুত — ০ ।

নারায়ণ শ্রুতের তাৎপর্য ও তার প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ‘গণিত কোম্ভী’-তে তিনি বলেছেন, যেহেতু পাটীগণিতে শ্রুত দ্বারা ভাগ স্বীকৃত নয়, সেহেতু তিনি এখানে আলোচনা করছেন না। বীজগণিতে শ্রুত দ্বারা ভাগের প্রয়োগ আছে বলে তিনি বীজগণিতে এ-সম্পর্কে আলোচনা করেন।

গুণের বাখ্যার্থ নির্ণয়ের শ্রুত দিয়েছেন নারায়ণ। কোন গুণফলের সত্যতা নির্ণয়ে তাঁর নিয়মটি খুব কার্যকরী। চার নিয়মের বাখ্যার্থ নির্ণয় বিষয়ে এই লেখকের ‘গণিতের কথা ও কাহিনী’-তে উদাহরণসহ আলোচনা আছে।

বৃহৎ অন্তর্লিখিত দুটি উপপাত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। কিন্তু এ-বিষয়ে আলোচনার আগে ত্রিভুজ ও ট্রাপিজিয়াম সম্বন্ধে দু’একটি কথা বলা দরকার। নারায়ণ পূর্বসূরীদের ত্রিভুজ বিষয়ক সব গবেষণাই লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে আরো বিস্তৃতভাবে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি নতুন শ্রুত উল্লেখ করা হলো ;

চতুরাঙ্কদয়হতং ত্রিভুজদুজ্জামাৎ বরং গণিতম্

—ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের গুণফলকে পরিব্যাসার্ধের চতুর্গুণ দ্বারা ভাগ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।

$$\text{অতরাং, } A = \frac{a}{2}, \text{ উচ্চতা} = \frac{a}{2} \cdot \frac{bc}{2r} = \frac{abc}{4r}$$

[a, b ও c ত্রিভুজের তিনটি বাহু, r —পরিব্যাসার্ধ]

$$\text{গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল} = 3d^2 = 4.3 \cdot r^2 = 4\pi r^2$$

$$\text{গোলকের ঘনফল} = \text{পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল} \times \frac{\text{ব্যাস}}{6} = \frac{4.3 \cdot r^3}{3} = \frac{4\pi r^3}{3}$$

[এখানে $\pi=3$]

নারায়ণ প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞের সম্মান না পেলেও অন্তত বৃহৎ অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের উপপাত্রে উন্নতিসাধনে তাঁর এমন দু’একটি আবিষ্কার আছে যার

মূল্য অপরিমিত। এ-বিষয়ে তিনি ব্রহ্মসুপ্তের চেয়েও কয়েক পদ অগ্রসর হতে পেরেছেন, এটা কম গৌরবের নয়। তাঁর 'কর্ণজয়' উপপাণ্ডি হলো :

সর্বচতুর্ভাছনাং মুখ্যন্ত পরিবর্তনে যদা বিহিতৈ ।


কর্ণস্তদা তৃতীয়ঃ পর ইতি কর্ণজয়ঃ ভবতি ॥

—কোন চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের উপর ও পার্শ্বের বাহু পরস্পর বিনিময় করে তৃতীয় কর্ণ পাওয়া যায়। সুতরাং কর্ণ তিনটি।

কর্ণজয়ীর সাহায্যে বৃন্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি তাঁর একটি নতুন আবিষ্কার।

দ্বিগুণব্যাস বিভক্তে দ্বিকর্ণঘাতোৎপত্তবা গণিতম্ ।

—কর্ণজয়ীর ক্ষেত্রফলকে পরিব্যাসের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়।



চিত্র—২৫

$$\text{চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল} = \triangle ACD + \triangle ACB$$

$$= \frac{AC \cdot AD \cdot CD}{4r} + \frac{AC \cdot BC \cdot AB}{4r}$$

$$= \frac{AC}{4r} [BC' \cdot AD + DC' \cdot AB]$$

[এখানে r = পরিব্যাসার্ধ]

[এখানে, C' = শীর্ষবিন্দু, DC এবং BC পরস্পর বিনিময় দ্বারা]


টলেমীর উপপাণ্ডি অনুসারে,

$$BC' \cdot AD + DC' \cdot AB = AC' \cdot BD$$

$$\therefore \text{চতুর্ভুজ } ABCD = \frac{AC}{4r} (AC' \cdot BD) \\ = \frac{AC \cdot AC' \cdot BD}{2d}$$

নারায়ণ পরিব্যাসার্ধের সূত্র দিয়েছেন,—

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\text{কর্ণের গুণফল} \times \text{তির্থক বাহুর গুণফল}}{\text{উচ্চতার গুণফল}}}$$



চিত্র—২৬

$$\text{ত্রিভুজ } ADB \text{ থেকে, } r = \frac{AD \cdot BD}{2p_1}$$

$$\text{এবং ত্রিভুজ } ACB \text{ থেকে, } r = \frac{AC \cdot BC}{2p_2}$$

$$\therefore r^2 = \frac{AD \cdot BD \cdot AC \cdot BC}{4p_1 p_2}$$

$$\text{বা, } r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{AC \cdot BD \cdot AD \cdot BC}{P_1 P_2}}$$

$$\text{অর্থাৎ পরিব্যাসার্ধ} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\text{কর্ণের গুণফল} \times \text{তির্থক বাহুর গুণফল}}{\text{উচ্চতার গুণফল}}} \dots (1)$$

আবার, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলের পরিপ্রেক্ষিতে পরিব্যাসার্ধের একটি সূত্র পাওয়া যায় :

$$\text{পরিব্যাসার্ধ} = \frac{\text{তিনটি কর্ণের গুণফল}}{4A} \dots (2)$$

[A = চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল]

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

“The early history of the mind of men with regard to mathematics leads us to point out our own errors; and in this respect it is well to pay attention to the history of mathematics.”

—De Morgan.

॥ ভাষ্যকার-পরিচয় ॥

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় গণিতের স্বর্ণ-যুগ। ইউরোপে এই সময়টি ছিল গাণিতিক অবক্ষয়ের যুগ। আর্থডক্স, ব্রহ্মশূণ্ড, খ্রীধর, মহাবীর ও ভাস্করের সঙ্গে তুলনীয় এমন গণিতজ্ঞ ইউরোপের গণিতের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর পর যেখানে ইউরোপে গাণিতিক আবিষ্কারের বহা বয়ে গেছে, সেখানে ভারতে দেখা গেছে চরম হুর্দীন। দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন গণিতজ্ঞের কিছু আবিষ্কার ছাড়া সারা ভারতে যেন গণিত-চর্চা হয়নি বললেই চলে। কেন এরূপ অবক্ষয় হলো, তার দুটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে : (1) মধ্যযুগ বিশ্ব-ইতিহাসে অন্ধকারযুগ যুগ বলে কথিত। মনে হয়, এই যুগ-বৈশিষ্ট্যের অনিবার্ণ ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতীয় গণিতের অবক্ষয়। ইউরোপ এই যুগ-বৈশিষ্ট্যের কবলে পড়েছিল। কিন্তু রেনেসাঁর প্রেরণায় নতুন উদ্দীপনা ও চেতনা পেয়ে অন্ধকার থেকে আলোর আসতে পেরেছিল। ভারত পারেনি। পারেনি,—কারণ (2) দশম শতাব্দীর পর মুসলমান-আক্রমণে এ-দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল বিষয়েরই স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় মনীষা প্রধানত রক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করার নব নব সৃষ্টির অহুকূল পরিবেশ পাননি। উত্তরভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর অঞ্চল বলে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে গণিত-চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় গণিতে দক্ষিণ ভারতের অবদান কম নয়। প্রথম ভাস্কর, মহাবীর,

ভাস্কর প্রভৃতি অতি উচ্চশ্রেণীর গণিতজ্ঞদের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতে। আর্থাভটের দক্ষিণ ভারতে জন্ম নিয়ে বিতর্ক আছে। আর আধুনিক যুগের বিস্তৃত গণিতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা রামানুজমের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতেই। জল, বায়ু, মাটি ও ওই অঞ্চলের মানসিক প্রবণতা খুব সম্ভব গাণিতিক প্রতিভা বিকাশের অনুকূলে। বাংলার মাটি যেমন কাব্যপ্রতিভা বিকাশের অমুকূল, পাঞ্জাব যেমন ক্রান্ত-শক্তি বিকাশের অমুকূল, দক্ষিণ ভারতও তেমনি গাণিতিক প্রতিভা বিকাশের অমুকূল বলে মনে হয়। ভারতীকৃষ্ণ তীর্থজীও তার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গাণিতিক প্রতিভার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্যে কোন আঞ্চলিক তথা ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব আছে কি না, এ-সম্পর্কে বিতর্ক আছে। গণিতজ্ঞ ও মনোবিদরাও এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না। তবে প্রখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ ফেলিক্স ক্লেইন (Felix Klein) গাণিতিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,—“It would seem as if a strong naive space intuition were an attribute of the Teutonic race, while the critical, purely logical sense is more developed in the Latin and Hebrew races.”

॥ পৃথুদকস্বামী ॥

প্রধানত ভাস্কর্য্যকার হিসাবে এঁর খ্যাতি। ইনি নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। পিতার নাম মধুসূদন ত্রীভট্ট। ইনি ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাস্কর্য্যকার। ব্রহ্ম-সূত্র-সিদ্ধান্ত ও খণ্ডখণ্ডকের উপর এঁর ভাস্কর্য্যই প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে ধরা হয়। আর্থাভটের ভূ-ভ্রমণবাদ সমর্থন করে ইনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি, তাঁর ভাস্কর্য্যে যে-সব উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, তার অনেকগুলি তাঁর নিজস্ব বলে মনে করা হয়। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ত্রীপতির গ্রন্থে পৃথুদকস্বামীর উল্লেখ আছে। এ থেকে অস্বীকৃত হয়, তিনি ত্রীপতির পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী এই দু'শ বছর ধরে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা প্রধানত ভাস্কর্য্যচর্চায় ব্যাপ্ত ছিলেন। তবে তারই মধ্যে যে কোন মৌলিক আবিষ্কার হয়নি, একথা বলা যায় না। যখনই আমরা আধুনিক উচ্চতর গণিতের কয়েকটি আবিষ্কারের পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা করব।

II পরমেশ্বর II

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য পরমেশ্বর। ইনি খুব সম্ভব 1360 খ্রীষ্টাব্দে কেরালার দক্ষিণ মালাবারের 'আলভুর' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গোত্রের নাম ছিল ভৃগু। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর গুরুর নাম রুদ্র। নারায়ণ ও মাধব নামে আরো দু'জন গুরুর নাম জানতে পারা যায়।

পরমেশ্বর প্রায় 30 খানি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর মৌলিক রচনার যেমন অভাব নাই, তেমনি আর্ষভট, প্রথম ভাস্কর ও ভাস্করের উপর মূল্যবান ভাস্ক-গ্রন্থেরও অভাব নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'দৃক'-পদ্ধতি আবিষ্কারে তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ ও গণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতির উদ্ভব। অবশ্য 'পরহিত'-পদ্ধতির সংস্কারের মধ্যে এই পদ্ধতির স্ফূর্তি নিহিত আছে। 55 বছর ধরে অনলস পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে তিনি এই পদ্ধতি 1431 খ্রীষ্টাব্দে লোকগোচরে আনেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো :

(1) দৃশ্-গণিত, (2) গোলদীপিকা, (3) গ্রহনমণ্ডল, (4) ভট্টনীপিকা, (5) লঘুভাস্করীয়, (6) কর্মদীপিকা, (7) সিদ্ধান্ত-দীপিকা (8) লঘুমাসের ভাস্ক, বিবরণ প্রভৃতি।

পরমেশ্বরের গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানিক প্রতিভার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তাঁর পুত্র দামোদর। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রিয় শিষ্য নীলকণ্ঠের দেখা থেকে জানা যায় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর লেখার কিছু কিছু উদ্ধৃতি কেবল নীলকণ্ঠের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

নীলকণ্ঠ সোমস্বামী (প্রথম নীলকণ্ঠ)

শৈব নীলকণ্ঠ কেরালার শ্রীকৃষ্ণপুর বা শ্রীকৃষ্ণগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর 'সিদ্ধান্তদর্পণ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি 1443 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নীলকণ্ঠের পদবী সোমস্বামী, সোমস্বত, সোমস্বয়ন প্রভৃতি। তিনি ছিলেন গার্গ-গোত্রীয় ভট্ট ব্রাহ্মণ। পিতার

নাম জাতবেদ, খুল্লভাতের নামও তাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শঙ্কর। তাঁর স্ত্রীর নাম আর্ষা এবং রাম ও দক্ষিণামূর্তি নামে তাঁর দুটি পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র বহুশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন। আর্ষভট্টীয় ভাস্করের বহু স্থানে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্করের উল্লেখ করেছেন। নেতুনারায়ণ ছিলেন নীলকণ্ঠের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এমন কি আর্ষভট্টীয় ভাস্কর রচনার প্রেরণা তিনি তাঁর কাছে থেকেই পেয়েছিলেন। নেতুনারায়ণ ও তাঁর পরিবারের কেবলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে। বিধান ও বিষ্ণোৎসাহী হিসাবে এই পরিবার বিখ্যাত।

নীলকণ্ঠের প্রথম গুরু রবি। তাঁর কাছে তিনি বেদান্ত ও প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ নেন। কিন্তু প্রকৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করেন দৃগ্‌গণিতের আবিষ্কারক পরমেশ্বরের পুত্র দামোদরের কাছে। এমন কি ছোটবেলায় গুরুগৃহে তিনি গুরুর গুরু পরমেশ্বরের কাছেও সামান্য পাঠ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।


দৃগ্‌গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সে কারণে তাঁকে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে “ষড়্‌-দর্শনী-পারঙ্গত” বলে আখ্যাত করা হয়েছে। মীমাংসা, ছন্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তাঁর রচনায় আছে। বেদান্ত-জ্যোতির থেকে শুরু করে আর্ষভট্টীয়, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক, বৃহৎসংহিতা, সূর্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত-শেখর, লঘুমানস প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গোবিন্দস্বামিন, পরমেশ্বর, দামোদর, মাধব প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে নীলকণ্ঠ ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী।

নীলকণ্ঠ রচিত সব গ্রন্থের আবিষ্কার এখনো সম্ভব হয়নি। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো : (১) গোলসার, (২) সিদ্ধান্তদর্পণ, (৩) ছায়াগণিত, (৪) তন্ত্রসার সংগ্রহ, (৫) মহাভাস্কর (আর্ষভট্টীয়-ভাস্কর), (৬) গ্রহণ নির্ণয়, (৭) গ্রহণাদিগ্রন্থ প্রভৃতি।

নীলকণ্ঠ আর্ষভট্টীয়-ভাষ্যের নাম দিয়েছেন মহাভাস্কর। সত্যিই এটিকে মহাভাস্কর বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, জটিল ও দুর্বোধ্য আর্ষভট্টীয় গ্রন্থের এমন বিস্তৃত ব্যাখ্যা বোধ হয় আর নাই। উদাহরণস্বরূপ আর্ষভট্ট পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতটি কেন ‘আসন্ন’ বলে অভিহিত করেছিলেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠ বলেছেন : “প্রকৃত মানের পরিবর্তে কেন এখানে আসন্ন মান দেওয়া হয়েছে? আমি ব্যাখ্যা করব। কারণ প্রকৃত মান দেওয়া যাবে না। যে-মানে ব্যাস

পরিমাপ করলে ভাগশেষ থাকে না, সে-মানে পরিমি পরিমাপ করলে নিশ্চিত ভাগশেষ থাকে। একইভাবে যে-এককে পরিমি পরিমাপ করলে ভাগশেষ থাকে না, সে-এককে ব্যাস পরিমাপ করলে আবার ভাগশেষ থাকে। প্রক্রিয়াটির বার বার সম্পাদনে আমরা ক্ষুদ্রতম ভাগশেষ পেতে পারি বটে, কিন্তু ভাগশেষহীন হবে না। ইতি ভাবঃ।”

অর্ধভট বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র দিয়েছেন $\frac{1}{2}$ পরিমি. ব্যাস $\frac{1}{2}$ । কিন্তু কিতাবে অর্ধভট এই সিদ্ধান্তে এলেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নীলকণ্ঠের ভাষ্যে।



চিত্র—২৭

উপরের চিত্রের মত একটি বৃত্তকে বহু সূচ্যাকারক্ষেত্রে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই সূচ্যাকারক্ষেত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা হবে, ততই ত্রিভুজসমূহের ভূমি সরলরেখায় পরিণত হবে। এখন, এরূপ ক্ষুদ্র দুটি সূচ্যাকে পরস্পর উল্টো ভাবে স্থাপন করলে একটি আয়তক্ষেত্র উৎপন্ন হবে যার একটি বাহু বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান হবে, আর সূচ্যের ভূমি হবে অল্প একটি বাহু। এভাবে বৃত্তটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রের সমষ্টিরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এভাবে একটি মাত্র আয়তক্ষেত্র গঠিত হবে যার একটি বাহু বৃত্তের অর্ধ-পরিসীমা এবং অল্প বাহুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ। এই যুক্তির দ্বারা বৃত্তের ক্ষেত্রফল সূত্র হয়— $\frac{1}{2}$ পরিসীমা $\times \frac{1}{2}$ ব্যাস।

॥ কল্পে একটি পরিবারের কথা ॥

চতুর্দশ শতাব্দীর আর দু'জন ভাস্কর্যকার হচ্চেন গদাধর ও তদীয় ভ্রাতা বিষ্ণু। এঁরা ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী। গদাধর ভাস্করের লীলাবতী ও বীজগণিতের

ভাষ্য রচনা করেন এবং বিষ্ণু শ্রীধরের গণিতের ভাষ্য ‘গণিত-সার’ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ত্রিশতিকাৰ অনেক উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চায় কেন্দ্ররূপে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা প্রধানত ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও টীকা রচনার মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন।

জ্ঞানরাজ গোদাবরী ও বিদর্ভের সঙ্গমস্থলে পার্শ্বপুরে ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মঙ্গলন গ্রন্থ ‘সিদ্ধান্ত-সুন্দর’-এর রচয়িতা হিসাবে তাঁর সমধিক খ্যাতি। ভাস্করের বীজগণিতের উপরেও তাঁর ভাষ্য আছে। জ্ঞানরাজের সুষোণ্য পুত্র সূর্যদাসও ভাস্করের বীজগণিতের উপর ভাষ্য রচনা করেন। ‘গণিতামৃতক্লিপিকা’ নামে একটি পাটীগণিত গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। জ্ঞানরাজের শিষ্য ধুন্ধিরাজও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষ্য রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর আরব সাগর তীরবর্তী নন্দীগ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ পরিবারের নাম ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয়। এই পরিবারের গণেশ দৈবজ্ঞ ছিলেন সত্যকার মৌলিক গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রচিত ভাস্করের লীলাবতী ভাষ্য ‘বুদ্ধিবিলাসিনী’ পাটীগণিতের একটি ক্লাসিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। গণেশের পিতার নাম কেশব ও এক ভ্রাতৃপুত্রের নাম নৃসিংহ। উভয়েরই জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান আছে। তাঁর এক ভাগিনা লক্ষ্মীদাসও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন।

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত গোদাবরীর উত্তর তীরস্থ গোলগ্রামের আর এক ব্রাহ্মণ পরিবার জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় পীঠস্থানরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। গণেশের শিষ্য দিবাকর ছিলেন এই পরিবারের শীর্ষে। দিবাকরের পাঁচ পুত্র সুষোণ্য পিতার তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দিবাকরের পাঁচ পুত্রের নাম,—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মল্লারি, কেশব ও বিশ্বনাথ। এঁরা সকলেই, বিশেষ করে মল্লারী ও বিশ্বনাথ কালক্রমে ভাষ্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কয়েক পুরুষ ধরে এই পরিবারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কৃষ্ণের পুত্র নৃসিংহ এবং নৃসিংহের চারপুত্র দিবাকর, কমলাকর, গোপীনাথ ও রজনীনাথ এই গাণিতিক ঐতিহ্য বহন করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেন। সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব-বিবেকের গ্রন্থকার কমলাকর ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত অধিকার অর্জন করা ছাড়াও আরবীয় ও পারস্যীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইউক্লিড ও পাবলীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি স্থাপন করে

তিনি ভাস্করের সমালোচনা করেন। রঙ্গনাথ 'মিত্তভাষিনী' নামে লীলাবতীর ভাষ্য রচনা করেন।

পূর্বপুরুষদের বৃত্তি অবলম্বন করে মধ্যপ্রদেশের ইলাচপুর নিবাসী বল্লাল আর একটি পারিবারিক গাণিতিক ঐতিহ্য স্থাপন করেন। কীর্তিবান পাঁচ পুত্রের পিতা বল্লাল গোলগ্রাম-নিবাসী দিবাকরের মতই ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ও রঙ্গনাথ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অধিক খ্যাতি অর্জন করেন। কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ ছিলেন দিবাকরের পুত্র বিষ্ণুর পিতা। তিনি জাহ্নবীরেব দরবারে প্রধান জ্যোতিষীর আসন অলঙ্কৃত করতেন। ভাস্করের বীজগণিতের উপর 'মহাবহু' ও লীলাবতীর উপর 'কল্পলতাবভাস' টীকা রচনা করেন। রঙ্গনাথ পূর্ব সিদ্ধান্তের উপর 'সূত্রার্থপ্রকাশ' নামে এক সহজ ও স্থূলর বিবরণ প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। রঙ্গনাথের পুত্র মুনীশ্বর ছিলেন ভাস্করের একজন প্রধান অহ্বাগী ও সমর্থক। 'মুনীতি' নামে সিদ্ধান্তশিষ্যোমণির একখানি টীকা ও 'পাটীসার' নামে একখানি পাটীগণিত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। কমলাকর ভাস্করের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করার তিনি প্রতিবাদ করেন।

উপরের আলোচনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও রীতি অহ্বাগী জ্ঞান ওর থেকে শিষ্ট এবং পিতা থেকে পুত্রের মাধ্যমে বাহিত হয়ে চলে আসছে। ডঃ কে. ভি. পর্মা তাঁর *A History of the Kerala School of Hindu Astronomy* গ্রন্থে এই ঐতিহ্য বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। জয়োদন শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অবধি একটি ধারা হচ্ছে : গোবিন্দ তটতিরি (1237—95) → শিষ্ট : পরমেশ্বরের পিতামহ (13-14 শতাব্দী) → নাসি ও শিষ্ট : পরমেশ্বর (1360—1455) → পুত্র : দামোদর (পঞ্চদশ শতাব্দী) → শিষ্য : নীলকণ্ঠ সোমরাজী (1443—1545) → শিষ্য : জেষ্ঠ্যদেব (1500—1600) → শিষ্য : অচ্যুত শিবারতি (1500—1621)।

॥ সোমরাজী জয় সিং ॥

গণিতের ইতিহাসে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজরাজড়াদের স্থান আছে বটে, কিন্তু কোন রাজ-রাজড়া গাণিতিক আবিষ্কার করেছেন এমনটি দেখা যায় না। দিবাকুরের রাজা হীরল ও তাঁর পুত্র পেলম বিশ্ববন্দিত গ্রীক গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গাণিতিক গবেষণার উৎসাহদাতা ছিলেন টলেমী-রা; বাশিরাক

সম্রাট ক্যাথারিন ছিলেন অৱলাৰ্হের স্তায় গণিতজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক; আর্মীনিয় ফাৰ্ভিশাও ছিলেন গাউসের শিক্ষা ও কর্মজীবনের উৎসাহদাতা; আর মেনোভিলিয়ান তো ল্যাপলাস, মার্সেনে, লেজেন্ডার প্রমুখ গণিতজ্ঞদের সমাদর ও আচ্ছাদ্য করতেন। এইরকম আরো গণিতজ্ঞ রাজাচক্ৰা পেয়েছেন,—আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম নাই। ইতিপূর্বে আমরা মহাবীরের কথা বলেছি; মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে কেবালা রাজ্যের অনেক জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ রাজাচক্ৰা পেয়েছেন। এমন কি, মুসলমান শাসনকর্তারাও অনেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদদের সমাদর করেছেন। অস্ত্র শেখের কথা জানি না, কিন্তু ভারতে হিন্দু রাজা-রাজড়াদের মধ্যে গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদদের অত্যাব দেখা যায় না। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের শ্রবণ রাখতে হবে যে, যে কয়েকজন রাজা-মহারাজা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করেছেন, তাঁরা কেউই তেমন বিশেষকর কিছু আধিকার করতে পারেন নি। মনে হয়, একদিকে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা, আর অন্য দিকে রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ ইত্যাদি পরিচালনা,—এই দুই সেকর মধ্যে সমতা স্থাপন করা একান্তই অসম্ভব। অস্ত্র জয় সিং-এর গাণিতিক গবেষণা ও বাষ্ট্রনৈতিক জীবন থেকে একদমই মনে হয়।

॥ জয় সিং-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ॥

ঔৎকণ্ঠ্যের বিখ্যাত সেনাপতি জয় সিং-এর নাম সংলগ্নবিদিত। দামিণীত্যা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন আমাদের আলোচ্য জয় সিং-এর জন্ম হয়নি। আমাদের আলোচ্য জয় সিং বিনি সোহাই জয় সিং নামে অধিক পরিচিত, তিনি ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়গ্রহণ করেন। আর রাজ্য তেবো বছর বয়সে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অৱহের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হিসাবে পূর্ণ মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁর সময় লেগেছিল, এবং প্রথম দিকে বহু বাধা-বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঔৎকণ্ঠ্যের মৃত্যুর পর ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সমগ্র রাজ্যের অধিকার লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হন। শাসনকর্তা, সৈন্যধ্যক্ষ ও পণ্ডিত হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। বাষ্ট্রনীতিতে প্রথম জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্ত তিনি ওই সময়ে ম্যাক্‌ইন্ট্যাভিসি নামে অভিহিত হতেন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ শাহ কর্তৃক আগ্রা ও মালবের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানীর নাম জয়নগর বা জয়পুর। বলা বাহুল্য,

তীর নাম অহুসাবেই এই নামকরণ হয়। তীর সময়ে জয়পুর বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে তিনি একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রে মানমন্দিরের গুরুত্বের কথা না বললেও চলে।

অতি অল্প বয়স থেকেই জয়সিং গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন, এবং সম্ভবত জগন্নাথ পণ্ডিতের প্রভাব তীর উপর খুবই কার্যকরী ছিল। বাই হোক, অবিরাম অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নীতি ও নিয়মাদি আয়ত্ত করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচলিত সারণী ক্রটিপূর্ণ বলে তিনি স্বয়ং এই ক্রটি সংশোধন ও সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে তীর প্রতিষ্ঠিত দিল্লী মানমন্দিরে সাত বছর বাবং নক্ষত্র ও গ্রহাদি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ, রাজ্যশাসন আর সেই সময়কার বিস্মৃক ও অশান্ত আবহাওয়ায় কীভাবে তিনি এই সময় পেয়েছিলেন তাবলে অবাক হতে হয়!

প্রকৃত সত্যাহসকান ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তীর গৌড়ামি ছিল না, আর তিনি বিশেষ কোন গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় জ্ঞানীগুণীদের অহুসরণ ও তাঁদের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি গ্রহণে তীর বিন্দুমাত্র ঘিবা ছিল না। গ্রীক, ইউরোপীয় ও আরবী-ফার্সী বহু গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, এবং কিছু কিছু সংস্কৃত ও ফার্সী অনুবাদ করিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। তীর রাজসভায় ইউরোপীয় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ ছিল। ভারতের প্রধান প্রধান পাঁচটি শহরে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা তীর উজ্জল কীর্তি। জয়পুর, মথুরা, বারাণসী, উজ্জয়িনী ও দিল্লীতে যে-সব বৃহদাকার জ্যোতির্বিজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আছে, সেই প্রসঙ্গে টুড বলেন "monuments that irradiate a dark period of Indian History."*

॥ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান ॥

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও পরীক্ষালব্ধ গবেষণার মধ্যে শেষেরটির প্রতি জয় সিং-এর বিশেষ আগ্রহ ও অহুসরণ দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে তিনি কেবল পারদর্শিতাই দেখাননি,—এ-বিষয়ে তীর স্বভাবজাত প্রবণতা ছিল বলে মনে হয়। তিনি যে-সব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছিলেন, তাতে পূর্ব প্রচলিত যন্ত্রপাতির সংস্কার ও উন্নতিসাধন অবশ্যই আছে, কিন্তু কেবলমাত্র নকল

* Annals and Antiquities of Rajast'han—(Vol-II)—J. Tod.
Page-360.

করা বা অঙ্করণ করার প্রবৃত্তি ছাড়া মৌলিকতা বা প্রতিভার স্বাক্ষর কিছু নাই বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। একথা সত্য, তাঁর উপর ইসলামিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু ইসলামিক প্রভাব কেবলমাত্র জয় সিং-এর উপর কেন, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উপরেও দেখা যায়। ইস্তানবুল মানমন্দিরের আলোচনা এসঙ্গে ডঃ সৈয়দ হোসেন নাসির বলেন,—

“.....it is of great importance in that most likely it is to some extent on the basis of the Istanbul observatory as well as the earlier ones of Samerqund and Maraghah that the first major observatories of the West such as those of Brahe and Kepler were constructed and supplied with similar instruments.” * বস্তুতপক্ষে, মধ্যযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানিক গবেষণা ও বজ্রাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে মুসলমান পণ্ডিতদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। কম-বেশী ইউরোপ ও ভারত তাঁদের কৃতিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্ততম সমালোচক জি. আর. কো সাহেবের মন্তব্য পড়লে মনে হয় যেন তিনি জয় সিং-এর প্রতিভার মৌলিকতা আমল দিতে চান না। তিনি বলেন,—“The instruments themselves are evolved from the types used by the Muslims, and Jai Singh's inspiration was avowedly of Muslim origin.”** কো সাহেবের গ্রন্থটি পড়লে মনে হয় যেন জয় সিং-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানিক জ্ঞানগম্য সবই আরব, গ্রীক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাওয়া, আর ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন ঐতিহ্য নেই। তাঁর মতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা “derived the fundamentals of their astronomical science from the greeks.”*** ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে গ্রীক প্রভাব নেই, তা নয়। কিন্তু ঋগ্বেদ-বেদাঙ্গজ্যোতিষ-সূর্যসিদ্ধান্ত-আর্ঘভট-বরাহমিহির-ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্করের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রীকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সারকথা শিখেছিলেন বললে বোধ করি শিশুদেরও হাসি পাবে।

* Islamic Science—Seyyed Hossein Nasr, Page—114

** The Astronomical observations of Jai Singh—G. R. Kaye, Page—88

*** The Astronomical observations of Jai Singh—G. R. Kaye, Page—84

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যন্ত্রের ব্যবহার প্রাচীনকাল অর্থাৎ ঋগ্বেদের যুগ থেকেই দেখা যায়। ঋগ্বেদে অজিহ্নি তুরীয় যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। অথর্ববেদে শঙ্কু যন্ত্রের উল্লেখ আছে, বেদান্ত জ্যোতিষে ঘটীয়ন্ত্র ও শঙ্কু-র সাহায্যে সময় পরিমাপ হতো। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতে ব্রহ্মাদি বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা আছে। তুরীয়, ঘটীয়ন্ত্র, ফলযন্ত্র বা কশালযন্ত্র, শঙ্কু, চক্র, চাপ, বহু, ঘণ্টী, পীঠ, কর্ডরী, ফলকযন্ত্র, স্বরংবহুযন্ত্র এবং গোলযন্ত্র তাদের কয়েকটির নাম। আমাদের মনে হয়, চক্রযন্ত্র ও ফলকযন্ত্র খুব সম্ভব যন্ত্ররাজ বা অ্যাস্ট্রোলাব-এব (Astrolabe) পূর্বরূপ। এই সম্পর্কে S. N. Sen বলেন,—“Bhāskara II describes a versatile *Phalaka Yantra* which is essentially a circle or *Cakra* which possibly served the purpose of an astrolabe* এইসব উল্লেখ থেকে অন্তত এইটুকু বোকা যাচ্ছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্রহ্মপতি ব্যবহারের রীতি ও ঐতিহ্য ভারতে অতি প্রাচীন। সুতরাং, জয় সিং ব্রহ্মপতি নির্মাণের শুদ্ধ ‘*Inspiration*’ আয়বদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, রীতি ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হননি, এমন কি ভাস্কর কর্তৃকও প্রভাবিত হননি, —একথা মেনে নেওয়া কষ্টকর। জয়সিং-এর মানমন্দির সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ নালিরও স্বীকার করেছেন তাতে ‘*elements of Hindu astronomy*’ আছে। জয় সিং কর্তৃক বিশালকায় ব্রহ্মাদির নাম :

(1) সম্রাট যন্ত্র : ভারতের চারটি শহর দিল্লী, জয়পুর, বারাণসী ও উজ্জয়িনীতে এই যন্ত্র নির্মিত হয়।

(2) জয় প্রকাশ : দুইটি শহর জয়পুর ও দিল্লীতে নির্মিত হয়।

(3) রাম যন্ত্র : এটিও দুইটি শহর জয়পুর ও দিল্লীতে নির্মিত হয়।

(4) দিগংশযন্ত্র : তিনটি শহর বারাণসী, উজ্জয়িনী ও জয়পুরে স্থাপিত হয়।

(5) দক্ষিণোত্তি যন্ত্র : এটিও তিনটি শহর জয়পুর, বারাণসী ও উজ্জয়িনীতে আছে।

(6) লাড়িবলয় যন্ত্র : জয়পুর, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতে স্থাপিত হয়।

(7) বৃষ্টি বর্চাংশক : দিল্লী ও জয়পুরে নির্মিত হয়।


(8) মিশ্র যন্ত্র : কেবলমাত্র দিল্লীতে স্থাপিত হয়।

* A Concise History of Science in India—D. M. Bose, S. N. Sen, & B. V. Subbarayappa, Page—125

(৯) রাশি বলয় : কেবলমাত্র জয়পুরে স্থাপিত হয়।

(১০) কপাল : কেবলমাত্র জয়পুরে স্থাপিত হয়।

জয় সিং নির্মিত ও উদ্ভাবিত সব যন্ত্রাদির বর্ণনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র একটি যন্ত্র বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। বৃহদাকার যন্ত্রাদির মধ্যে সন্ডাট যন্ত্র শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি সম-সময় নির্দেশক সূর্যঘড়ি ('equal hour sundial')। ভারতের চারটি প্রধান শহর দিল্লী (1710-24), জয়পুর (1734), বারাণসী (1680-1737) ও উজ্জয়িনীতে (1728-34) নির্মিত হয়। এই যন্ত্রের আকার সব জায়গায় একই রকম হলেও, মাত্রাগুলি কিন্তু সমান নয় অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার পার্থক্য আছে। সবচেয়ে বড়টি জয়পুরে নির্মিত হয়, আর সবচেয়ে ছোটটি বারাণসীতে। জয়পুরে নির্মিত যন্ত্রটির উচ্চতা ৭৫ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং বারাণসীতে নির্মিত যন্ত্রটির উচ্চতা ১৬ ফুট ১১½ ইঞ্চি। যারা জয়পুত্রেরী তাঁরা প্রায় সবাই দিল্লী ও বারাণসীর মানমন্দিরে এই যন্ত্রটি দেখে থাকবেন। এমন কি, অনেকেই যে এই যন্ত্রের উচ্চ চূড়ার আবোহণ করেছেন, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল দেখলে এই যন্ত্রের গুরুত্ব বোঝা যায় না, উপযুক্ত 'গাইড' থাকলে সম্ভব। অথবা লামাস্ত পড়ানো করলে বোঝা যায়।* আমরা এখানে প্রথমে যন্ত্রটির একটি স্কেচ ও পর পৃষ্ঠায় জ্যামিতিক চিত্র দিয়েছি। দ্বিতীয় চিত্রটি অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে এর প্রধান প্রধান অংশের বিবরণ দেওয়া হলো :



চিত্র-28a

সন্ডাট যন্ত্র একটি নিরক্ষরস্থায়ী ঘড়িবিশেষ (equinoctial dial)। এর

* বিস্তারিত বিবরণ Kaye-এর *Astronomical observations of Jai Singh*, Page-33-58 হইতে।

সমকোণী শঙ্কুর অতিভুজ পৃথিবীর অক্ষের সমান্তরাল এবং শঙ্কুর উভয় দিকে বৃত্তের পাদ (Quadrant) আছে বা নিরক্ষীয় তলের সহিত সমান্তরাল। প্রত্যেক পাদের প্রান্ত ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেন্ডে অংশাঙ্কিত। কিন্তু জয় সিং-এর সময় ঘটি ও পল*-এ অংশাঙ্কিত ছিল। শঙ্কুর প্রত্যেক প্রান্তে ছুটি করে ট্যানজেন্ট স্কেল (tangent scale) আছে।



চিত্র—২৪b

দ্বিতীয় জ্যামিতিক চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শহরে নির্মিত সন্ধ্যাট যন্ত্রের মাত্রাগুলি নিম্নরূপ :

স্থান	উচ্চতা		স্থিতি	অতি-ভুজ	বাস্যার্ধ	পাদের প্রস্থ	কোণের আসন্ন মান
	AC'	AC'	BC	AB	GH = EF	GE	∠ABC
দিল্লী	60'4''	68'0''	113'6''	128'6''	49'6''	7'7½''	28°37'
জয়পুর	75'3''	89'9''	146'11''	174'0''	49'10''	9'3¾''	26°53'
বারাণসী	16'11½''	23'3¾''	35'10''	39'8½''	9'1¼''	5'10''	25°14'
উজ্জয়িনী	18'6''	22'0''	43'6''	47'6''	9'1''	—	25°10'

যন্ত্ররাজ বা অ্যাস্ট্রোলাব প্রকৃতপক্ষে মুসলমান জ্যোতির্বিদ্যা আবিষ্কার -

* 1 পল = 24 সেকেন্ড ; 1 ঘটি = 60 পল = 24 মিনিট

করেননি। আরবী ভাষায় এই যন্ত্রের অস্তিত্ব তৃতীয় থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে দেখা যায়। মাসাল্লাহের গ্রন্থের প্রভাবেই চমার *The Conclusions of the Astrolabe* লেখেন। আলী ইবন ঈশা, অলবিরুণী, নাসির অল-দীন অল-তুযা প্রমুখ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদরাও অ্যাস্ট্রোলাব সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করেন। বস্তুত মুসলমান জ্যোতির্বিদরাই এই যন্ত্রটির সৃষ্টি ও সৌন্দর্য আনেন বলে অনুমান করার কারণ আছে। জয় সিং এই যন্ত্র নির্মাণ করেন এবং তা আকারে বৃহৎ। খুব সম্ভব জয় সিং ভারতীয় ও ইসলামিক প্রভাবের সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্কর এই যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ সূরী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ণয় নয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে সময় পরিমাপ, পাহাড়ের উচ্চতা এবং কূপের গভীরতা পর্যন্ত নির্ণয় করা যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোন শাখায় উন্নতি তথা গবেষণা ও আবিষ্কার করতে গেলে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের গবেষণা ও আবিষ্কার সবক্ষে অবহিত হতে হয়। জয় সিং এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এটাই বোধ করি তাঁর আধুনিক বিজ্ঞান মানসিকতা ও বিজ্ঞান সচেতনতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর গৌড়ামি না থাকায় ইউক্লিড, হিপারকাস, টলেমী প্রমুখ গ্রীক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ এবং ইসলামিক জ্যোতির্বিদ নাসির অল-দীন অল-তুযা, উলুঘ বেগ, মৌলানা চাদ প্রভৃতির গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে টলেমীর অ্যালমাজেস্ট-এর অনুবাদ করেন এবং নাম দেন সজাট সিদ্ধান্ত। উলুঘ বেগের জীজ-এর সংশোধন করেন। প্রসঙ্গক্রমে ‘জীজ’ শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে একটি তথ্য পরিবেশন না করে পারা গেল না। ‘The word Zij entered into Arabic from Pahlvi and into Pahlvi from Sanskrit. It means originally ‘straight lines’ and is connected with the lines created on a field when the field is ploughed with the help of a cow or a bull.’ * যাই হোক, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে de la Hire, Flamsteed ও Napier-এর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর রাজসভায় জগন্নাথ পণ্ডিত, মুহম্মদ শরীফ, মুহম্মদ মুহদি, ফাদার আঞ্জো বেল, ফাদার রুদ বোভিয়ের, ডন পেড্রো ডি সিলভা প্রমুখ পণ্ডিতগণ সমাদৃত হতেন।

* Islamic Science—S. H. Nasr, Page—98

জয় সিং-এর কৃতিত্ব ও অবদানের কথা বলতে গেলে সেই সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁর সময় ছিল ভারতের ইতিহাসে অধঃপতন, অবক্ষয় ও অস্থিরতার যুগ। ঔৎকর্ষ্যের মৃত্যুর পর কিভাবে বিশাল মোঘল সাম্রাজ্য তাসের ধরের মত ভেঙে গেল, তা কারো অজানা নয়। এই যুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কোন মৌলিক গবেষণা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যা করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর সময়ে ইউরোপে আধুনিক বিশ্বের ধারণা গড়ে উঠছিল সত্য। তখন কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও ও নিউটনের তত্ত্ব ও তথ্যাদি ক্রমশ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদদের মনে সংক্রমিত হচ্ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন ইউরোপ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই দিক থেকেই এরূপ গবেষণার অল্পকূল ছিল, বিশেষত শাসনকর্তাদের আত্মকূল্য ছিল,—যদিও কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও তাঁদের মৌর্যকেন্দ্রিক পরিকল্পনার জন্ত নিগৃহীত হয়েছিলেন। 1743 খ্রিষ্টাব্দে জয় সিং-এর মৃত্যু হয়। টড-এর ভাষায় “his wives, concubines, and *Selons* expired with him on his funeral pyre”.* এতে অনেকে যজ্ঞ পেতে পারেন বটে, কিন্তু দিল্লী, অয়পুর, বারাণসী, উজ্জয়িনী ও মথুরার মানমন্দির এখনো বিরাজ করছে, তাঁর বিজ্ঞানকে জীবিত রেখেছে।

॥ তুল্য তিনখানি গ্রন্থ ॥

ভাস্করের পর ভারতীয় গণিতে আর নতুন কিছু হয়নি, কেবল চর্চিত-চর্ষণ হয়েছে মাত্র বললে ভুল হবে। আমাদের মৌভাগ্য যে, এমন তিনটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে বাদের গাণিতিক মূল্য অপরিমীম। এই গ্রন্থকে ‘সুক্ষিত্তাষা’, ‘করণ পদ্ধতি’ ও ‘সদরত্বমালা’-র নাম উল্লেখযোগ্য। চারখানি গ্রন্থ আবিষ্কারের জন্ত আমরা Charles M. Whish-এর নিকট ঋণী। উপরোক্ত তিনখানি ছাড়া অত্রটি ‘তন্ত্রসংগ্রহ’। এই গ্রন্থগুলিতে আধুনিক গণিতের এমন উচ্চতর গবেষণা লিপিবদ্ধ আছে যা আমাদের বিস্মিত করে এবং আমরা গর্বিত হই এই ভেবে যে, নিউটন-লিব্রিজ-গাউন্ডের গাণিতিক ধারণা এ-দেশের গণিতজ্ঞরা কয়েক শতাব্দী পূর্বে উপলব্ধি করে উচ্চতর গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু তবুও আমাদের মোহভঙ্গ হয়নি। আমাদের ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির প্রতি এখনো আমরা তেমন প্রত্যাশীল নই। এখনো আমরা আমাদের নিজস্ব ধারাটি হৃদয়ঙ্গম করে আধুনিকী-

* Annals and Antiquities of Rajasthan—(vol—II)—J. Tod, Page—368

করণ করতে অগ্রসর হইনি। অধ্যাপক সি. টি. রাজাগোপাল ও তাঁর ছাত্র-সহকর্মীদের ধন্যবাদ যে, তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এইসব ভারতীয় গণিতজ্ঞদের ফসল আধুনিক গাণিতিক ভাষায় আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে টি. এস. কৃষ্ণরশ্মী, টি. এ. সরস্বতী ও আর. সি. শুক্লের নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ যুক্তিভাষা বা গণিত গ্রন্থ সংগ্রহ বা গণিত যুক্তিভাষা ॥

এই অমূল্য গ্রন্থটির রচয়িতা হিসাবে জ্যেষ্ঠদেবকে ধরা হয়। জ্যেষ্ঠদেব 1500—1610 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ টি. এ. সরস্বতী যুক্তিভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন : “The chief merit of the yuktibhāṣā is that it preserves for us the rationales and proofs developed in the school, whereas the other schools either did not have them or did not preserve them.” যুক্তিভাষার নিম্নলিখিত উচ্চতর সূত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায় :—

$$(1) f(x+\theta) = f(x) + \theta f'(x) + \frac{\theta^2}{2!} f''(x) \dots$$

Taylor series নামে বিখ্যাত এই সূত্রটির আবিষ্কর্তা মাধব।

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\text{এবং } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

সাইন ও কোসাইন শ্রেণী-র সূত্র দুটি মাধবের ভাষায় নিম্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে :

নিহত্য চাপবর্গেণ চাপম্, তত্তৎফলানি চ।

হরেৎ সমূলযুগ্মগৈল্লিঙ্গ্যাবগ'হৈতঃ ক্রমাৎ ॥

চাপম্, ফলানি চাধোবোধ্যস্তোপস্থ'পরি ত্যজেৎ।

জীবাংশ্চ, সংগ্রহো 'ন্যৈব বিদ্বান-ইত্যাদিনা কৃতঃ ॥

নিহত্য চাপবর্গেণ রূপম্, তত্তৎফলানি চ।

হরেদ্, বিমূলযুগ্মগৈল্লিঙ্গ্যাবগ'হৈতঃ ক্রমাৎ ॥

কিন্তু ব্যাসদলে নৈব দ্বিল্লেনান্তম্ বিভাজ্যতাম্ ।

ফলান্তবোধঃ ক্রমশো ত্যাসোপমুপরি ত্যজ্যেৎ ॥

শরাষ্ট্ঠ, সংগ্রহো 'শ্যেব স্তেনস্তী-ত্যাদিনা কৃতঃ ।

মাধবের সূত্র অবলম্বন করে অনেকেই আধুনিক গাণিতিক পরিভাষায় সাইন ও কোসাইন শ্রেণীর রূপ দিয়েছেন। 'গণিত জগৎ' পত্রিকায় ডঃ অম্ব্যাকুমার বাগের একটি প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। অবশ্য ডঃ বাগের মূল প্রবন্ধটি *Indian Journal of History of Science* (May, 1976, vol-11)-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এখানে ডঃ বাগের প্রবন্ধটি 'গণিত জগৎ' থেকে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে উদ্ধৃত করলাম।

কৃত্র চাপ s এবং ব্যাসার্ধ r -এর জন্ত যদি n -তম জীবা ও শর-কে t_n এবং t_n^1 দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তা হলে—

$$t_n = \frac{S^{2n} s}{(2^2 + 2)(4^2 + 4)(6^2 + 6) \dots [(2n)^2 + 2n] r^{2n}} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore t_1 = \frac{s^3}{3! r^2}, t_2 = \frac{s^5}{5! r^4}, \dots$$

তা হলে মাধব কর্তৃক বিবৃত নিম্নমাত্রাব্যাপী,—

$$\text{জীবা} = (s - t_1) + (t_1 - t_2) + (t_2 - t_3) + \dots$$

$$= s - \frac{s^3}{3! r^2} + \frac{s^5}{5! r^4} \dots \dots (1)$$

এবং

$$t_n^1 = \frac{S^{2n} r}{(2^2 - 2)(4^2 - 4) \dots [(2n)^2 - 2n] r^{2n}} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\therefore t_1^1 = \frac{s^3}{2! r}, t_2^1 = \frac{s^4}{4! r^3}, \dots$$

$$\therefore \text{শর} = (r - t_1^1) + (t_1^1 - t_2^1) + \dots$$

$$= r - \frac{s^3}{2! r} + \frac{s^4}{4! r^3} \dots \dots (2)$$

(1) ও (2)-এ $s=rx$ বসালে, আমরা নিউটন আবিষ্কৃত শ্রেণী দুটি পাই,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

এবং

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

নিউটন কর্তৃক আবিষ্কৃত উপবাক্ত সূত্র দুটির আবিষ্কারকও সঙ্কমগ্রামের মাধব। ইনি খুব সম্ভব 1340—1425 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। মাধব গ্রেগরী-লিবনিজের এই সূত্রটিও আবিষ্কার করেন :

$$\text{চাপ } \tan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots (|x| \leq 1)$$

লিবনিজ π এর নিম্নরূপ মান দিয়েছেন :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$$

পাই (π)-এর অল্পরূপ মানটিও মাধব কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং যুক্তিভাষ্য গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। ক্রিয়াকর্মকরী গ্রন্থে এই উদ্ধৃতি দেখা যায় :

ব্যাসে বারিষে-নিহতে রূপক্বে ব্যাস সাগরাভিহতে

ত্রি-বরাদি-বিষমসংখ্যা-ভক্তম্ স্বয়ম্ স্বয়ম্ পৃথক ক্রমাৎ কুর্মাৎ ।

অর্থাৎ ব্যাসকে 4 দ্বারা গুণ কর। তা থেকে পরপর ব্যাসের চতুর্গুণের অযুগ্ম সংখ্যা (3, 5 ইত্যাদি) দ্বারা ভাজিত ভাগফলগুলি যথাক্রমে বিয়োগ ও যোগ কর।

যদি কোন বৃত্তের পরিধি C হয়, এবং ব্যাস D হয়, তা হলে,

$$C (i. e. \pi D) = 4D - \frac{4D}{3} + \frac{4D}{5} - \dots$$

$$\text{বা, } \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$$

॥ করণ পদ্ধতি ॥

এই গ্রন্থটির রচয়িতা এক অজ্ঞাত সোমস্বামী। তিনি খুব সম্ভব ত্রিচূরের অন্তর্গত লিবপুরের পুতুমান বা পুত্বান পরিবারভুক্ত ছিলেন। গ্রন্থটি দশটি

অধ্যায়ে বিভক্ত। সম্ভবত এটি 1732 খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ‘করণ-পদ্ধতি’ পুতুমান সোমরাজির সর্বাধিকা জনপ্রিয় গ্রন্থ হলেও তিনি অত্যন্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ববর্তী গণিতজ্ঞদের আবিষ্কৃত সূত্র ও পদ্ধতির আলোচনার জগ্ন

যুক্তিভাষার দ্বারা এরও গুরুত্ব আছে। করণ পদ্ধতিতে $n = \frac{31, 415, 926. 536}{10, 000, 000, 000}$ ।

এই গ্রন্থে কেমন করে ক্রমিক বিভাজনের সাহায্যে n -এর আসন্ন মান পাওয়া যায় তার আলোচনা আছে। n -এর মানগুলি হবে—

$$\begin{array}{r} 3 \\ 1' \end{array} \frac{22}{7'} \frac{333}{106'} \frac{355}{113'} \frac{67783}{21576'} \frac{68138}{21689'} \text{ প্রভৃতি}$$

॥ সদরভূমালা ॥

রাজকুমার শঙ্কর বর্মণ এই গ্রন্থটির রচয়িতা। তিনি 1800—1838 খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থটি ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সর্বশেষ স্লোক থেকে জানা যায় এটি 1823 খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। বিখ্যাত ‘পরহিত’ পদ্ধতি উদ্ভাবনের কারণটিও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শুধু তাই নয়, তারিখটির জগ্নও আমরা এই গ্রন্থটির নিকট পাই।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের প্রায় সব ঐতিহাসিকই একরূপ মত পোষণ করেন যে, ভাস্কর্যের পর অর্থাৎ 1150 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে গণিতচর্চা হয়নি বরুলেই চলে। কথাটি সর্বাংশে সত্য না হলেও ঐতিহাসিকদের এই দৃষ্টান্তে বিশেষ দোষারোপ করা যায় না। কারণ, ঐতিহাসিকরা সাধারণত প্রাপ্ত গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেই সবকিছু বিচার করেন। মধ্যযুগে হিন্দু দক্ষিণভারতে যে-সব গাণিতিক গবেষণা হয়েছিল, তা প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়, আর অংশত আঞ্চলিক ভাষায়। আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেকেই সংস্কৃত জানেন না, আর আঞ্চলিক ভাষায় কোন-কিছু লেখা বা পড়া তো অনেকের মতে পণ্ড্রম মাত্র। এ-হেন পরিস্থিতিতে মধ্যযুগের ভারতীয় গণিতের অনেক-কিছু অনালোকিত ও অনালোচিত অবস্থায় পড়ে আছে। এইসব মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও রচনাগুলি পরিশ্রম করে সম্পাদনা, অঙ্কবাদ ও আধুনিক গণিতের ভাষায় রূপ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, এতে সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের এক গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সংস্কৃত ও গণিত বিভাগের একান্ত সহযোগিতায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে।

সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা তাঁরা যেন শুধুমাত্র অঙ্কর, বেদান্ত বা কাব্য-সাহিত্যের গবেষণায় নিজেদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ না করে প্রাচীন ভারতীয় গণিতের অবহেলিত ও উপেক্ষিত দিকটির প্রতি যথাযথ নজর দেন, সাহিত্য-বিজ্ঞান সব শ্রেণীর মানুষের জিজ্ঞাসা মেটাবার প্রয়াস পান।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের অনেক মূল্যবান সম্পদ এখনো লোকসমূহের অন্তর্ভুক্ত আছে। এ-বিষয়ে পণ্ডিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের যেমন সে-সব অনুবাদ, আধুনিক গণিতের ভাষায় প্রকাশ ও সম্পাদনার দায়িত্ব আছে, তেমনি আবার শিক্ষিত জনসাধারণ যাদের বাল্য-তোরঙ্গ-সিন্দুক ও বাঁজে কাগজের বস্তুর মধ্যে এখনো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বন্দী হয়ে আছে এবং যা অবলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী, তাঁরা যদি উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে প্রকাশে সাহায্য করেন, তা হলে আমাদের জাতির গৌরব বৃদ্ধি পায়। কেবলার গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে নিয়ে ডঃ কে. ভি. শর্মা লিখেছেন,—‘A Competent and critical analysis, in terms of modern mathematics, of the writings of Kerala astronomers and mathematicians, written in Malayalam script, may be expected to throw light on the advances, down the centuries, made in these disciplines, in one remote corner of India.’ ডঃ শর্মার এই উক্তি কেবল কেবলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ভারতের সর্বত্র যেখানে যা এখনো অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তা প্রকাশ পেলে আমাদের গৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষ করে, সোয়াই জরু সিং-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও গণিতে প্রেরণার উৎস, তাঁর গবেষণার বিস্তারিত তথ্যাদি এবং জগন্নাথ পণ্ডিতের কর্মকৃতি ইত্যাদির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

“It is India that gave us the ingenious method of expressing all numbers by means of symbols, each symbol receiving a value of position, as well as an absolute value; a profound and important idea which appears so simple to us now that we ignore its true merit...”—L. Hogben

॥ দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতি ॥

স্থানিক-মান আবিষ্কার সংখ্যা লিখনে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মাত্র দশটি অঙ্ক,—এক থেকে নয় এবং শূন্য দ্বারা সংখ্যা-লিখন-প্রণালী মানব-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে নিঃসন্দেহে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনি সরল। যাবতীয় সংখ্যা-লিখন অঙ্কের স্থানিক-মান দ্বারা সম্ভব। এই পদ্ধতি বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত। আজ আমরা যে পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখি, বিশ্বের তাৎশূন্য শিশুরা আজ যে পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন শিখা করে, তা আমাদের প্রাচীন গণিতজ্ঞদের আবিষ্কার। প্রাচীনকালে বিশ্বের নানা স্থানে যে সংখ্যা-লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল, আজ আর সে-সব কথা কেউ জানে না; গণিতের ইতিহাসে কেবল তারা অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে মাত্র।

আঞ্চলিক ভাষা ও লিপি উদ্ভবের ফলে আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যা-লিখনের নানা প্রকার লিপি দেখতে পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীতেও লিপি পার্থক্য ছিল। এ-বিষয়ে অলবিরুণী লিখেছেন, “As in different parts of India, the letters have different shapes, the numerical signs, too, which are called anka, differ.” লিপি-পার্থক্য স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে। কিন্তু গণিতের মূল নীতি বদলায় নি। সংখ্যা-লিখনে দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়নি ভারতে।

দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে স্থানিক-মান দ্বারা সংখ্যা-লিখনের প্রচলন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দীর শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। 346 সনৎ অর্থাৎ 595 শতাব্দীর গুর্জর দানপত্রে, 646 খ্রীষ্টাব্দের বেলহাবি শিলালিপি, 972

শতাব্দীর অমোঘবর্ষের দানপত্রে এই বীতির প্রচলন প্রমাণ করে। ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই পদ্ধতির প্রচলন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। নীচের চিত্রে তার নমুনা দেখানো হলো :

থেমের শিলালিপি-অম্বোর	কোটা কাপুর্ শিলালিপি- (বহ্মা)	সিওনগর শিলালিপি-চম্পা
৫০৫	৩০৮	২৩৫
605 শকাব্দ	608 শকাব্দ	735 শকাব্দ

চিত্র—29

উপরের চিত্র থেকে জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের বাইরে বিন্দু (°) ও বৃত্তাকার শূন্য (0) সমেত দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে স্থানিক-মান দ্বারা সংখ্যা-লিখন প্রচলিত ছিল। খ্রীবিজয়, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া, জাভা (অর্থাৎ বর্তমান ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইত্যাদি) প্রভৃতি দেশে এই পদ্ধতির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

আজ আর আমাদের জানার কোন উপাদান বা সাক্ষ্য নাই কে বা কারা এই বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছিলেন। কোন এক প্রতিভাধর ঋষি? বা দেশের কোন গণিত-সমিতি? সঠিক উত্তর আমাদের জানা নাই। কিন্তু অজ্ঞাবোধি যে-সব উপাদান ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের নিরিখে বলা যায়, ভারতে এই পদ্ধতি অন্ততপক্ষে প্রথম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এ-সব অসুমান। তবুও ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সংখ্যা-নামগুলি বিচার করলে মনে হয় ভারতে দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন ও স্থানিক-মানের ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল।

দশটি অঙ্ক দিয়ে সংখ্যা-লিখন মহাকাব্য-পুরাণ ইত্যাদি প্রায় সব গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে মহাভারত, পিঙ্গলের ছন্দসূত্র, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও জৈন আগমশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। দশগুণোত্তর সংখ্যা-লিখন প্রণালীর গুরুত্ব ভারতীয়রা বেশ ভালভাবেই বুঝতেন। বায়ুপুরাণে একে ব্রহ্মার আবিষ্কার বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

এষা সংখ্যাকৃতা সংখ্যা দৈবরেন স্বয়ম্ভুবা।

গণনা বিনিহ্নতৈষা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ যামুখী ॥

মহাভারতেও এই পদ্ধতির অসংখ্য পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। এমন কি,—

আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের অতি দ্রুত গণনার ইতিহাসের পরিচয়ও নল ও ঋতুপর্ণ রাজার এক কাহিনী থেকে জানতে পারা যায়। এ-বিষয়ে লেখকের “গণিতের ললিত পাঠে” সামান্য আলোচনা আছে। যাই হোক,—পাণ্ডবদের বনবাসকালে দুর্ধোধন প্রভৃতির গরু দেখার ছল করে পাণ্ডবদের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্ত গিয়েছিলেন। তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে বেদব্যাস এই কথা লিখলেন,—

দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোহৰ সহস্রশঃ ।

অষ্টৈর্লকৈশ্চ তাঃ সৰ্বাঃ লক্ষ্যামাস পাণ্ডবঃ ॥

অঙ্কয়ামাস বৎসান্শ্চ জজ্ঞে গোপসূতাস্বপি ।

বালবৎসান্শ্চ য়া গাবঃ কা (১ ক) লয়ামাস তা অপি ।

অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্ ।

বুভো গোপালকৈঃ প্রীতো বাহরং কুরুনন্দন ॥

অনুবাদ : “তখন তিনি শতে শতে ও হাজারে হাজারে গরু দেখিলেন। অঙ্ক (কষ্টক্কে :) এবং চিহ্ন (লক্কে :) দ্বারা রাজা সেই সকলের পরিচয় জানিলেন। অনন্তর নূতন বৎসসমূহকে অঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে দমনাই ও বালবৎসসমূহকে পৃথকভাবে গণনা করিলেন। তিন বৎসর বয়স্ক গোসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। এইরূপে স্মরণ করিয়া কুরুনন্দন গোপালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।”

শুরুজবুর্বেদেও এমনি সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সামান্য একটু উদ্ধৃতি ও অনুবাদ দেওয়া যাক :

“বসবজ্যৈদশাক্ষরেণ ত্রয়োদশং স্তোমমুদজয়ন্তমুজ্জেষথং রুদ্রাশ্চতুর্দশাক্ষরেণ চতুর্দশং স্তোমমুদজয়ন্তমুজ্জেষমাদিত্যাঃ পঞ্চদশাক্ষরেণ পঞ্চদশং স্তোমমুদজয়ন্তমুজ্জেষমাদিতিঃ ষোড়শাক্ষরেণ ষোড়শং স্তোমমুদজয়ন্তমুজ্জেষং প্রজাপতিঃ সপ্তদশাক্ষরেণ সপ্তদশং স্তোমমুদজয়ন্তমুজ্জেষং ।”

অনুবাদ : “বসুগণ ত্রয়োদশ অক্ষর ছন্দে ত্রয়োদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে স্তোম জয় করব। রুদ্রদেবগণ চতুর্দশ অক্ষর ছন্দে চতুর্দশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করব। আদিত্য দেবগণ পঞ্চদশ অক্ষর ছন্দে পঞ্চদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও তা জয় করব। প্রজাপতি সপ্তদশ অক্ষর ছন্দে সপ্তদশ স্তোম জয় করেছেন, আমিও সে ছন্দে স্তোম জয় করব।” [বিজন বিহারী গোস্বামী]

মহাকবি কালিদাসের “কুমারসম্ভবম্”-এ শতকিয়া গণনার একটি চিত্র দেখতে

পাওয়া যায়। যদিও এখানে দশগুণোত্তর পদ্ধতির কোন ইঙ্গিত নাই, তবুও এই সাবলীল গণনার মধ্যে দশগুণোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য যদি মহেশ্বর-নন্দন কার্তিকের নিতান্ত শিশু না হতেন, তা হলে হয়তো মহাকবি দশগুণোত্তর পদ্ধতির ক্রমটি অনুসরণ করতেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি উদ্ধৃত হলো :

একো নব দ্বৌ দশ পঞ্চ সপ্তেত্যজীপগন্নাস্বয়ং প্রসার্য।

মহেশ কঠোরগজদন্তপঙ্ক্তিঃ তদঙ্কগঃ শৈশবমৌখ্যমৈশিঃ ॥

অনুবাদ : “মহেশ্বরনন্দন কখনো পিতার ক্রোড়ে গিয়া বালস্বলভ সৌন্দর্য বিস্তার করিতে করিতে তদীয় কর্ণস্থিত ভূজঙ্গগণের দশনপঙ্ক্তি এক, ময়, দুই, দশ, পাঁচ, সাত এইরূপ গণনা করিতেন।”

হায় মহাকবি, আপনি যদি কার্তিককে সাপের দাঁত গুণতে না দিয়ে পিতার ক্রোড়ের মালা গুণতে দিতেন ! তা হলে হয়তো দশগুণোত্তর পদ্ধতি প্রচলন সময়ের একটা নির্দিষ্ট ও প্রামাণ্য সাল-তারিখ আমরা পেয়ে যেতাম। কিন্তু “পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ-সাল”। তা-ই হচ্ছিল বহুকাল। যাই হোক, আজ আমাদের যে-কোন সংখ্যা-লিখনে কোন অসুবিধা হয় না। অতি সহজ ও সরল এই পদ্ধতিটির গুরুত্বও আজ আর অস্বীকৃত হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ লাপলাস এ-প্রদক্ষে বলেন : “The idea of expressing all quantities by nine figures (digits) whereby is imparted to them both an absolute value and one by position is so simple that this very simplicity is the reason for our not being sufficiently aware how much admiration it deserves.”

॥ সংখ্যা শব্দ পদ্ধতি ॥

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে ভারতে এক প্রকার সংখ্যা লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এতেও দশগুণোত্তর স্থানিক মান পদ্ধতির প্রয়োগ আছে। কিন্তু ওই রীতিতে অঙ্কে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় না; বস্তু, প্রাণীর নাম বা ধারণা-বিশেষ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। যেমন, ‘চন্দ্র’, ‘পৃথিবী’, দ্বারা ১, ‘ক্ষেত্র’ দ্বারা ২, আবার শূন্য (০) বোঝাবার জন্য ‘আকাশ’, ‘সম্পূর্ণ’ ব্যবহৃত হতো। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চন্দ্রশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই রীতির

প্রচলন দেখা যায়। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থাদি ছন্দে লিখিত হতো বলে এই পদ্ধতিতে বড় বড় সংখ্যা-লিখনের বেশ সুবিধা ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিরা জন্মতারিখ ও রচনাকাল বোঝাবার জন্য এই পদ্ধতি অল্পসংখ্যক করেছেন।

সংখ্যা প্রকাশে বিভিন্ন শব্দের মাত্র কয়েকটি প্রদত্ত হলো :

- 0= শূন্য, খ, গগন, অম্বর, আকাশ, অত্র, বোম, অনন্ত, পূর্ণ ইত্যাদি।
- 1= প্রাদি, শশী, ইন্দ্ৰ, বিন্দু, চন্দ্র, কলা, ধরা, সোম, শশাঙ্ক ইত্যাদি।
- 2= যম, যমল, অরিন, দর্শ, লোচন, নেত্র, অক্ষি, দৃষ্টি, চক্ষু, নয়ন, বাহু, কর, কর্ণ, কুচ, গুষ্ঠ, জাতি, যুগল, কুটুম্ব ইত্যাদি।
- 3= রাম, গুণ, ত্রিগুণ, লোক, ত্রিভুগৎ, ভুবন, কাল, ত্রিকাল, হরনেত্র, অগ্নি, অনল, বৈখানর, তপন, কুশাস্ত্র, বস্ত্র ইত্যাদি।
- 4= বেদ, প্রতি, সমুদ্র, সাগর, জলধি, কেন্দ্র, বর্গ, আশ্রম, যুগ, বন্ধু, গতি ইত্যাদি।
- 5= বাণ, শর, শাস্ত্র, সায়ক, ভূত, পর্ব, পাণ্ডব, তত্ত্ব, ভাব, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি।
- 6= রস, অঙ্গ, কায়, রাগ, ঋতু, অরি, দর্শন, কারক, কুমারবদন, লেখ ইত্যাদি।
- 7= পর্বত, সলিল, অচল, অজ্রি, নগ, গিরি, ঋষি, মুনি, অত্রি, স্বর, ধাতু, অশ্ব, কলত্র, দ্বীপ, মাতৃকা ইত্যাদি।
- 8= বহু, নাগ, অহি, গজ, দন্তি, অল্পষ্টুণ, মর্প, মঙ্গল ইত্যাদি।
- 9= অক্ষ, নল, গ্রহ, ছিত্র, নিধি, দ্বার, কেশব, দুর্গা, পদার্থ ইত্যাদি।
- 10= দিশ, দিক, দিশা, আশা, অঙ্গুলি, ককুভ, রাবণশির, অবতার ইত্যাদি।

এই পদ্ধতি ব্যবহারের ইতিহাস খুব প্রাচীন। সংহিতা, উপনিষদ, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ, শ্রোত সূত্র প্রভৃতিতে এই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পৌলিশ-সিদ্ধান্তের একটি উদ্ধৃতিতে এক বৃহৎ সংখ্যা নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে :

খ-খ-অষ্ট-মুনি-রাম-অশ্বি-নেত্র-অষ্ট-শর-রাত্রিপাঃ=1582237800

এখানে, খ=0 অষ্ট=8, মুনি=7, রাম=3, অশ্বি=2, নেত্র=2, শর=5 এবং রাত্রিপাঃ=1

[অল্পরূপে, নগ-শিলীমুখ-বাণ-ভূজদম বন্ধি-রসেশু-গজাশ্বিন

=2856338557]

ডান এবং বাম উভয় দিক থেকেই লিখন পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে ডান দিক থেকে বাম দিকে সংখ্যা-লিখনই সর্বসম্মত পদ্ধতিরূপে স্বীকৃত হয়। খুব সম্ভব দশগুণোত্তর স্থানিক মান পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই এ রকম হয়। আর এর ফলে অঙ্কনাম বামভো গতি-র উদ্ভব।

॥ সংখ্যা বর্ণ পদ্ধতি ॥

সংস্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের ইতিহাস প্রাচীন। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে এর ব্যবহার দেখা না গেলেও সপ্তম শতাব্দীতে এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন দেখা যায়। ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ আর্যভট এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক রূপদান করেন।

সংখ্যা-শব্দ পদ্ধতি অতি প্রাচীন। এই পদ্ধতির নানান অস্থবিধা থেকেই অল্পরূপ একটি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বাবী হয়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক রচনা এবং তার শ্রদ্ধাসমূহের সৌষ্ঠব সংক্ষিপ্ততার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। পুরাতন সংখ্যা-শব্দ পদ্ধতিতে এই সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখা যেত না। ছন্দে লিখিত বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক গ্রন্থে সংখ্যা প্রকাশের জন্য অনেক সময় একাধিক শ্লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ত। সংখ্যা-বর্ণ আবিষ্কার এই অস্থবিধা দূরীকরণে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু এই পদ্ধতির অল্প অস্থবিধাও আছে। যা হোক, এই পদ্ধতির অল্পরূপ পদ্ধতি গ্রীস ও আরবেও প্রচলিত ছিল। গ্রীকরা $\alpha=1$, $\beta=2$, $\Gamma=3$, $\Delta=4$ ইত্যাদি মনে করত। কিন্তু গ্রীক ও আরবদের মত ভারতে এই পদ্ধতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না; গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

আর্যভট তাঁর আর্যভটীয় গ্রন্থের ‘দশগুণিতিকা’ অধ্যায়ে সংখ্যা-বর্ণ ব্যবহারের সূত্র দিয়েছেন :

বর্গাকরাণি বর্গেহবর্গেহবর্গাকরাণি কাং যো যঃ ।

অর্ধিনবকে স্রা নব বর্গেহবর্গে নবাস্ত্যবর্গে বা ॥

“অর্থাৎ ক থেকে বর্গাকরবর্গ (স্থান), (য থেকে) অবর্গাকর অবর্গ (স্থানে বসবে যাতে) ঙ্ ও ম মিলে য (হয়)। নয়টি বর্গ ও নয়টি অবর্গ (মিলে) শূন্যোপলব্ধি আঠারটি স্থানে স্রবর্ণ থাকবে। পরের স্থানগুলি এই প্রকার।”

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আর্যভটের ক্ষুদ্র গ্রন্থটি মোটেই সহজ নয়। এমন

কি অনেক পণ্ডিতও এই গ্রন্থের সব শ্লোকের সম্যক অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে পারেন না। উপরের শ্লোকটি তেমন একটি দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে। তাই,—
জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আর্থভট আবিষ্কৃত সংখ্যা-বর্ণ পদ্ধতির সামান্য আলোচনা করা যাক।

এই পদ্ধতিতে ‘ক’ থেকে ‘ম’ পর্যন্ত স্পর্শবর্ণগুলির মান যথাক্রমে 1 থেকে 25 পর্যন্ত ধরা হয়। আর ‘য’ থেকে ‘হ’ পর্যন্ত অবর্গীয় বর্ণগুলির মান যথাক্রমে 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ও 100 ধরা হয়। স্বরবর্ণগুলি 10-এর ঘাতে প্রকাশিত হয়। ‘য’ থেকে ‘হ’ পর্যন্ত অবর্গ-স্থানগুলি ‘অ’ থেকে ‘ঐ’ পর্যন্ত নয়টি স্বরবর্ণ দ্বারা নিরূপিত হয়।

আর্থভটের মতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরবর্ণে কোন প্রভেদ থাকবে না। “অসম্পৃক্ত স্বরবর্ণের সংখ্যা খ্যাপনের অধিকার নেই। এরা শুধু অঙ্কস্থান এবং বর্গ ও অবর্গ-স্থান নির্দেশের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।” (প্রা. ভা. গ. চ.)

এবার এর একটি তালিকা দেওয়া যাক :

ঐ	ও	ঐ	এ	২	ঋ	উ	ই	অ
অ।ব	অ।ব	অ।ব	অ।ব	অ।ব	অ।ব	অ।ব	অ।ব	অ।ব

উপরে অ=অবর্গ-স্থান, ব=বর্গ-স্থান। মোট আঠারো স্থান, নয়টি বর্গ-স্থান ও নয়টি অবর্গ-স্থানে ভাগ করা হয়েছে। অমুখ্য-স্থানে ‘ক’ থেকে ‘ম’ পর্যন্ত বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয় এবং ‘য’ থেকে ‘হ’ পর্যন্ত অবর্গ বর্ণগুলি অবর্গ-স্থানে ব্যবহৃত হয়। প্রথম ‘বর্গ-অবর্গ’ জোড় দ্বারা প্রথম বর্গ ও অবর্গ স্থান দুটি গঠিত হয়েছে। অঙ্করূপভাবে অত্যাশ্চর্য স্থানগুলি গঠিত হয়েছে। প্রথম জোড়ের একক-দশক স্থান অ-দ্বারা, দ্বিতীয় জোড়ের শতক-সহস্র স্থান ই-দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। এইভাবে অত্যাশ্চর্য জোড়গুলিও অপর স্বরবর্ণের দ্বারা নিরূপিত হয়। লক্ষগীয়, স্থান-নির্দেশ ছাড়া স্বরবর্ণগুলির নিজস্ব কোন মান নাই। কোন সংখ্যা-বর্ণে স্বরবর্ণ সংযুক্তির তাৎপর্য হচ্ছে দশগুণোত্তর পদ্ধতি অনুসারে সে-বর্ণের স্থান নিরূপণ করা। দু-একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি আর একটু পরিষ্কার করা যাক :

‘হ্র’ বর্ণটি বিশ্লেষণ করলে (হ্র+ঋ) পাওয়া যায়। আচাৰ্য আর্থভটের সংখ্যা-বর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করলে বলা যায়, এখানে হ্র-এর মান 4 এবং ঋ স্বরবর্ণ দ্বারা নিরূপিত-স্থান সূচিত হচ্ছে।

$$\text{হ্রতরাং হ্র}=4 \times 10^4$$

$$\text{অঙ্করূপে হ্র্যহ্র}=2 \times 10^4 + 3 \times 10^5 + 4 \times 10^6 = 4,320,000$$

$$\text{কারণ, খায়া} = \text{খ} + \text{উ} + \text{ঘ} + \text{উ} + \text{ঘ} + \text{ঝ} = 2 \times 10^4 + 3 \times 10^5 + 4 \times 10^6$$

[এখানে $\text{খ}=2$, $\text{উ}=10000$, $\text{ঘ}=3$, $\text{উ}=100000$, $\text{ঘ}=4$, এবং $\text{ঝ}=1000000$]

বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করাই এই পদ্ধতির অগ্রতম বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা। কিন্তু একটি অসুবিধার জন্ম এই পদ্ধতি কখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। বাপ রে—বাপ! কার সাধ্য সংখ্যা প্রকাশের জন্ম যে অর্থহীন শব্দ গঠিত হয় তার উচ্চারণ করে!!! দৈত্য-দানব-রাক্ষসাদির দস্তপণ্ডিত্তিও এরকম কোন কোন শব্দ উচ্চারণকালে রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ। যেমন, এই শব্দটি,—*cha ya gi yi ngu shu chchlr*—চ য় গি য়ি ঙ্গ শু ছল্‌।

॥ কটপয়ুধি পদ্ধতি ॥

এটিও সংখ্যা-লিখনের আর একটি সাক্ষেতিক পদ্ধতি। খুব সম্ভব আৰ্ঘভট এই পদ্ধতি জানতেন। দক্ষিণ ভারতে এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন দেখা যায়। কিংবদন্তী অনুযায়ী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম বরকুচি এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। তাঁর ‘চন্দ্র-বাক্য’ বা ‘বরকুচি-বাক্য’ এই পদ্ধতিতে রচিত। পরহিত পদ্ধতির আবিষ্কারক হরিদত্ত তাঁর ‘গ্রহচার নিবন্ধ’ গ্রন্থে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। প্রথম ভাস্কর ‘লঘুভাস্করীয়’-তে এর সার্থক প্রয়োগও দেখিয়েছেন। আৰ্ঘভটের পদ্ধতির মত এটিও ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। সামান্য পরিবর্তনসহ এই পদ্ধতির কমপক্ষে চারটি প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান লেখকের গণিতের কথা ও কাহিনীতে, ও গণিতের ললিত পাঠে দুটি রূপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণ ও পঞ্চমবর্ণ দ্বারা বথাক্রমে 1 থেকে 9 এবং 0 (শূন্য) সূচিত করা হয়। এই পদ্ধতিতেও স্বরবর্ণের কোন মান নাই এবং তার খুণী মত ব্যবহার চলতে পারে; যুক্তাক্ষরের মানটি গৃহীত হয়।

আৰ্ঘভটীয় পদ্ধতির সঙ্গে এর একটি বিশেষ পার্থক্য যে, এখানে অর্থহীন শব্দের পরিবর্তে অর্থবহ শব্দ গঠিত হয়। এখানেও ডান দিক থেকে লেখার রীতি ছিল। যেমন,—

$$\text{ভবতি} = \text{ভ-ব-তি} = 446 = 644,$$

$$\text{এখানে, ভ}=4, \text{ব}=4 \text{ এবং } \text{ত}=6$$

তত্বলোকে = $6431 = 1346$ “অঙ্ক নাম্‌ বাম ভো গতি”-র অনুসরণ এখানেও দেখা যায়।

॥ শূন্য—০ ॥

শূন্য আবিষ্কার বিশ্বগণিতের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সামান্য এই একটি চিহ্ন গণিতের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে কি অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব তখনই যখন আমরা শূন্য আবিষ্কার-পূর্ব গণিতের অবস্থাটি স্বরণ করি। আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে অসামান্য এই আবিষ্কার ভারতেই হয়েছিল, এবং ভারতীয় গণিতজ্ঞ ও দার্শনিকরা এ-বিষয়ে সমান ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক হলন্ডেডের মন্তবাটি স্বরণ করা যেতে পারে : “The importance of the creation of the Zeromark can never be exaggerated. This giving to airy nothing, not merely a local habitation and a name, a picture, a symbol, but helpful power, is the characteristic of the Hindu race whence it sprang. It is like coining the Nirvāna into dynamos. No single mathematical creation has been more potent for the general on-go of intelligence and power.” [মোটো হবফ লেখকের]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পিজলের ছন্দস্বত্রে শূন্য ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে পিজল বিয়োগ অর্থে শূন্য ব্যবহার করেছেন, হয়তো সে-সময় শূন্য সংখ্যা-রূপে পরিগণিত হয়নি। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ভারতীয়রা সেই প্রাচীন কাল থেকে শূন্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

বকশালী পাণ্ডুলিপির উদাহরণের মধ্যে শূন্যের ব্যবহার দেখা যায়; পৌলিশের সিদ্ধান্তে শূন্য ব্যবহার আছে। পৌলিশ সিদ্ধান্তে শূন্যকে সংখ্যা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর জিনভড্রগনি বিশাল সংখ্যার (224, 400, 000 000) উল্লেখ করে বলেছেন ‘বাইশ, চুয়াল্লিশ এবং আটটি শূন্য’ এবং 3,200,400,000 000-এই সংখ্যার ক্ষেত্রে “বত্রিশ, দুটি শূন্য, চার, আটটি শূন্য” বলায় এই সিদ্ধান্ত করা যায় ওই সময় শূন্য অর্থে ‘কিছু-না’ বোঝাতেন। অপরপক্ষে, শূন্য তখন সাংখ্যিক রূপে পেয়েছিল। জিনভড্র প্রদত্ত পাটীগণিতের একটি প্রক্রিয়া থেকে আরো প্রমাণিত হয় শূন্য তখন সংখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। যেমন,—

$$241960 \begin{smallmatrix} 407150 \\ 483920 \end{smallmatrix} - 241960 \begin{smallmatrix} 40715 \\ 48392 \end{smallmatrix}$$

আর্ঘভট-শিষ্ট প্রথম ভাস্কর তাঁর ‘মহাভাস্করীয়’ গ্রন্থে শূন্য দ্বারা বিয়োগের বিষয় আলোচনা করেছেন। স্মরণ্য অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকাল

থেকেই ভারতে শূন্যের ব্যবহার ছিল এবং এর সাংখ্যিক রূপটিও তাঁদের অজ্ঞাত ছিলনা।

শূন্যের ক্রমবিকাশে এর দুটি রূপ দেখা যায় : একটি বিন্দু (•) রূপ ও অপরটি বৃত্তীয় রূপ (০)। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে বিন্দুরূপটি (•) দেখা যায় ; ভুবকুর বাসবদত্তায় শূন্যের এই রূপটিই বর্ণিত হয়েছে। আবার পাটীগণিতে পঞ্চবাশিক ও সপ্তরাশিক প্রভৃতি অঙ্কের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতবাশির পরিবর্তে শূন্যের বৃত্তীয় রূপটি (০) দেখা যায়। ভাস্করের সূদকবা অঙ্কেও এটি দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহির্ভারতের শিলালিপিতেও শূন্যের বিন্দু ও বৃত্তীয়—দুটি রূপই পরিলক্ষিত হয়। কালক্রমে বিন্দু দ্বারা ঋণাত্মক সংখ্যা সূচিত হতো বলে বোধ হয় শূন্যের এই রূপটি পরিত্যক্ত হয় এবং বৃত্তীয় রূপটি স্বীকৃতি লাভ করে।*

এই অধ্যায়ে ভারতে সংখ্যা-লিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শূন্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। প্রাচীন ভারতে আরো কয়েক প্রকার সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু তার মধ্যে দশগুণোত্তর রীতিতে স্থানিক-মান পদ্ধতিই সর্বজনীনতা লাভ করেছে। অন্ত পদ্ধতিগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তবুও এই সব পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের চিন্তা-ভাবনা ও মনোবার সঙ্গে পরিচিত হই।

* শূন্যের গাণিতিক ও অদ্ব্যস্ত তাৎপর্য অষ্টাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

“Arithmetic has been the queen and the hand maiden of the Sciences from the days of the astrologers of Chaldea and the high priests of Egypt to the present days of relativity, quanta, and the adding machine.”

—Kasner and Newman

॥ পাটিগণিতের বিষয়বস্তু ॥

বৈদিক সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই ভারতে পাটিগণিতের উদ্ভব। “বৈদিক ঋষিগণ গণিত বলিতে সাধারণতঃ পাটিগণিত ও জ্যোতিষকে বুঝিতেন।” কিন্তু পাটিগণিত বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা অনেক পরবর্তী কালে হয়েছে। প্রাচীনতম যে গ্রন্থটিতে পাটিগণিত বিষয়ে আলোচনা আছে, তা হলো বকশালী পাণ্ডুলিপি। আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত এ-বিষয়ে কোন পৃথক গ্রন্থ রচনা করেননি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে পাটিগণিতের কিছু নিয়ম ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত অবতারণা করেছেন মাত্র। খ্রীষ্বেয় পর থেকে পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ত্রিশতিকা, গণিত-সার-সংগ্রহ, গণিত-তিলক, দীলাবতী, গণিত-কৌমুদী, পাটি-সার প্রভৃতিতে পাটিগণিতের আলোচনা আছে। এ-সব গ্রন্থে ব্রহ্মগুপ্ত কথিত কুড়িটি ‘পরিকর্ম’ ও আটটি ‘ব্যবহার’ নানা ধরনের অঙ্কের উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। তালিকাটি অবশ্য নবম শতাব্দীর ভাষ্যকার পৃথুদকস্বামীকৃত ব্রহ্মগুপ্তের নয়।

॥ পরিকর্ম ॥

- (1) সংকলিত (যোগ), (2) ব্যবকলিত (বিয়োগ), (3) গুণন, (4) ভাগাহার, (5) বর্গ, (6) বর্গমূল, (7) ঘন, (8) ঘনমূল, (9—13) পঞ্চ-জাতি, (14) ত্রৈরাশিক, (15) ব্যস্ত-ত্রৈরাশিক, (16) পঞ্চরাশিক, (17) সপ্তরাশিক, (18) নব রাশিক, (19) একাদশ রাশিক, (20) ভাণ্ড ও প্রতিভাণ্ড।

॥ ব্যবহার ॥

(1) মিশ্রক (মিশ্রণ), (2) শ্রেণী (শ্রেণী), (3) ক্ষেত্র, (4) শ্রাত, (5) চিতি, (6) ক্রাকটিক, (7) রাশি, ও (8) ছায়া।

তাস্করের লীলাবতী ও বীজগণিতের বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলির বেশীর ভাগের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় গণিতে বিষয়বস্তুর একটি ঐতিহ্য আছে। অবশ্য প্রতিভাধর স্বল্পনশীল গণিতজ্ঞদের গ্রহে দু'একটি সংযোজনও লক্ষ্য করা যায়।

॥ প্রাথমিক চার নিয়ম ॥

যখন কালি-কলম-কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি, তখনও মানুষ গাণিতিক গণনা করেছে। বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস রোমান সৈন্যদের হাতে নিহত হবার সময় মাটিতে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বিভোর ছিলেন,—একথা অনেকের জানা। প্রাচীন কালে ভারতেও ধূলোর সাহায্যে মাটিতে বা কাঠখণ্ডের উপর গাণিতিক গণনা করা হতো। তাই এক সময় ভারতীয় গণিতে গণনা অর্থে “ধূলি-কর্ম” বোঝাত। পাটিগণিত দুটি পদের সমষ্টি,—পাটি+গণিত। পাটি শব্দের অর্থ কাঠখণ্ড (বোর্ড) আর গণিতের অর্থ গণনা। পাঠশালায় পড়ার মৌভাগ্য বীদের হয়েছিল, তাঁদের ‘পাটি’ শব্দটি অপরিচিত নয়। একগুচ্ছ তালপাতার পাটি নিয়ে তারখরে অ, আ, ক, খ ও একে চন্দ্র, চুয়ে পক্ষ লেখা ও পড়ার কথা তাঁদের আজও মনে পড়তে পারে।

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ প্রাথমিক চার নিয়ম। কিন্তু ভারতীয় গণিতে আটটি প্রাথমিক নিয়ম স্বীকৃত। অবশ্য প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এ-সব নিয়মের উল্লেখ নাই। আর্যভট্ট দুটি নিয়মের বর্ণনা করেছেন,—বর্গমূল ও ঘনমূলের। ব্রহ্মগুপ্ত ঘনমূলের নিয়ম-পদ্ধতি দিয়েছেন। কোথাও কোথাও অতি সংক্ষেপে যোগ-বিয়োগের উল্লেখ থাকলেও কোন গণিতগ্রন্থে এদের বিস্তৃত আলোচনা নাই। গুণনের অনেক পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও বিস্তৃত আলোচনা নাই। ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন ও ঘনমূল সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। এর প্রধান কারণ এগুলি এমনি প্রাথমিক পর্যায়ের যে, আর্যভট্টীয় বা ব্রহ্ম-সুহৃৎ-সিদ্ধান্তের মত

এহে এদের আলোচনার সুযোগ থাকে না। হায়, পাঠশালার ছেলেদের জ্ঞান রচিত যদি কোন গ্রন্থ পাওয়া যেত !

সমস্ত গাণিতিক প্রক্রিয়াই দুটি প্রক্রিয়া যোগ-বিয়োগের রূপ-বৈচিত্র্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। মহাভাস্করীর প্রণেতা প্রথম ভাস্করের মতে পাটীগণিতে চারটি প্রাথমিক নিয়ম স্বীকৃত হলেও সব প্রক্রিয়াগুলিকে দুটি শ্রেণী 'ক্রাস' ও 'বৃদ্ধি'-রূপে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাস্করের এই সংশ্লেষণী মন্তব্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করার যত। বস্তুত, এই মন্তব্যটির মধ্যে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মনীষার চরম উৎকর্ষের পরিচয় নিহিত আছে বললে অত্যাঙ্কি হয় না।

॥ যোগ ॥

যোগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ অতি প্রাচীন কোন গণিত বা জ্যোতিষ গ্রন্থে নাই। কিন্তু যোগ অর্থে সর্বত্রই অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,—সঙ্কলিতা, সঙ্কলন, মিশ্রণ, সংমেলন, সংযোজন, এক্ষেপণ, যুতি ইত্যাদি। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় আর্ধভাগে প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না বলেই হয়তো এই অতি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ করে থাকবেন। তিনি বলেছেন, বহু সংখ্যাকে একীকরণের নাম যোগ। তাঁর সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ :

সংখ্যাবতাং বহুনামেকীকরণং তদেব সঙ্কলিতম্।

ভাস্কর এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য একই স্থানের অঙ্কগুলিকে প্রত্যক্ষ বা বিপরীত পদ্ধতিতে যোগ করতে বলেছেন। তাঁর শ্লোক :

“কার্যঃ ক্রমাহত মতোহথবাস্করযোগো”

অর্থাৎ “সংখ্যাগুলির যোগ তাহাদের স্থানের অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে।” ভাস্কর যোগের উদাহরণ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ বা বিপরীত পদ্ধতির অর্থ ও ব্যাখ্যা দেন নি। পরবর্তীকালের বিখ্যাত ভাষ্যকার গঙ্গাধর এর আভাস দিয়ে বলেছেন :

“অঙ্কনাম্ বামভোগতিরিত্তি বিতর্কেণ একস্থানাদি যোজনম্ ক্রমঃ উৎক্রমস্ত অন্ত্যস্থানাদি যোজনম্।”

এই উক্ত্যংশ থেকে জানা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ ও বিপরীতের অর্থ যথাক্রমে ক্রম ও উৎক্রম।

॥ প্রত্যক্ষ বা ক্রম পদ্ধতি ॥

এই পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত যোগ-পদ্ধতির কোন পার্থক্য নাই। এই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াটি ডানদিক থেকে শুরু হয়। প্রথমে একক-স্থান-এর অঙ্কগুলি যোগ করে যোগফল লেখা হয়; তারপর দশক-স্থান-এর অঙ্কগুলি যোগ করে যদি একক-স্থানের অঙ্কের যোগফলে দশক-স্থানের কোন অঙ্ক থাকে তা-ও যোগ করে লেখা হয়। অর্থাৎ এটিই যোগ-প্রক্রিয়ার আধুনিক পদ্ধতি।

॥ বিপরীত বা উৎক্রম পদ্ধতি ॥

একে বিপরীত বা উৎক্রম পদ্ধতি বলার কারণ এই পদ্ধতিতে ডানদিক থেকে যোগ করার পরিবর্তে বামদিক থেকে শুরু করা হয়। এই পদ্ধতিতে অঙ্ক-স্থানের অঙ্কসমূহ যোগ করে নীচে লেখা হয়। তারপর পরবর্তী স্থানের অঙ্কসমূহ যোগ করে পূর্ব ফলটি সংশোধিত করা হয়। যেমন,—মনে করা যাক, অঙ্ক-স্থানের অঙ্কসমষ্টি 18 এবং পরবর্তী স্থানের অঙ্কসমষ্টি 11 হলে, অঙ্ক-স্থানের সমষ্টি সংশোধিত করে 18-এর জায়গায় 19 লেখা হবে। 8 মুছে 9 লেখা তখনকার দিনে তেমন কঠিন ছিল না। কারণ, প্রাচীন ভারতে কাগজ-কলমে লেখার প্রচলন ছিল না; ধূলা অথবা চকখড়ি দিয়ে পাটিতে লেখার প্রচলন ছিল।

॥ বিয়োগ ॥

দ্বিতীয় আর্ষভট, ভাস্কর ও জ্ঞানরাজপুত্র স্বর্ধদাস বিয়োগের প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বর্ধদাসই প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, এই প্রক্রিয়ায় বিপরীত পদ্ধতিটি সহজ। বিয়োগ অর্থে ব্যাৎকলিত, ব্যাৎকলন, শোধন, পাতন, অন্তর ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দ্বিতীয় আর্ষভট বিয়োগের একুশ সংজ্ঞা দিয়েছেন,—

যতপাত্তং সর্বধনাৎ তদব্যবকলিতং তু শেষকং শেষম্।

অর্থাৎ ‘সর্বধন’ থেকে কিছু সংখ্যা নিয়ে নেওয়ারকেই বিয়োগ বলে এবং অবশিষ্টকে ‘শেষ’ বলে। বলা বাহুল্য, ‘শেষ’ মানে বিয়োগফল।

॥ প্রত্যক্ষ পদ্ধতির একটি উদাহরণ ॥

স্বর্ধদাস (1000—360) এই উদাহরণটি নিয়ে ব্যাখ্যাধরূপ বলেছেন যেহেতু ০-থেকে 6 বিয়োগ করা যায় না, সেহেতু ০-স্থানে 10 ধরে নিতে হবে। কারণ, একক-স্থান থেকে উৎক্রমে সব অঙ্কই 10-এর গুণিতক।

॥ ইষ্টপদ্ধতি ॥

ব্রহ্মগুপ্ত কথিত এই পদ্ধতিকে বীজগাণিতিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে সুবিধামত কোন ঐচ্ছিক রাশি যোগ বা বিয়োগ করে গুণফল নির্ণয় করা হয়। ব্রহ্মগুপ্ত এই পদ্ধতির সংক্ষার বলেছেন,—

গুণয়ো রাশিশু ণকাররাশিনেষ্টাষিকোনকেন গুণঃ ।

গুণয়োষ্টবধো ম যুভো গুণকেহুভ্যষিকোনকে কার্যঃ ॥

জাবানুবাদ : গুণকের সঙ্গে কোন ইষ্টরাশি যোগ বা বিয়োগ করে তা দিয়ে গুণ্যকে গুণ করবে। তারপর ওই ইষ্টরাশি দ্বারা গুণ করে আগের ফলে যোগ বা বিয়োগ করবে।

উদাহরণ :

$$(1) \quad 145 \times 15 = 145 \times (15 + 5) - 145 \times 5 = 2900 - 725 = 2175$$

$$(2) \quad 145 \times 15 = 145 \times (15 - 5) + 145 \times 5 = 1450 + 725 = 2175$$

॥ আংশিক গুণন পদ্ধতি ॥

সপ্তম শতাব্দী থেকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। গুণ্য বা গুণকের দুই বা ততোধিক আংশিক বিভাজন দ্বারা এই পদ্ধতিতে গুণন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতি বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। আসলে এটি আধুনিক গণিতের বিচ্ছেদ নিয়ম।

উদাহরণ :

$$(1) \quad 12 \times 135 = (4 + 8)135 = 4 \times 135 + 8 \times 135 = 1620$$

$$(2) \quad 11 \times 144 = (6 + 3 + 2)144 = 6 \times 144 + 3 \times 144 + 2 \times 144 \\ = 864 + 432 + 288 = 1584$$

॥ কপাট-সন্ধি পদ্ধতি ॥

ব্রহ্মগুপ্ত গুণনের চার প্রকার পদ্ধতির কথা বলেছেন বটে, কিন্তু এই পদ্ধতির কথা বলেননি। অথচ এটি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এমনকি ভারতের বাইরে আরব জগতেও এর জনপ্রিয়তা ছিল। আলখোরাজ্জিমি, অল হাসার, অল কলমাদী প্রভৃতি আরব গণিতজ্ঞদের গ্রন্থেও এই পদ্ধতিটি দেখতে

পাওয়া যায়। আরবে এই পদ্ধতিটি ‘অল অমল অল হিন্দি’, ‘তারিখ অল হিন্দি’ নামে পরিচিত ছিল। শ্রীধর ও দ্বিতীয় আর্যভটের গ্রন্থে পদ্ধতিটি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীধরচাৰ্ঘ এই পদ্ধতির সংজ্ঞায় বলেছেন যে, গুণকের নীচে গুণ্য বসিয়ে পরপর প্রত্যক্ষ বা বিপরীত পদ্ধতিতে গুণককে সরিয়ে গুণফল নির্ণয় করার নাম কপাট-সন্ধি পদ্ধতি। শ্রীধরের সঙ্গে শ্রীপতির বেশ মিল আছে। শ্রীপতির সংজ্ঞাটি এরূপ :

বিশুদ্ধ গুণ্য গুণকাখ্যরাশে—রথঃ কপাটদ্বয় সন্ধি মুক্ত্যা

উৎসার্য-হত্যাত ক্রমশো হুত্বলোমঃ, বিলোম মাহো-উভতৎস্বমেব।

দ্বিতীয় আর্যভট বলেছেন, গুণ্যের শেষ বা অন্ত্য অঙ্ক দ্বারা পরপর গুণ করার নাম কপাট-সন্ধি।

এই পদ্ধতির প্রয়োগে দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়,—(i) গুণ্য ও গুণকের আপেক্ষিক অবস্থান ও (ii) গুণ্যের অঙ্ক মুছে সেই স্থানে গুণফলের অঙ্কের সংস্থাপন।

উদাহরণ :

$$145 \times 15$$

এই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলির (গুণ্য ও গুণকের) অবস্থান নিম্নরূপ :

$$\begin{array}{r} 15 \\ 145 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 15 \\ 1475 \end{array}$$

(a) গুণ্যের প্রথম অঙ্ক 5 দ্বারা গুণকের অঙ্কগুলি গুণ করা হলো। সুতরাং $5 \times 5 = 25$; 25-এর 5-কে গুণকের 5-এর নীচে বসানো হলো, আর হাতে 2 থাকল। আবার $5 \times 1 = 5$; এবার 5-এর সঙ্গে হাতের 2 যোগ করলে 7 হয়। অতএব গুণকের 5-কে ‘হনন’ করে তার জায়গায় 7 বসল। 5 মুছে 7 বসানো সে-যুগে যে অস্থবিধাজনক ছিলনা তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে ‘→’ চিহ্ন দ্বারা গুণ্য ও গুণকের নতুন অবস্থান দেখানো হয়েছে।

(b) দ্বিতীয় ধাপে গুণকটিকে একষর বামদিকে সরিয়ে নতুন অবস্থানটি সাজিয়ে নিতে হবে।

$$\begin{array}{r} 15 \\ 1475 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 15 \\ 14675 \end{array}$$

(c) ঠিক আগের মত আবার গুণ করে $4 \times 5 = 20$ হলো; হাতে থাকল 2।

পুনরায় $4 \times 1 = 4$, আর হাতের ২ যোগ করে ৬ হলো। এই ৬ গুণের ৪-কে ‘হনন’ করে তার স্থান দখল করল।

(d) গুণকটিকে আবার একঘর বামদিকে সরালে নতুন অবস্থান হবে :

$$\begin{array}{r} 15 \qquad 15 \\ 1675 \longrightarrow 2175 \longrightarrow 2175 \end{array}$$

(e) পূর্বের মত $1 \times 5 = 5$; $5 + 6 = 11$ । অতএব ৬ মুছে তার জায়গার ১ বসালে ১ হাতে থাকে। আবার $1 \times 1 = 1$, $1 + 1 = 2$; সুতরাং এই ২ বামদিকে বসল। এবার গুণকে ‘হনন’ করে কেবল ২১৭৫ লেখা হলো।

অপরিশ্রুত পদ্ধতিটি দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। সামান্য অভ্যাস করলেই সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। পাক্সাল তো তাই বলেছেন, “habit is the second nature.” কপাট-সন্ধি প্রণালী থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ‘গুণন’ অর্থে কেন প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা ‘হনন’, ‘বধ’, ‘ক্ষয়’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন।

॥ কপাট-সন্ধি (দ্বিতীয় প্রকার) ॥

এই পদ্ধতি সত্যিকার কপাট-সন্ধি কিনা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। “গণিত-মঞ্জরী”-র লেখক গণেশ কিস্তি এটিকে কপাট-সন্ধি বলে অভিহিত করেছেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও এই পদ্ধতি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, —ইউরোপেও এই পদ্ধতির প্রচলন দেখা দিয়েছিল। এর উদ্ভব ও প্রচার সম্পর্কে D. E. Smith তাঁর History of Mathematics-এ বলেছেন,—“It was likely developed in India, for it appears in Ganesh’s commentary on the Līlāvati and in other Hindu works. From India it seems to have moved northward to China, appearing there in an arithmetic of 1593. It also found its way into Arab and Persian works, where it was the favourite method for many generations.”

গণেশ কৃত “গণিত-মঞ্জরী”-তে পদ্ধতিটির নিয়রূপ সূত্র পাওয়া যায় :

গুণ্যে বডগুলি অঙ্ক আছে ততগুলি ঘর কাট (উল্লম্বভাবে) এবং গুণকে বডগুলি অঙ্ক আছে ততগুলি ঘর কাট (অনুভূমিকভাবে)। নির্ধিক রেখা

দ্বারা ঘরগুলি বিভক্ত কর। গুণকের অঙ্কগুলি দ্বারা গুণ্যের প্রতিস্থানের অঙ্ক গুণ করে ফলগুলি তির্যক ঘরে স্থাপন কর। তির্যক-রেখা-পথের উভয় দিক যোগ করলে গুণফল পাওয়া যায়।

উদাহরণ : 125×15

	1	2	5	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">1</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">2</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">5</div>	1
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">5</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">0</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">5</div>	5
1	8	7	5	

ভানদিক থেকে : প্রথম অঙ্ক=5; দ্বিতীয় অঙ্ক=5+2+0=7; তৃতীয় অঙ্ক=2+1+5=8 এবং অন্ত্য অঙ্ক=1। সুতরাং গুণফল=1875। গণেশের দ্বীপাবতী ভাষ্য 'বুদ্ধিবিলাসিনী'-তেও অঙ্কটি দেখতে পাওয়া যায়।

॥ স্থান-ধণ্ড পদ্ধতি ॥

স্থান খণ্ডিত করে অর্থাৎ গুণ্য বা গুণকের অঙ্কের স্থানচ্যুতি দ্বারা গুণন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় বলে এই পদ্ধতির এরকম নাম। ভারতে সপ্তম শতাব্দীর আগে থেকেই এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতিতে গুণ্য ও গুণকের অঙ্কের বিস্তার নানা রকম হতে পারে। এখানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখানো হলো :

উদাহরণ : 125×15

$$\begin{array}{r}
 \text{(i)} \quad 125 \\
 \underline{15} \\
 15 = 1 \times 15 \\
 30 = 2 \times 15 \\
 75 = 5 \times 15 \\
 \hline
 1875
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{(ii)} \quad 15 \quad 15 \quad 15 \\
 \underline{1 \quad 2 \quad 5} \\
 15 \quad \quad 75 \\
 \underline{3 \quad \quad 0} \\
 18 \quad \quad 75 \\
 \hline
 -1875
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{(iii)} \quad 125 \quad \quad 1 \quad 2 \quad 5 \\
 \underline{1 \quad \quad \quad 5} \\
 \quad \quad 6 \quad 2 \quad 5 \\
 \underline{\quad \quad 1 \quad 2 \quad 5} \\
 1 \quad 8 \quad 7 \quad 5
 \end{array}$$

॥ ভাগ ॥

প্রাথমিক চার নিয়মের মধ্যে ভাগ-প্রক্রিয়া যে নিঃসন্দেহে জটিল, তা আর বলাব অপেক্ষা রাখে না। এতে যোগ-বিয়োগ-গুণ এই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি কিরূপ জটিল ও কঠিন বলে বিবেচিত হতো তার বর্ণনা Smith তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন,—“The operation of division was one of the most difficult operations in the ancient logistica, and even in the 15th century it was commonly looked upon in the commercial training of the Italian boy as a hard matter.” ইটালীর বালকের পক্ষে প্রক্রিয়াটি যত কঠিনই হোক না কেন, ভারতীয় বালকেরা কমপক্ষে সতেরো-আঠারো শ বছর আগে এটি তেমন কঠিন বলে বিবেচনা করত না। জৈন ধর্মগ্রন্থ ‘তত্ত্বার্থাবিগমসূত্র’-এ সাধারণ গুণিতকের অপসারণ দ্বারা ভাগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও এ-সময় ভারতীয় গণিতজ্ঞদের এটি অজানা ছিল বলে মনে হয় না। আর্বিভট ও ব্রহ্মগুপ্ত অবশ্য এ-বিষয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁদের বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের সূত্রে থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় প্রাথমিক এই নিয়মটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

ভারতীয় গণিতে ভাগ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ শ্রীধরের পর থেকে প্রায় সব গণিতজ্ঞরাই দিয়েছেন। শ্রীধর তাঁর ত্রিশতিকায় বর্তমান পদ্ধতির দ্বারা সাধারণ গুণিতক অপসারণের পর ভাজকে ভাজক দ্বারা ভাগের উল্লেখ করেছেন; মহাবীর ঠিক একই কথা বলেছেন। তাঁর ‘গণিত সার সংগ্রহ’-এ ভাজ্যের নিয়ে ভাজক বসিয়ে গুণিতক অপসারণ দ্বারা ভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর সূত্রটি :

বিগতস্য ভাজ্যমানং তস্যাবশেষেন ভাগাহারেণ ।

সদৃশাপবর্তাবিধিনা ভাগং কৃত্বা ফলং প্রদেৎ ॥

দ্বিতীয় আর্বিভট, ভাস্কর ও নারায়ণ পণ্ডিত তো এই পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিবৃত করেছেন। আর ভাগাহার যে গুণনের বিপরীত প্রক্রিয়া এই সত্যটিও তাঁদের অজানা ছিল না।

যোগ-বিয়োগ-গুণের মত প্রাচীন ভারতে ভাগেরও অনেক পারিভাষিক

শব্দ ছিল। ভাগের অর্থে 'ভাগহার', 'ভাজন', 'ছেদন', 'হরণ', প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা ভাগশেষকে বলেছেন 'লঙ্কি'।

গুণনের 'কপাট সন্ধি' পদ্ধতির সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন একটি ভাগহার পদ্ধতি নিয়ে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত এই প্রক্রিয়ার সাথে একটু পরিচয় করে নেওয়া যাক।

উদাহরণ : 1620÷12

$$\begin{array}{r} \text{a) } 1620 \quad 1 \\ 12 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \text{ভাগফল-রেখা} \end{array}$$

b) বাম থেকে প্রক্রিয়া শুরু : $1 \times 1 = 1$, এবং $1 - 1 = 0$; সুতরাং ভাজ্যের 1 মুছে নতুন ভাজ্য হলো 620। আবার $2 \times 1 = 2$, এবং $6 - 2 = 4$; এবার নতুন ভাজ্যের (620) 6 মুছে অর্থাৎ 'হরণ' করে 4 বসানো হলো।

b)-প্রক্রিয়াটির পর ভাজ্য-ভাজকের নতুন অবস্থান হলো :

$$\begin{array}{r} 420 \\ 12 \end{array}$$

c) এবার ভাজককে ডানদিকে এক-ঘর সরাতে হবে। তাহলে নতুন অবস্থান হলো :

$$\begin{array}{r} 420 \quad 1 \\ 12 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \text{ভাগফল রেখা} \end{array}$$

d) এখন 42-কে 12 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল 3 হয়; এই 3 গেল ভাগফল-রেখায় এবং 42-কে 'হরণ' করে তার জায়গায় ভাগশেষ অর্থাৎ 'লঙ্কি' 6 বসল। ফলে পরিবর্তিত ভাজ্য-ভাজক অবস্থান হলো :

$$\begin{array}{r} 60 \quad 13 \\ 12 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \text{ভাগফল-রেখা} \end{array}$$

e) আগের মতো আবার ভাজককে এক-ঘর ডানদিকে সরিয়ে পরবর্তী নতুন অবস্থান পাওয়া গেল :

$$\begin{array}{r} 60 \quad 13 \\ 12 \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad \text{ভাগফল-রেখা} \end{array}$$

f) এখন 60-কে 12 দ্বারা ভাগ করলে 5 পাওয়া যায়, এবং তা গেল ভাগফল-রেখায়। আর 60 এর 'হরণ' সম্পূর্ণ হলো বলে ভাজ্য-ভাজক গেল মুছে। অতএব, ভাগফল পাওয়া গেল—135।

পুনরুক্তি হলেও বলতে হয়, আপাত প্রক্রিয়াটি জটিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু হাঙ্কাভাবে না পড়ে যদি একটু মনোযোগ দিয়ে প্রক্রিয়াটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়, তা হলে তেমন জটিল বলে মনে হবে না। অবশ্য অজ্ঞাবোধি আবিষ্কৃত ও লভ্য প্রাচীন ভারতের গণিতগ্রন্থগুলির কোনটাই খুব প্রাথমিক পর্যায়ের নয়। সে বকম কোন গ্রন্থ বা টীকা-ভাষ্য আবিষ্কৃত হলে প্রক্রিয়াটির আরো সাবলীল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

॥ ভগ্নাংশ ॥

ইতিপূর্বে পাঠক-পাঠিকার ভগ্নাংশের সাথে সামান্য পরিচয় হয়েছে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাদি ও গণিতজ্ঞদের আলোচনায় আমরা ভগ্নাংশ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। বহু প্রাচীনকালে ঋগ্বেদ ও তার পরবর্তী যুগ থেকেই ভারতে ভগ্নাংশের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অবশ্য প্রাচীন সভ্য দেশ মিশর, ব্যাবিলন, চীনেও ভগ্নাংশের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতে ঋগ্বেদে ভগ্নাংশ সম্পর্কিত অনেক শব্দ দেখা যায়। যেমন, ত্রিগদ, শক, কুষ্ঠ, ত্রি-অষ্ট ইত্যাদি; বেদাঙ্গ জ্যোতিষে “কল দশ সবিংশ মাড়িকা স্তান্”-এর মধ্যে $10\frac{1}{20}$ ভগ্নাংশটি বোঝানো হয়েছে। শুষ্কসূত্রে ভগ্নাংশের বহুল অস্তিত্ব আছে। এমন কি, জৈন গ্রন্থাদিতেও ভগ্নাংশের বহু উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ‘সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি’-তে $2\frac{42\frac{1}{2}}{183}$, $4\frac{51\frac{1}{2}}{183}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশগুলি দেখতে পাওয়া যায়। জিনভজ্জগণি প্রাকৃতভাষার মাধ্যমে $241960\frac{40715}{48392}$ ভগ্নাংশটি এভাবে প্রকাশ করেছেন,—

“কল লখ্ ক হুগং ইয়াল সহস্ৰা নব সয়া সঠ্ হিয়া। স্ত্রম্বেমবগেউ অংসং চউ স্ত্রম্বেম সস্ত এগ পণ। ছেউ চউ এট্টঠ্ তিগ নব হুগা য বাহে স উত্তরকস্” (প্রা. ভা. গ. চ.)

উপরের সামান্য আলোচনা থেকে বলা যায়, এবং নিঃসন্দেহেই বলা যায় খ্রীষ্টপূর্ব শতকে ভারতে ভগ্নাংশের বেশ ভাল বকমই প্রচলন ছিল। কিন্তু তা থাকলেও, এর গাণিতিক রূপটি তখন তেমন স্পষ্ট ছিল না। ভগ্নাংশের প্রকৃত গাণিতিক রূপ ধরা পড়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে অর্থাৎ আর্যভট্টের পর থেকে। ব্রহ্মস্পৃশ, ত্রিধর, ভাস্কর ইত্যাদি গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন, ব্রহ্মস্পৃশ ও ভাস্কর চার ধরনের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, প্রক্রিয়ার বর্ণনাও করেছেন। ব্রহ্মস্পৃশ ও ভাস্কর চার ধরনের

ভগ্নাংশের কথা বললেও শ্রীধর ও মহাবীর কিন্তু ছ'ধরনের ভগ্নাংশের কথা বলেছেন। এই প্রকারগুলি হলো : (a) ভাগ, (b) প্রভাগ, (c) ভাগাপবাহ, (d) ভাগামুবদ্ধ, (e) ভাগমাতৃ ও (f) ভাগ-ভাগ।

এবার ছ'টি বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

॥ ভাগ ॥

বস্তুত এই শ্রেণীর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা সবাই খুব ছোটবেলা থেকেই পরিচিত। এমন কি এর প্রক্রিয়াটিও আমাদের সবার জানা। আধুনিক গণিতের ভাষায় এই ভগ্নাংশটির রূপ এরকম :

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} \pm \frac{e}{f} \pm \dots$$

এই ভগ্নাংশিক প্রক্রিয়াটি দু-রকমভাবে করা যেতে পারে : (a) সমহরে পরিণত করে, আর (b) প্রথম লব \times দ্বিতীয় হর \pm দ্বিতীয় লব \times প্রথম হর এ-ভাবে।

॥ প্রভাগ ॥

দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশিক রাশির মধ্যে 'এর' থাকলে, তাকে 'প্রভাগ' শ্রেণীর ভগ্নাংশ বলে। এটির যে এখনো প্রচলন আছে, তা আর না বললেও চলে। এই শ্রেণীর ভগ্নাংশের গাণিতিক রূপ এরকম :

$$\frac{a}{b} \text{ এর } \frac{c}{d} \text{ এর } \frac{e}{f}$$

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে লবে লবে এবং হরে হরে গুণ করতে হয়। ভাস্কর এই প্রক্রিয়ার সূত্র দিয়েছেন :—

লবালম্বাশ্চ হরাহরম্মা ভাগপ্রভাগেষু সর্বমং স্যাৎ।

॥ ভাগাপবাহ ॥

কোন অথও সংখ্যা থেকে ঋণসংখ্যা বিয়োগ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে 'ভাগাপবাহ'। আধুনিক গণিতের ভাষায় বলা যায় $(a - \frac{b}{c})$ হচ্ছে ভাগাপবাহের

গাণিতিক রূপ। এই ভগ্নাংশটি নিয়ে ব্রহ্মগুপ্তের পর প্রায় সব গণিতজ্ঞই আলোচনা করেছেন।

॥ ভাগানুবন্ধ ॥

শ্রীধরচার্য থেকে শুরু করে প্রায় সব গণিতজ্ঞই এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য ভাস্করের আলোচনা অধিকতর বিস্তারিত বলে মনে হয়। ‘ভাগানুবন্ধ’ ছ’রকমের হতে পারে,—

$$(1) \frac{a}{b} + \frac{c}{d} \text{ এর } \frac{a}{b} + \frac{e}{f} \text{ এর } \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \text{ এর } \frac{a}{b} \right) + \dots\dots$$

$$(2) \left(a + \frac{b}{c} \right)$$

এর প্রক্রিয়াটি ভাস্করের ভাষায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বলাভবাদ একুপ :

“যে কোন পূর্ণসংখ্যা হরের দ্বারা গুণ করিলে লবটি যোগ চিহ্ন বা বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত হয়, যদি অংশগুলি তাহার সহিত যোগ বা বিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইচার কোন অংশ দ্বারা যদি রাশিটি বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে ভগ্নাংশের যোগে বা বিয়োগে নিম্নস্থিত হরকে হরের দ্বারা গুণ করিতে হয় এবং লবকে বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হরের দ্বারা গুণ করিতে হয়।” (অঙ্কভাবনা, প্রথম সংখ্যা ১২৩ঃ)

॥ ভাগমাতৃ ও ভাগ-ভাগ ॥

এই দুটি শ্রেণীর ভগ্নাংশের বিষয়ে শ্রীধর ও মহাবীরের আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ-ভাগের গাণিতিক রূপ : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$

॥ ভগ্নাংশের নিম্নম সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আর্যভট্টের গ্রন্থে ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ-গুণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া না গেলেও ব্রহ্মগুপ্তের পর এ-বিষয়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা আলোচনা করতে ভোলেননি। কেবল প্রাথমিক চার নিয়মই নয়, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল নিয়েও আলোচনা আছে। যোগ-বিয়োগ সম্পর্কিত নিয়মটি ভাস্করের ভাষায়,

যোগোহস্তরং তুল্যহরাংশকানাং কল্যাহরোরূপমহাররাশেঃ ॥

“অর্থাৎ ভগ্নাংশে যোগ অথবা বিয়োগে সমান হর গ্রহণ করতে হয়। যার

ভাগফল নেই সেক্ষেপ রাশির এক বলিয়া হয় কল্পনা করতে হয়।”
(প্র. ভা. গ. চ.)

ভগ্নাংশের গুণন সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য প্রায় একই বক্য সংজ্ঞা দিচ্ছেন। উভয়েই বলেছেন যে, দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশিক রাশির লবগুলির গুণফলকে হরগুলির গুণফল দিয়ে ভাগ করতে হবে। মনে করা যাক, $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ ও $\frac{e}{f}$ এই ভগ্নাংশিক রাশিগুলি দেওয়া আছে। তা হলে এদের গুণফল হবে,—

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{e}{f} = \frac{a \times c \times e}{b \times d \times f}$$

ত্রৈাশিক বিষয় আলোচনা কালে অর্ধভট ভগ্নাংশিক ভাগের কথা বলেছেন। আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রমুখ গণিতজ্ঞরা। ভাস্করের সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ :

ছেদং লবক পরিবর্ত্যহরন্ত শেষঃ কার্যোহথ ভাগহরেন গুণনাবিধিচ্চ।

ভাবানুবাদ : লবের সঙ্গে হরের পরিবর্তন করে গুণের নিয়ম মেনে গুণ করতে হবে।

গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

$$\frac{p}{q} \div \frac{r}{s} = \frac{p}{q} \times \frac{s}{r} = \frac{ps}{qr}$$

এখানে r-লবকে হরে, s-হরকে লবে পরিণত করে গুণ করা হলো।

ভগ্নাংশের বর্গ, ঘন, বর্গমূল ও ঘনমূল বার করার আধুনিক পাটীগণিতিক পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন গণিতজ্ঞদের প্রায় কোন পার্থক্য নাই। বর্গ ও ঘন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাস্করের সূত্র :

বর্গে কৃতৌ ঘনাবিধৌ তুষনৌ বিধয়ো হারাংশয়েন্থে পদে চ পদ প্রসিদ্ধৈ।

ভাবানুবাদ : বর্গ বা ঘন বার করতে হলে লব ও হর উভয়ের বর্গ বা ঘন নির্ণয় করতে হবে। বর্গমূল বার করতে হলে লব ও হর উভয়ের বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে।

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

“Hindu Mathematics starts where Alexandrian Mathematics left off”

—L. Hogben

॥ বর্গ ॥

ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ‘বর্গ’-এর গাণিতিক রূপের চেয়ে এর জ্যামিতিক রূপের সহিত অধিক পরিচিত ছিলেন। শুবসূত্রে এমন কয়েকটি বেদী-নির্মাণের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা থেকে একরূপ ধারণা স্বাভাবিকভাবেই করা যায়। আর্ঘভট বর্গ নির্ণয়ের সূত্রটি সংজ্ঞা দেননি সত্য, কিন্তু পদ্ধতিটি তাঁর অজানা ছিল বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে তাঁর সূত্রটি হচ্ছে :

বর্গঃ সমচতুরশ্রঃ ফলং চ সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ।

অর্থাৎ সমকর্ণসহ সমবাহু চতুর্ভুজ ও উহার ক্ষেত্রফলকে বর্গ বলে। এবং দুটি সমরাশির গুণফলকেও বর্গ বলে।

নিঃসন্দেহে সূত্রটির প্রথমাংশে বর্গের জ্যামিতিক রূপ ও দ্বিতীয়াংশে গাণিতিক রূপের কথা বলা হয়েছে। আবার প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্যের পরমেশ্বরের মতে দ্বিতীয়াংশে বর্গ-নির্ণয়ের তাৎপর্য নিহিত আছে। ব্রহ্মগুপ্ত, পৃথুদকস্বামী, শ্রীধর, মহাবীর, শ্রীপতি প্রমুখ গণিতজ্ঞরা বর্গের সংজ্ঞায় যে খুব বেশী কিছু নতুন দেখাতে পেরেছেন, তা মনে হয় না। আচার্য আর্ঘভটের চেয়ে এঁরা বর্গ-নির্ণয় পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়া আর বেশী অগ্রসর হতে পারেননি।

ব্রহ্মগুপ্ত বর্গ করার একটি সূত্র দিয়েছেন তাঁর ব্রহ্ম-সূত্র-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে। সূত্রটির প্রথমাংশে আমরা অতি পরিচিত বীজগাণিতিক সূত্র, $-(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ পাই। তাঁর সংশ্লিষ্ট সূত্রটি হচ্ছে :

রাশেক্ষরনং দ্বিগুণং বহুতর গুণ মুনকৃতিমুতং বর্গঃ।

ভাবানুবাদ : যে রাশির বর্গ করতে হবে তাকে দুই বা তার চেয়ে বেশী

অংশে খণ্ড কর। প্রথম রাশির বর্গ কর; প্রথম রাশির দ্বিগুণের সঙ্গে দ্বিতীয় রাশি গুণ কর; তারপর শেষের রাশির বর্গ করে সব রাশিগুলি যোগ কর।

উপরোক্ত শ্লোকটির দ্বিতীয়াংশে আর একটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। তাঁর সূত্রটি :

রাশেরিষ্টয়ুতোনাবধঃ কৃতির্বৈষ্টকৃতিযুক্তঃ ।

ভাবানুবাদ : প্রদত্ত রাশির সঙ্গে 'ইষ্ট' (অভ্রমিত) রাশি যোগ এবং বিয়োগ করার পর উভয় ফলকে গুণ করে 'ইষ্ট' রাশির বর্গ যোগ কর।

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

$n^2 - (n+a)(n-a) + a^2$, এখানে a —ইষ্ট বা অভ্রমিত রাশি।

দুটি উদাহরণ দিয়ে এই সূত্রটির প্রয়োগ দেখানো যাক :

$$(1) 15^2 - (15+5)(15-5) + 5^2 = 20 \times 10 + 25 = 225$$

এখানে অভ্রমিত রাশি=5

$$(2) 45^2 - (45+5)(45-5) + 5^2 = 50 \times 40 + 25 = 2025$$

বলা বাহুল্য, এটি পাটীগণিতিক পদ্ধতি নয়,—বীজগণিতিক পদ্ধতি। ভাস্কর্য্যও বর্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং একটু বিশদভাবেই করেছেন। কিন্তু তিনিও ব্রহ্মসুপ্তের পথই অমূল্যবর্ণ করেছেন। 'অঙ্ক ভাবনা' প্রবন্ধ থেকে তাঁর এই সম্পর্কিত আলোচনা ও অনুবাদ দেওয়া হলো :

“সমদ্বিঘাতঃ কৃতিরূচ্যতেহত্র স্থাপেয়াহন্ত্য বর্গো দ্বিগুণান্ত্য বিঘ্নাঃ ।
স্থাপোপরিষ্ঠাচ্চ তথা পরেহঙ্কান্ত্যক্তান্ত্য যুৎসার্থ্য পুনশ্চ রাশি ॥ খণ্ডয়স্য
স্যাভিহতির্হিনির্ব্বো তৎ খণ্ডবপৈকায়ুতা কৃতির্বা । ইতোনয়ুগ্রাশি বধঃ কৃতিঃ
স্যাদিষ্টস্য বর্গেন সমদ্বিতো বা ।”

অর্থাৎ “সমান দুইটি সংখ্যার গুণফলকে বর্গ বলে। শেষ রাশি উপরে রাখিতে হইবে, অবশিষ্ট রাশি দ্বিগুণ করিতে হইবে এবং শেষ রাশির দ্বারা গুণ করিয়া উপরে রাখিতে হইবে, পরে পুনরায় শেষ রাশি তিন্ম অত্র রাশি রাখিতে হইবে। অথবা দুইটি অংশের গুণফল দ্বিগুণ করিয়া অংশগুলির বর্গের সহিত যোগ করিলে বর্গ হইবে। রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি যোগ করিতে হইবে এবং রাশির সহিত ধরিয়া লওয়া রাশি বিয়োগ করিতে হইবে। এইবার সেই দুইটির গুণ করিতে হইবে এবং তাহার সহিত ধরিয়া লওয়া রাশির বর্গ যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই রাশির বর্গ পাওয়া যাইবে।”

প্রথম ভাস্কর 'বর্গ' অথবা 'বর্গ-নির্গম' অর্থে 'বর্গ', 'করণী', 'কৃতি', 'বর্গন' এবং 'যাবকরণ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'করণী', 'বর্গন' এবং 'যাবকরণ' শব্দের প্রচলন বেশী দেখা যায় না। প্রাচীন জৈন গণিতে অজ্ঞাত রাশি 'x' বোঝাতে 'যাবৎ-তাবৎ'-এর ব্যবহার দেখা যায়; আবার অন্ত্র 'যা' অঙ্করূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যা' হয়তো 'যাবৎ-তাবৎ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং 'ব'-এর উৎপত্তি 'বর্গ' থেকে হয়ে থাকবে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে বর্গের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে 'কৃতি' শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বর্গ-নির্গম পদ্ধতি নিয়ে ব্রহ্মসুপ্তের পর থেকে যে অনেক গণিতজ্ঞই আলোচনা করেছেন, তার আভাস আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু সে আলোচনার বীজগাণিতিক পদ্ধতির প্রভাবই দেখা যায়। এখানে বিখ্যাত জৈন গণিতজ্ঞ মহাবীরাচার্যের পদ্ধতিটি উদাহরণস্বরূপ দেখানো হলো। বলা বাহুল্য, এটি সম্পূর্ণ পাটীগাণিতিক পদ্ধতি। তাঁর নিয়মটির সারমর্ম নিম্নরূপ :

যে-সংখ্যার বর্গ নির্গম করতে হবে তার অন্ত্য অঙ্কটির বর্গ করে ঠিক সেই অঙ্কটির উপরে লিখতে হবে, অন্ত্য-অঙ্কটি দ্বিগুণিত করে অন্ত্যন্ত অঙ্কগুলি গুণ করতে হবে। অবশিষ্ট অঙ্কগুলি ডান দিকে পর পর এক-ঘর সরিয়ে পূর্বের মত গুণন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বর্গ-সংখ্যা পাওয়া যাবে।

অন্ত্য বা প্রথম অর্থাৎ বাম-ডান উভয় দিক থেকেই বর্গ-নির্গম শুরু করা যেতে পারে। এখানে অন্ত্য-অঙ্ক থেকে শুরু করে পদ্ধতিটি বিশ্লেষিত হলো।

উদাহরণ : বর্গ নির্গম কর 135

(a) এখানে প্রদত্ত সংখ্যা 135-এর অন্ত্য-সংখ্যা=1; হুতরাং $1^2=1$; এই 1-কে বর্গ-সংখ্যা 1-এর উপর লেখা হলো,—

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \quad 3 \quad 5 \end{array}$$

(b) অন্ত্য-অঙ্ক 1-এর দ্বিগুণ=2×1=2; এই 2-কে 5-এর নীচে লিখে 1-কে মুছে দেওয়া হলো। তা হলে নতুন অবস্থান হলো,—

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \quad 5 \\ 2 \end{array}$$

(c) এবার 2 দ্বারা 35-কে গুণ করে ($35 \times 2=70$) গুণফলের অঙ্কগুলি নিজ

নিজ স্থানের উপরে লেখা হলো অর্ধাৎ একক-স্থানে ০ এবং দশক-স্থানে ৭; তা-
হলে নতুন অবস্থান,—

$$1 \ 7 \ 0$$

$$3 \ 5$$

এখানেই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ হলো বলে মনে করা যেতে পারে। পরের সোপান-
গুলি কেবলমাত্র পূর্ববর্তী সোপানসমূহের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

(d) 35-কে এক-ঘর ভানদিকে সরিয়ে অবস্থান হলো,—

$$1 \ 7 \ 0$$

$$3 \ 5$$

(e) এখানে অন্ত্য-অঙ্ক 3; হুতরাং $3 \times 9 = 27$; 9 যথাস্থানে স্থাপিত হলে 3-
যুচ্ছে গেল। এবং নতুন অবস্থান,—

$$1 \ 7 \ 9$$

$$5$$

আবার, অন্ত্য-অঙ্কের দ্বিগুণ $= 3 \times 2 = 6$; পরের অঙ্ক 5-এর নীচে লিখে
নতুন অবস্থান,—

$$1 \ 7 \ 9$$

$$5$$

$$6$$

এখন, $5 \times 6 = 30$; 5-এর উপরে 0 এবং 9-এর সঙ্গে 3 যুক্ত হয়ে 1820-
হলো। এখানে দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলো এবং তৃতীয় শুরু বলতে হবে। পূর্বের
ক্রমে 5-কে ভানদিকে এক-ঘর সরিয়ে নতুন অবস্থান পাওয়া গেল,—

$$1 \ 8 \ 2 \ 0$$

$$5$$


আবার, সেই পুনরাবৃত্তি। $5^2 = 25$; 25-এর 5 গেল 5-এর মাথায়, আর
2 যুক্ত হলো 0-এর সঙ্গে। ফলে $\boxed{\begin{array}{r} 18225 \\ 5 \end{array}}$ পাওয়া গেল।

এখন আর বর্গ-সংখ্যার (প্রদত্ত সংখ্যা) কোন অঙ্ক অবশিষ্ট নাই। হুতরাং
প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলো এবং নীচের 5 যুচ্ছে নির্ণেয় বর্গ সংখ্যা $= 18225$ পাওয়া
গেল।

প্রথম ভাস্কর সে-যুগে প্রচলিত এই পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তিনি

বলেন এখানে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার বর্গ ব্যবহৃত হয়, অথচ কিরূপে এই বর্গ-সংখ্যা পাওয়া যাবে তার কোন উত্তর প্রাচীন গণিতজ্ঞরা দেননি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, ভাস্কর, নারায়ণ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ সূত্রটির স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। আরো পরবর্তীকালে 'মুক্তিভাষা' গ্রন্থে এই সূত্রটির জ্যামিতিক প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় :



চিত্র—৩০

চিত্র ABCD $(a+b)$ -বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র। বাহুগুলির সমান্তরাল সরলরেখা অঙ্কন করে দুটি বর্গক্ষেত্র a^2 ও b^2 এবং দুটি আয়তক্ষেত্র পাওয়া গেল। আয়তক্ষেত্রের বাহু দুটি a এবং b । সুতরাং এই জ্যামিতিক চিত্র থেকেই প্রমাণিত হয় $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; এবং এই পদ্ধতিতেই নিয়ম-নীতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ সূত্রটিও প্রমাণ করা যায়।

॥ বর্গমূল ॥

ভারতে বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি অতি প্রাচীন। 'মূল' শব্দটি গ্রীষ্মীয় প্রথম শতাব্দীর জৈনগ্রন্থ 'অমুঘোগদ্বারমূল'-এ দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে 'মূল' শব্দের অর্থ উদ্ভিদ বা গাছের শিকড় + মূলের অল্প অর্থ কারণ, ভিত্তি ইত্যাদি। বর্গমূলের প্রকৃত অর্থ বর্গ-কারণ, উৎস বা বর্গক্ষেত্রের বাহু। ব্রহ্মগুপ্ত বর্গমূলের

সংজ্ঞায় বলেছেন ‘কৃতি’ বা থেকে বর্গ উৎপন্ন হয়। লক্ষণীয়, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্যে এই পদ্ধতির আবির্ভাব হয়নি। চতুর্থ শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার থিওনের গ্রন্থে একটি পদ্ধতি দেখা যায় বটে, কিন্তু তা ভারতীয় পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে ভারতীয় পদ্ধতিতে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করেন, তা একান্তই পক্ষপাতভূই বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে এস. এন. সেন *A Concise History of Science in India* গ্রন্থে গণিত অধ্যায়ে বলেছেন,—“In Europe, these modern methods do not appear before Cataneo (A. D. 1546). Cataldi (A. D. 1613), the author of the Trattato, was one of the first writers to use similar methods in their entirety. In the fourth century A. D., Theon of Alexandria, the noted commentator of Ptolemy’s Almagest, gave a method for approximate extraction of square roots of sexagesimal fraction, but it was approximate, algebraical and different from the Hindu method.”

প্রাচীন ভারতীয় যে পণিতগ্রন্থে বর্গমূল নির্ণয়ের সূত্র চোখে পড়ে, তা হচ্ছে আর্ষভট্টের আর্ষভট্টীয়। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

ভাগং হরেনবর্গান্নিত্যং দ্বিগুণেন বর্গমূলেন ।

বর্গাহর্গে শুদ্ধে লব্ধং স্থানান্তরে মূলম্ ॥

ভাবানুবাদ : যুগ্ম-স্থানে সর্বদা মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে ; অযুগ্ম-স্থানে সর্বদা বিয়োগ করে ভাগফল পূর্ববর্তী মূল-রেখার বসিয়ে বর্গমূল নির্ণীত হবে ।

ভাষ্যকার পরমেশ্বর এই পদ্ধতি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রদত্ত সংখ্যাকে বর্গ ও অবর্গ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে বর্গমূল নির্ণয় ক্রিয়ারে করতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণত অযুগ্ম ও যুগ্ম-স্থান উন্নয়ন ও অমুদ্রমিক বেধা দ্বারা চিহ্নিত করে বর্গমূল নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ : বর্গমূল নির্ণয় কর :

$$\begin{array}{r}
 63504 \\
 (a) \text{ নিকটতম বর্গ-অঙ্ক বিয়োগ } \begin{array}{r} \overset{1}{6} \overset{1}{3} \overset{1}{5} \overset{1}{0} \overset{1}{4} \\ \underline{4} \end{array} \left(\begin{array}{l} \text{মূল} = 2 \\ (2^2 = 4) \end{array} \right)
 \end{array}$$

(b) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ $4 \overline{) 23} \left(\begin{array}{l} 5 \\ 20 \end{array} \right. \begin{array}{l} 5 \\ 20 \end{array} \text{—মূলের পরবর্তী অঙ্ক}$
 $(2 \times 2 = 4)$

(c) ভাগফলের বর্গ দ্বারা বিয়োগ $3 \overline{) 5} \left(\begin{array}{l} 1 \\ 3 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2 \\ 6 \end{array} \text{—মূলের পরবর্তী অঙ্ক}$
 $(5 - 3 = 2)$

(d) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ $50 \overline{) 100} \left(\begin{array}{l} 2 \\ 100 \end{array} \right. \begin{array}{l} 0 \\ 0 \end{array} \text{—মূলের পরবর্তী অঙ্ক}$
 $(25 \times 2 = 50)$

(e) ভাগফলের বর্গ দ্বারা বিয়োগ $4 \overline{) 4} \left(\begin{array}{l} 1 \\ 4 \end{array} \right. \begin{array}{l} 0 \\ 0 \end{array} \text{—মূলের পরবর্তী অঙ্ক}$
 $2^2 = 4$

∴ নির্ণেয় বর্গমূল = 252

প্রদীপ কুমার মজুমদার তাঁর 'প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা' গ্রন্থে ভাস্করাচার্য পদ্ধতিতে বর্গমূল নির্ণয় করার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। আমাদের মনে হয়, ডঃ মজুমদার ভাস্করাচার্য সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে উদাহরণটি স্পষ্ট করলে ভাল করতেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁর ব্যাখ্যাত পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ আধুনিক বীজগাণিতিক পদ্ধতি বলে মনে হয়, এবং পূর্বসূরীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা যেতে পারে।

॥ ঘন ও ঘনমূল ॥

ভারতীয় গণিতে ঘন ও ঘনমূল কত প্রাচীন দে-সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে আর্যভট্ট-এর গ্রন্থে এর সূত্র আছে, এবং পরবর্তী প্রায় সব গণিতজ্ঞই এ-বিষয়ে সূত্র ও উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে ঘনমূল নির্ণয়ের সূত্র ও পদ্ধতি নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। আর্যভট্ট-এর গ্রন্থে ঘনমূল সূত্রের ত্রায় ঘন-নির্ণয়ের সূত্রও পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রটির প্রথম দিকে পাটীগাণিতিক স্বরূপ ও শেষ দিকে জ্যামিতিক স্বরূপের আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

সদৃশত্রয়বর্ণো ঘনস্তথা ত্রাদশোল্লিঃ স্যাৎ ।

অর্থাৎ সমান তিনটি রাশির ক্রমিক গুণফল এবং ছাদশ প্রান্তিকী ঘনবস্তুর ঘন বলে।

ব্রহ্মগুপ্ত আধুনিক বীজগণিতের ঘন-নির্ণয়ের সূত্রটির কথা বলেছেন। তাঁর সূত্র :

স্থাপ্যোহস্তম্বনোহস্তকৃতিস্ত্রিগুণোত্তর সংগুণা চ। ততপ্রথমং ।

উত্তরকৃতিরস্ত্যগুণা ত্রিগুণাচোত্তর ঘনস্ত ঘন ॥

ভাবানুবাদ : দুটি রাশির সমষ্টির ঘন-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিকে যথাক্রমে অস্থ্যসংজ্ঞক ও উত্তরসংজ্ঞক ধরতে হবে। অস্ত্যের ঘন, অস্ত্যের বর্গের সঙ্গে উত্তর গুণ এবং তাকে তিন গুণ করে যোগ কর; আবার অস্ত্যের সঙ্গে উত্তরের বর্গ গুণ কর, এবং তাকে তিনগুণ করে যোগ কর। শেষে উত্তরের ঘনও যোগ কর।

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় উপরের সূত্রটি প্রকাশ করলে দাঁড়ায়,—
 $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

ভাস্কর আর একটি সূত্রে $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 3ab(a+b)$ -এর কথা ম্পষ্ট করে বলেছেন। তাঁর প্রামাণিক সূত্রটি :

“খণ্ডাভ্যাং বাহতোরানিঃ খণ্ড ঘনৈক্যযুক্ত ।”

অর্থাৎ “(অথবা) সেই সংখ্যার তিন গুণকে ইহার দুইটি খণ্ডের দ্বারা গুণ করিতে হইবে। ঐ খণ্ডগুলির ঘন বাহির করিয়া যোগ করিতে হইবে।”

(প্রা. ভা. গ. চ.)

প্রথম ভাস্কর আগের মত ভারতীয় গণিতজ্ঞদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, তাঁরা ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার ঘন কিরূপে নির্ণয় করতে হবে তার কোন উত্তর দেননি।

মহাবীরচার্য অবশ্য ঘন-নির্ণয়ের আর একটি বীজগাণিতিক সূত্র দিয়েছেন :

$$x^3 = x(x+y)(x-y) + y^2(x-y) + y^3$$

॥ ত্রৈরাশিক ॥

(অস্থ্যপাত ও সমাহুপাত)

আধুনিক অস্থ্যপাত ও সমাহুপাতের অঙ্ক প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ‘ত্রৈরাশিক’ নামে পরিচিত ছিল। বকশালী পাতুলিপিতে এই নিয়মের ব্যবহার দেখা যায়; আর্ষভট থেকে শুরু করে সব গণিতজ্ঞই এ-বিষয়ে সূত্র দিয়ে আলোচনা করেছেন। জটিল সমাহুপাতের অঙ্কগুলি পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক, নবমরাশিক ও একাদশ-

ত্রাশিক হিসাবে চিহ্নিত হতো। ব্রহ্মপুত্রের পর জটিল সমাধানের অঙ্কগুলির প্রাচুর্য দেখা যায়।

দেশ-বিদেশের সব গণিতজ্ঞই ত্রৈরাশিকের উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা করেছেন। কারণ, এই নিয়মে বাস্তবে প্রযোজ্য নানা প্রকার অঙ্কের সমাধান খুব সহজে করা যায়। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা মনে করতেন গণিতে অপারদর্শীও এই নিয়মে সহজে সমস্ত সমাধান করতে সক্ষম। বরাহমিহির লিখেছেন, সূর্য যদি বছরে একবার ঘোরে, তা হলে একখণ্ড চকখড়ির সাহায্যে একজন অজ্ঞব্যক্তিও নির্দিষ্ট দিনে সূর্য কতবার ঘুরবে অতি সহজে এই নিয়মে নির্ণয় করতে পারবে।

ইউরোপে এই নিয়মটি স্বর্ণ নিয়ম (Golden Rule) নামে আখ্যাত হয়েছে। পাটীগণিতে এই নিয়মের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সব দেশের গণিতজ্ঞরাই সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। বোভন শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ রবার্ট রেকর্ড (Robert Recorde) বলেন, “the rule of proportions which for his excellency is called the Golden Rule” (Smith). অপর এক ইংরেজ গণিতজ্ঞ বলেন, “and indeed it might be so termed; for as gold transcends all other Metals, so doth this Rule all others in Arithmetick” (Smith). প্রাচীন ভারতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ভাস্কর বলেন,—

অস্তিত্ব ত্রৈরাশিকং পাটীগণিতং চ বিমলা মতিঃ ।

কিমজ্ঞাতং সূত্রক্ৰিয়ামতো মন্দার্থমুচ্যতে ॥

বর্গং বর্গপদং ঘনং ঘনপদং সত্যজ্য যদ্গণ্যতে ।

তৎ ত্রৈরাশিকমেব ভেদে বহুলং নাগুৎ ততো বিদ্যতে ॥

অনুবাদ : “ত্রৈরাশিকই পাটীগণিত, বিমলা মতিই বীজগণিত। সূত্রক্ৰিয়ামতো বাস্তবিকভাবে কি অজ্ঞাত আছে? সেইজন্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের বোধের নিমিত্ত বলা হইতেছে। বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল ব্যতীত যাহা কিছু গণিত হয়, সকলই নানা ভেদ বিশিষ্ট ত্রৈরাশিক ভিন্ন কিছুই নহে।” (যাধাবল্লভ দেবগণী কৃত অনুবাদ)

ভাস্করের মতে ত্রৈরাশিকই পাটীগণিতের সার,—নির্যাস। এই পদ্ধতিতে তিনটি রাশির ব্যবহার হয় বলে একে ত্রৈরাশিক বলা হয়। এই তিনটি রাশি হচ্ছে প্রমাণ, ফল ও ইচ্ছা। প্রাচীন ভারতের গণিতজ্ঞরা প্রায় সবাই একই ধরনের সূত্র দিয়েছেন এ-সম্পর্কে। আচার্য আর্যভট্টের সূত্র নিম্নরূপ :

ত্রৈরাশিককলরাশিঃ তমধেচ্ছারামিনা ইত্যং কৃত্বা ।

লব্ধং প্রমাণভক্তিভং তস্মাদিচ্ছাকনমিধং স্যাৎ ॥

অর্থাৎ ত্রৈশিক নিয়মে ‘ফল’ ও ‘ইচ্ছা’-র ‘গুণফলকে ‘প্রমাণ’ দ্বারা ভাগ করলে ‘ইচ্ছাফল’ পাওয়া যায়।

উদাহরণ : যদি A সংখ্যক পুস্তকের মূল্য P টাকা হয়, তা হলে R -সংখ্যক পুস্তকের মূল্য কত ?

এখানে, A = ‘প্রমাণ’, P = ‘ফল’ ও R = ‘ইচ্ছা’

অতরাং ইচ্ছাফল = $\frac{P \times R}{A}$ টাকা।

ত্রৈশিক বিষয়ে আর একটিমাত্র সূত্রের উল্লেখ করা যাক। এই সূত্রটির স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি যে প্রায় আর্ষভটেরই অনুসরণ করেছেন তা দেখাবার জন্যেই সূত্রটি উদ্ধৃত হলো :

ত্রৈশিকিক প্রমাণং ফলমিচ্ছাত্তয়ো সদৃশরাশি।

ইচ্ছাফলেন গুণিতা প্রমাণভক্তা ফলং ভবতি ॥

অনুবাদ : ত্রৈশিকিক প্রমাণ ও ইচ্ছা সদৃশ ; এ দুটি ও ইচ্ছা-সম্পর্কিত ফল ভিন্ন প্রকার। ফলকে ইচ্ছা দিয়ে গুণ করে প্রমাণ দিয়ে ভাগ করলে ইচ্ছা-সম্পর্কিত ফল লাভ হয়।

‘বৌগিক সমাহরণাতের ক্ষেত্রে পঞ্চরশিক, সপ্তরশিক ইত্যাদি নিয়মের প্রয়োগ হয়। ভাস্কর ব্যাস্ত-ত্রৈশিকিকের প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি ত্রৈশিকিক নিয়মের বিপরীত প্রক্রিয়া। ধুব সন্তব ব্যাস্ত-ত্রৈশিকিকের কথা সর্বপ্রথম ব্রহ্মগুপ্ত বলেন। তাঁর সূত্র :

ব্যাস্ত ত্রৈশিকিকফলমিচ্ছাত্তয়ো প্রমাণফলঘাতঃ।

ত্রৈশিকিকাদিহু ফলং বিষমেষেকাদশান্তেষু ॥

অনুবাদ : “প্রমাণ এবং ইচ্ছার মধ্যে যেটি ভিন্ন জাতীয় তাকে প্রমাণ দিয়ে গুণ করে ইচ্ছা দিয়ে ভাগ দিলে ব্যাস্ত ত্রৈশিকিক পাওয়া যায়।” (প্রা. ভা. গ. চ.)

পঞ্চরশিক, সপ্তরশিক ইত্যাদি অর্থাৎ বহুরশিক সম্বন্ধে আর্ষভটের গ্রন্থে সম্পষ্ট কোন সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রধান আর্ষভট-অনুবাগী প্রথম ভাস্কর তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে আর্ষভট কৃত ত্রৈশিকিক সূত্রের মধ্যেই বহুরশিকের নিয়মের আভাস আছে, আর্ষভট পৃথকভাবে দিতে বাহুল্যবোধ করেছেন। কারণ, পঞ্চরশিক দুটি ত্রৈশিকিক দিয়ে, সপ্তরশিক তিনটি ত্রৈশিকিক দিয়ে সমাধান করা যায়। অবশ্য ব্রহ্মগুপ্ত, ব্রীধব, ভাস্কর, মহাবীর প্রমুখ গণিতজ্ঞরা

এদের সূত্রাদি দিয়েছেন, এবং ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাষ্যকার পৃথ্বীকাম্যী উদাহরণ নিয়ে আলোচনাও করেছেন।

তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যদি তিনমাসে একশ* টাকার হুদ হয় টাকা হয়, তা হলে পাঁচ মাসে ষাট টাকার হুদ কত ?

সমাধান :

$$\begin{array}{r|l} 3 & 5 \\ 100 & 60 \\ 10 & \end{array} \quad \text{তারপর} \quad \begin{array}{r|l} 3 & 5 \\ 100 & 60 \\ 10 & \end{array}$$

$$\therefore \text{হুদ} = \frac{5 \times 60 \times 10}{3 \times 100} = 10 \text{ টাকা।} \bullet$$

বিশ্বগণিতে ভারতীয়দের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অবদান ত্রৈমাসিক ইত্যাদি। এই নিয়মের ঔজ্জ্বল্যে বিশ্বের অসংখ্য গণিতজ্ঞরা এমন অভিভূত হয়েছিলেন যে, মূল নামটি পর্যন্ত বিদেশী ভাষায় প্রায় অবিকৃত আছে। Smith তাঁর গণিতের ইতিহাসে এর উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন,—“The Mercantile Rule of Three seems to have originated among the Hindus.....the name is also found among the Arab and medieval Latin writers.”

* প্রা. ভা. গ. চ.—প্রদীপকুমার মজুমদার।

ষোড়শ অধ্যায়

“Both the form and the spirit of arithmetic and Algebra of modern times are essentially Indian and not Grecian.”

—F. Cajori

বীজগণিত

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন যুগের গণিতজ্ঞদের জীবন ও অবদান বিষয়ক আলোচনার বীজগণিতিক ধারণার অল্পপ্রবেশ ঘটেছে। তবুও এই অধ্যায়ে বীজগণিত সম্পর্কে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের ধারণার একটি মোটামুটি সুশৃঙ্খল আলোচনার অবতারণা করা হলো। আমাদের বিশ্বাস, অনিবার্যভাবে পূর্ব-আলোচিত তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও পাঠক-পাঠিকা এ-সম্পর্কে একত্র সমাবেশিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।

গণিতের বিভিন্ন শাখা ও নানা বিষয়ের মত বীজগণিতের উদ্ভবকাল সম্পর্কেও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে শুদ্ধযুগে যে এই বিষয়টির অস্তিত্ব পূর্ণ মাত্রায় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নাই। ভারতে সম্ভবত বীজগণিতের অস্তিত্ব জ্যামিতির মধ্যে নিহিত ছিল। অর্থাৎ নানা জ্যামিতিক সমস্তার সমাধান করতে গিয়েই বীজগণিতের উদ্ভব হয়ে থাকবে। এ-বিষয়ে ডঃ টি. এ. সরস্বতীর মন্তব্য : “.....The basis and inspiration for the whole of Indian mathematics is geometry.” শূবস্বত্রের আলোচনার দেখা গেছে, ভারতীয় গণিতজ্ঞরা জ্যামিতির সাংখ্যিক তথা পাটীগণিতিক দিকটির প্রতি সর্বাধিক আকৃষ্ট ছিলেন, আর নানা প্রকার জ্যামিতিক বেদী ও অগ্নি-নির্মাণে সমীকরণ সমাধান তো অপরিহার্য ছিল। প্রদত্ত একটি বাহু দ্বারা কোন বর্গক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র অঙ্কনে $ax=c^2$ ধরনের সমীকরণ সমাধান জানতেই হতো। মহাবেদী ও শ্রেণ-চিহ্নিত নির্মাণে সমীকরণ সমাধানই ছিল একমাত্র হাতিয়ার। মহাবেদী নির্মাণে নিয়রূপ সমীকরণ সমাধান করতে হতো :

$$36x \times \frac{(24x+30x)}{2} = 36 \times \frac{(24+30)}{2} + m$$

$$\text{বা, } 972x^2 = 972 + m$$

$$\text{বা, } x = \sqrt{1 + \frac{m}{972}}$$

আবার, স্তোত্র-চিহ্নে নির্মাণে নীচের সমীকরণটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় :

$$2x \times 2x + 2\left\{x + \left(x + \frac{x}{5}\right)\right\} + x \times \left(x + \frac{x}{10}\right) = 7\frac{1}{2} + m$$

উল্লেখযোগ্য যে, এ দু-ধরনের সমীকরণের সমাধান শতপথ ব্রাহ্মণ-এ দেখা যায়।

এ-সব তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ঋগ্বেদীয় যুগের পূর্বেই ভারতে বীজগণিতের উদ্ভব হয়েছিল; পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দু-হাজার অব্দ এর উৎপত্তিকাল।

গণিতে বীজগণিতের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গণিতজ্ঞদের মধ্যে বিমত নাই। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন; তাই পাটীগণিত ও বীজগণিতের পৃথক পৃথক স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন, বিবং সমাজে তিনিই গণিতাচার্য আখ্যা পান যিনি চূর্ণন, শূন্য, ধনাত্মক, ঋণাত্মক, অজ্ঞাতরাশি, মধ্যপদের অপনয়ন, একঘাত সমীকরণ, বর্গ-প্রকৃতি বিষয়ে পারদর্শী। স্বয়ং ব্রহ্মগুপ্ত বর্গ-প্রকৃতি বা দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ-এর বীজ নির্ণয়ে অসামান্য পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই সম্পর্কিত তাঁর শ্লোকটি :

প্রায়শে যতঃ প্রজ্ঞাঃ কুট্টাকারাদৃতে ন শক্যন্তে ।

জ্ঞাতুং বক্ষ্যামি ততঃ কুট্টাকারং সহ প্রায়ঃ ॥

কুট্টকখণ্ডনাব্যক্তমধ্যাহরগৈকবর্ণভাবিত কৈঃ ।

আচার্যস্তত্ত্ববিদাং জ্ঞাতৈর্বর্গপ্রকৃত্যা চ ॥

বীজগণিতের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভাস্কর্যের ধারণা আরো স্পষ্ট। পাটীগণিত ও বীজগণিতের পার্থক্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি :

দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং

ব্যক্তং পাটীগণিতং অব্যক্তং বীজগণিতং ।

অর্থাৎ গণিত দু-প্রকার,—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত গণিতই বীজগণিত।

জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষীদের পার্থক্য বিষয়ে ভাস্কর্য একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

দ্বিবিধগণিত যুক্তং ব্যক্তমব্যযুক্তং

তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পট্টিষ্ঠঃ ।

যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং সূরিভেদং

প্রপঠিতুমধিকারী নোহুত্থা নামধারী ॥

অনুবাদ : “ব্যক্তগণিত (পাটীগণিত) ও অব্যক্তগণিত (বীজগণিত) নামক দ্বিবিধ গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং শব্দশাস্ত্রে (ব্যাকরণে) পটীয়ায় ব্যক্তিই বহুভেদ বিশিষ্ট এই জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী, অত্থা কেবল জ্যোতিষী নামধারী হইয়া থাকে ।”

ভাস্কর অত্ৰ বলছেন, ‘বিমলমতি’-ই বীজগণিত। ‘বিমলমতি’ বলতে ভাস্কর খুব সম্ভব বিষয়টি উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বোধগম্য—এই ইঙ্গিত করেছেন। আর অব্যক্ত বলতে তিনি চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে অজ্ঞাতবাশি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বলে মনে হয়।

ভারতে বীজগণিতের সূচনা প্রায় চার হাজার বছর আগে হলেও, অর্ধভট-ব্রহ্মগুপ্তের পর এই শাখার বিকাশ ও সমৃদ্ধি অষ্টম শতাব্দীতে হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর আগে ‘বীজগণিত’ শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। ব্রহ্মগুপ্তের বিখ্যাত ভাষ্যকার চতুর্বেদাচার্য পৃথুদকবামী এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন বলে জানা যায়।

॥ চিহ্ন ও সংকেত ॥

উপযুক্ত চিহ্ন ও সংকেত ব্যতিরেকে গণিতের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। এডওয়ার্ড কাসনারের একটি মন্তব্য এ-বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। “Mathematics is the Science in which one uses easy words for hard ideas.” আধুনিক গণিতে বর্ণমালার বর্ণ ও বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন সাদরে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ভারতেও গণিতজ্ঞরা সংকেত ও চিহ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সংস্কৃত শব্দের প্রথম অক্ষর ব্যবহার করেছেন। যেমন,—যোগ বা যুক্ত বোঝাতে ‘যু’, বিয়োগ বোঝাতে ‘+’ ইত্যাদি। বিয়োগ ও ভাগের সংকেতে একটা শৃঙ্খলা দেখা যায় ; কিন্তু অত্ৰ কখনো কখনো পূর্ণশব্দ বা কিছুই ব্যবহার করা হতো না। অত্ৰের প্রকৃতি ও প্রসঙ্গ থেকে প্রক্রিয়াটি বুঝে নিতে হতো।* বকশালী পাতুলিপি থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

* এ-বিষয়ে লেখকের ‘গণিতের ললিত পাঠ’ পুস্তকে ‘প্রত্যেক চিহ্নের উৎপত্তির কাহিনী’ শৃঙ্খল।

$$(1) \frac{0}{1} \frac{5}{1} \text{ যু} = \frac{x}{1} + \frac{5}{1}$$

$$(2) \left| \begin{array}{cc|cc} 0 & 5 & \text{যু} & \text{যু} & 0 \\ 1 & 1 & & & 1 \end{array} \right| \text{ স } \left| \begin{array}{cc|cc} 0 & 7 & \text{যু} & 0 \\ 1 & 1 & & & 1 \end{array} \right|$$

আধুনিক বীজগণিতের ভাষায়, $\sqrt{x+5}=m$ এবং $\sqrt{x-7}=n$

$$(3) 12\bar{7}$$

$$=12-7=5$$

[এখানে বিন্দু (.) দ্বারা বিয়োগ বোঝানো হয়েছে।]

$$(4) \left\| \begin{array}{cccccc|c} 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 10 & \text{ঙ} \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \end{array} \right\| = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 10$$

[এখানে 'ঙ' দ্বারা গুণ বোঝানো হয়েছে।]

$$(5) \frac{0}{1} \left\| \begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{array} \right\| \frac{2}{1} \frac{5}{2} + \left\| \begin{array}{cc} 3 & 7 \\ 1 & 2 \end{array} \right\| \frac{4}{1} \frac{9}{2} \left\| \begin{array}{cc} 4 & 9 \\ 1 & 2 \end{array} \right\|$$

উপরের বিশেষ সংকেত ও চিহ্নাদি আধুনিক বীজগণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

$$x \left(1 + \frac{3}{2} \right) + \left\{ 2x \left(1 + \frac{3}{2} \right) - \frac{5x}{2} \right\} + \left\{ 3x \left(1 + \frac{3}{2} \right) - \frac{7x}{2} \right\} + \left\{ 4x \left(1 + \frac{3}{2} \right) - \frac{9x}{2} \right\}$$

এখানে পাণ্ডুলিপির '+'=বিয়োগ ও 'ঙ'=গুণ, এই সংকেত ও চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

॥ অজ্ঞাত রাশি ॥

অজ্ঞাত রাশি অর্থে জৈন গণিতে 'ধাবৎ-তাবৎ' ব্যবহৃত হতো; পাণ্ডুলিপি যুগে অজ্ঞাতরাশি অর্থে '০', 'যদৃচ্ছা', 'বাহ্বা', 'কামিক' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আর্যভট 'গুলিকা' শব্দটি অজ্ঞাতরাশির অর্থে গণিতপাদের ত্রিশতম শ্লোকে ব্যবহার করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর শ্লোকটি:

গুলিকান্তরেন বিভজেদ্ দ্বয়োঃ পুরুষয়োস্ত রূপকবিশেষম্।

লবং গুলিকায়ল্যং যদ্যর্থকৃতং ভবতি তুল্যম্ ॥

প্রথম ভাস্কর বলেছেন, 'গুলিকা' ও 'ধাবৎ-তাবৎ' সমার্থক। অবশ্য আর্যভট

অজ্ঞাতরাশি বোঝানোর জন্য ‘বর্ণ’ (বঙ) ব্যবহারও করেছেন। ব্রহ্মগুপ্তও ‘বর্ণ’ ব্যবহার করেছেন, আর ‘অব্যক্ত’ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর ‘বর্ণ’ বঙ না অল্প কিছু বোঝা কঠিন। বর্ণমালার বর্ণের কথা বলাও সম্ভব বলে মনে হয়। বা হোক, প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত রাশি বোঝানোর জন্য আরো অনেক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন,—কালিকা, নীলক, পাটলক, মোহিতক, হীরতক, শ্বেতক, চিত্রক, কপিলক, শিল্লক, ধূতক, পীতক, শবলক, শ্যামলক, মেচক ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই বর্ণজ্যোতক। এ-সম্পর্কে শ্রীপতি সিদ্ধান্ত শেখর গ্রন্থে বলেছেন,—

যাবতাবৎ কালকো নীলকাদ্যা

বর্ণাঃ কল্প্যা নূনমব্যক্তয়ানে ।

তেষাং তুল্যা ভাস্বতঃ স্ফোটগমাহি

সবর্ণঃ সাত্তাবিতং চাপমামম্ ॥

মমার্থ হচ্ছে, “অব্যক্ত রাশির মান,—বাবৎ-তাবৎ, কালক, নীলক প্রভৃতি কল্পনা করিবে।... ..” (প্রা. ভা. গ. চ.)

শ্রীধরের ত্রিশতিকা-র একটি সমাস্তর শ্রেণীতে একরূপ সংক্ষেপে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় :

| আদি 20 | উ 0 | গচ্ছঃ 7 | গণিতম্ 245 |

এখানে, আদি=প্রথম পদ, গচ্ছঃ=পদসংখ্যা, গণিতম্—সমষ্টি এবং উ=উত্তর। কিন্তু যেখানে একাধিক অজ্ঞাতরাশি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে ‘প্র’, ‘দ্বি’, ‘ত্ৰি’ বথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

॥ সহগ ॥

‘সহগ’-র বিশেষ উল্লেখ প্রাচীন কোন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মগুপ্ত মাত্র একবার ‘সহগ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এবং মনে হয় তাতে তিনি সংখ্যা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি বহুবার ‘গুণক’ বা ‘গুণকান্ন’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,—“গুণক গুণাদিষ্ট বৃত্ত..”, “গুণকে প্রথমং” ইত্যাদি। পৃথুদকবামী ‘অঙ্ক’ ও ভাস্কর ‘ক্লগ’ অর্থে ‘সহগ’ বোঝাতে চেয়েছেন।

॥ ঘাত ॥

একথা সত্য ঘাত বা শক্তি-র উল্লেখ জৈনগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ভদ্রবাহুর উত্তরাধ্যায়ন সূত্র গ্রন্থে দ্বিতীয় ঘাতকে বর্গ, তৃতীয় ঘাতকে ঘন, চতুর্থ ঘাতকে বর্গ-বর্গ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এমন কি, অমুযোগদ্বার সূত্র গ্রন্থেও পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশের ঘাতের উল্লেখ আছে। কিন্তু ওইসব গ্রন্থে এর বৈজ্ঞানিক নামকরণের অভাব দেখা যায়। এ-বিষয়ে যিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মগুপ্ত। -‘গত’ প্রত্যয় যুক্ত করে নামকরণে নতুনত্ব আনা তাঁর গাণিতিক প্রতিভার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন,—পঞ্চঘাত-কে তিনি বলেছেন ‘শঙ্কগত’; একুপ অত্রত্রও-‘গত’ প্রত্যয় যুক্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় গণিতে বর্গের সন্ধেতে ‘ব’ এবং ঘন-র সন্ধেতে ‘ঘ’ দেখা যায়। চতুর্থ ঘাত বোঝাতে ‘ব-ব’, বষ্ঠ ঘাতে ‘ঘ-ব’ দেখা যায়। দুই বা ততোধিক রাশির গুণফল বোঝাতে ‘ভা’,—‘ভাবিত’-র সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহারও অপ্রতুল নয়। বর্গমূল বোঝাতে ভাস্কর করণীর সংক্ষিপ্তরূপ ‘ক’ ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

$$\text{ক } 9 \text{ ক } 450 \text{ ক } 75 \text{ ক } 54 = \sqrt{9} + \sqrt{450} + \sqrt{75} + \sqrt{54}$$

আবার, বর্গমূল অর্থে ‘মু’ ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন,—

$$\left| \begin{array}{ccc} 11 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right| = \sqrt{11+5} = 4$$

॥ ধ্রুবক রাশি ॥

ধ্রুবক বা ধ্রুবক রাশি বোঝাতে একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বকশালী পাণ্ডুলিপিতে ‘দৃশ্য’ ও পরবর্তীকালে ‘দৃশ্য’-এর পরিবর্তে ‘রূপ’ শব্দটি প্রাধান্য পায়। যেমন,—

$$\text{যা ব } 0 \text{ যা } 10 \text{ রূ } 8 = x^0 + x \cdot 10 - 8$$

॥ চিহ্নের সূত্র ॥

বীজগাণিতিক চিহ্ন সম্পর্কে প্রাচীন কোন গ্রন্থে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের চিহ্ন সম্পর্কিত সূত্র থেকে অনুমিত হয় তাঁর পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন, দুটি ধনরাশির সমষ্টি ধনরাশি, দুটি ঋণরাশির সমষ্টি ঋণরাশি, এবং ধনরাশি ও ঋণরাশির সমষ্টি উভয়ের অন্তর। আচার্য

ব্রহ্মগুপ্তের উত্তরসূরীরা সন্দেহাতীতচিত্তে এই সূত্র মেনে নিয়েছেন। মহাবীর, ভাস্কর, শ্রীপতি, নারায়ণ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা নতুন কিছু সংযোজনের অবকাশ পাননি। এ প্রসঙ্গে শ্রীপতির সিদ্ধান্তশেখর থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

ঐক্যং যুতো স্যাৎ জয়য়োঃ অয়োশ্চ

ধনর্পর্যন্তরম্বেব যোগঃ ।

সংশোধ্যমানং যুগ্মং তথর্থাৎ

ধনং ভবেদন্তবদজ যোগঃ ॥

অর্থাৎ দুটি ধনরাশির বা ঋণরাশির যোগ হয়। একটি ধন অপরটি ঋণ হলে তাদের অন্তর হবে যোগ। বিবোধ্য ধন হলে বিয়োগের জায়গায় ঋণ হবে, আর এরূপ ঋণরাশি ধন হবে। তদনন্তর এদের যোগ হবে।

আধুনিক গাণিতিক চিহ্ন ও সঙ্কেতে সূত্রগুলি :

(i) $2a + a = 3a$ (ধনরাশি + ধনরাশি = ধনরাশি)

(ii) $-2a - a = -3a$ (ঋণরাশি + ঋণরাশি = ঋণরাশি)

(iii) $2a - a = a$ (ধনরাশি + ঋণরাশি = অন্তর)

॥ বিয়োগ ॥

বৌদ্ধগণিতে বিয়োগ করার সময় একটি রাশির চিহ্ন পরিবর্তন করা হয়। ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীপতি, ভাস্কর, নারায়ণ প্রমুখ এই একই নিয়ম ব্যবহার করেছেন। মহাবীর গণিত-সার-সংগ্রহ-এ বলেছেন, ধনরাশিকে বিয়োগ করলে ঋণরাশি হয়, আর ঋণরাশির ক্ষেত্রে ধনরাশি হয়। ভাস্করও একই কথা বলেছেন। কেবল তিনি বলেছেন বিয়োগ-প্রক্রিয়ার অতঃপর পূর্বের স্থায় যোগ করতে হবে। এখানে আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের নিয়মটি উদ্ধৃত হলো :

ধনয়োৰ্ধনমৃগমৃগয়োৰ্ধনর্পর্যন্তরং সন্মৈক্যংথম্ ।

ঋণমৈক্যং চ ধনমৃগধন শূন্যয়োঃ শূন্যয়োঃ শূন্যম্ ॥

অনুবাদ : বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র বিয়োগ করলে ধনাত্মক, ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক বিয়োগ করলে ধনাত্মক, আবার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বিয়োগ করলে বিপরীত অর্থাৎ ঋণাত্মকটি ধনাত্মক ও ধনাত্মকটি ঋণাত্মক হবে। ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক বিয়োগ অথবা ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক বিয়োগ দিতে গেলে যোগ করতে হয়। (প্রা. ভা. গ. চ.)

বর্তমান গাণিতিক চিহ্ন ও সংক্ষেপে সূত্রগুলি :

a ও b দুটি ধনরাশি হলে,

প্রথম সূত্র :
$$\begin{array}{r} a \qquad a \\ +b \rightarrow -b \end{array}$$

আবার, a ধনরাশি ও b ঋণরাশি হলে,

দ্বিতীয় সূত্র :
$$\begin{array}{r} a \qquad a \\ -b \rightarrow +b \end{array}$$

॥ গুণন ॥

গুণনের নিয়ম সম্পর্কে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। ব্রহ্ম-গুপ্ত, ভাস্কর, মহাবীর, শ্রীপতি প্রমুখ গণিতজ্ঞ একই কথা বলেছেন। ভাস্কর তাঁর সিদ্ধান্ত-শিরোমণি-র বীজগণিত অংশে বলেছেন, দুটি ধনসংখ্যা বা ঋণসংখ্যার গুণফল ধনসংখ্যা এবং ধনসংখ্যা ও ঋণসংখ্যার গুণফল ঋণসংখ্যা। গণিতের ভাষায়,—

(i) $+a \times +b = ab$, (ধনসংখ্যা \times ধনসংখ্যা = ধনসংখ্যা)

(ii) $-a \times -b = +ab$, (ঋণসংখ্যা \times ঋণসংখ্যা = ধনসংখ্যা)

(iii) $+a \times -b = -ab$, (ধনসংখ্যা \times ঋণসংখ্যা = ঋণসংখ্যা)

(iv) $-a \times +b = -ab$, (ঋণসংখ্যা \times ধনসংখ্যা = ঋণসংখ্যা)

গুণনের নিয়ম সম্পর্কে আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের মতটি খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন দুটি সম-অজ্ঞাত রাশির গুণফল হবে বর্গ, তিন বা ততোধিক সম-অজ্ঞাত রাশির গুণফল হবে সহগ ও ঘাত অনুসারে। অসম-অজ্ঞাতরাশির গুণফল হবে ‘ভাবিত’ অর্থাৎ পরস্পরের গুণনের দ্বারা। ভাস্কর ও নারায়ণের গ্রন্থে একই নিয়ম দেখা যায়। সূত্রের আকারে প্রকাশ করলে,—

(i) $a \times a = a^2$

(iii) $a \times 2b \times 3c = 6abc$

॥ ভাগ ॥

ভাগ সম্পর্কে আলোচনা ব্রহ্মগুপ্তের সময় থেকেই দেখা যায়। তিনি ব্রহ্মস্মৃতি-সিদ্ধান্তে এ-বিষয়ে সূত্রও দিয়েছেন। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

ধনভক্তঃ ধনমুণকভমুণং ধনং ভবতি ধং খভক্তং খম্ ।

ভক্তমুণেন ধনমুণং ধনেন কভমুণমুণং ভবতি ॥

এই শৃঙ্খলের আধুনিক রূপ হচ্ছে :

$$(1) a \div b = \frac{a}{b}; (2) -a \div -b = \frac{a}{b}; (3) -a \div b = -\frac{a}{b};$$

$$(4) a \div -b = -\frac{a}{b}$$

আচার্য ভাস্করও ভাগের নিয়ম সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন, অজ্ঞাতরাশি যাই হোক না কেন ভাজককে পৃথক পৃথকভাবে গুণ করে এবং প্রতি ক্ষেত্রে ভাজ্য থেকে বিয়োগ করে যখন কোন অবশিষ্ট থাকবে না, তখন বিভিন্ন সোপানের ভাগফলই প্রকৃত ভাগফল নির্ণয় করবে।

a =ভাজ্য, b =ভাজক ও Q ভাগফল হলে যদি q_1, q_2, q_3 ইত্যাদি বিভিন্ন সোপানের ভাগফল হয়, তা হলে,—

$$Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots$$

ভারতীয় গণিতে আটটি প্রাথমিক নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু বীজগণিতে ঘন ও ঘনমূল প্রাথমিক নিয়মের মধ্যে পড়ে না বলে এখানে ছ'টি প্রাথমিক নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু ভাস্কর ঘন ও ঘনমূল বীজগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বেশীর ভাগ ভারতীয় গণিতজ্ঞ ঘন ও ঘনমূল প্রাথমিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেননি সম্ভবত একটি কারণে যে, বর্গ ও ঘন-র মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই এবং এদের মধ্যে সম্পর্কটিও সুস্পষ্ট। ব্রহ্মগুপ্তের পর প্রায় সব গণিতজ্ঞই $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ বা $a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$ সূত্রটি পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মধ্যযুগের 'ক্রিয়াকর্মকারী' গ্রন্থে এই শৃঙ্খলের যে জ্যামিতিক প্রমাণ দেখা যায় তাতে এর পাটীগণিতিক স্বরূপই প্রকটিত হয়েছে।

উদঘাতন ও অবঘাতন সম্পর্কে প্রায় সব ভারতীয় গণিতজ্ঞই আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্তের মতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক রাশির বর্গ করা যায়; মহাবীর বলেন, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক রাশির বর্গ হবে ধনাত্মক। আর এদের বর্গমূলও ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হবে। কিন্তু ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল হবে না।

এ প্রসঙ্গে $x^2 + 1 = 0$ এই সমীকরণের বীজ নির্ণয় নিয়ে যে সব বিতর্ক বহুদিন ধরে গণিতে চলেছিল, আর কিভাবে কাল্পনিক রাশি i -এর উৎপত্তি হলো তা খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু মহাবীর সেই নবম-দশম শতাব্দীতে তাত্ত্বিকভাবে ঋণাত্মক রাশির বর্গমূল স্বীকার করেছিলেন, একথা তাবলে তাঁর গাণিতিক প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হতে হয়।

ভাস্কর বীজগাণিতিক যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে একই ‘জাতি’ অর্থাৎ সদৃশ রাশির ক্ষেত্রে এটা সম্ভব, আর ভিন্ন ‘জাতি’-র ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তাঁর সংশ্লিষ্ট সূত্র :

যোগোহন্তরং তেষু সমানজাত্যোষিভিন্ন জাত্যোশ্চ পৃথক্ স্থিতিশ্চ ।।

আধুনিক গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

(i) $a + 2a + 3a = 6a$

(ii) $a + 2b + 3a + b + c = 4a + 3b + c$

॥ সমীকরণ ॥

বীজগণিত শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য সমীকরণ গঠন। ত্রৈরাসিক যেমন পাটীগণিতের সার, সমীকরণ তেমনি বীজগণিতের সার। যে জাতি প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখায় বিশ্বয়কর উন্নতি করেছিল, তারা যে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সমীকরণের সহজ পথটি আবিষ্কার করবে, তাতে বিশ্বাসের কিছু নাই। জৈন গণিতে বীজগাণিতিক সমীকরণের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর স্থানাজ সূত্র-এ সরল, দ্বিঘাত, ত্রিঘাত ও চতুর্ঘাত সমীকরণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না, খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন কিনা। কিন্তু আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের সময় থেকে যে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং শ্রেণীকরণ সুসম্পন্ন করেছিলেন, এ-সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। সমীকরণ অর্থে ‘সম-করণ’, ‘সমী-করণ’, ‘সদৃশী-করণ’ শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

বকশালী পাতুলিপি ও আর্যভট্টীয় গ্রন্থে সমীকরণ দেখা যায়। আর্যভট্ট সমাধান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলেও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলেননি। এ-বিষয়ে ব্রহ্মগুপ্ত অনেকখানি অগ্রসর বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি অজ্ঞাতরাশির মাত্রার উপর নির্ভর করে শ্রেণী বিভাগ করেননি; অপরপক্ষে, অজ্ঞাতরাশির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সমীকরণের তিনটি বিভাগ করেছেন :

(i) একবর্ণ সমীকরণ (Equation with one unknown)

(ii) অনেকবর্ণ সমীকরণ (Equation with several unknowns)

(iii) ভাবিত (Equation involving products of unknowns)

বা ব ০ বা ১০ ক ৪

বা ব ১ বা ০ ক ১

[এখানে ষা—অজ্ঞাতরাশি, ব—বর্গ, ক—ধ্রুবক]

আধুনিক গাণিতিক সঙ্কেত-চিহ্নে সমীকরণটি,—

$$x^2 \cdot 0 + x \cdot 10 - 8 = x^2 \cdot 1^2 + x \cdot 0 + 1$$

$$\text{বা, } 10x - 8 = x^2 + 1$$

$$\text{বা, } x^2 - 10x + 9 = 0$$

এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করার মত। সমীকরণটিতে অজ্ঞাতরাশির পদগুলি অধঃক্রমে সজ্জিত হয়েছে; সহগ-গুলি অজ্ঞাতরাশির পরে বসেছে এবং চরম বা ধ্রুবক রাশিটি শেষে স্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Smith তাঁর History of Mathematics গ্রন্থে বলেছেন,—“The Hindu method was better than the Chinese, and in this respect was the best that has ever been suggested.....such a plan shows at a glance the similar terms one above another, and permits of easy transposition.”

॥ একবর্গ সমীকরণ ॥

একমাত্রার সরল সমীকরণকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় : (a) একটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ, (b) দুটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ এবং (c) তিন বা ততোধিক অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ।

একটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একমাত্রার সরল সমীকরণ সমাধানের অনেক রকম পদ্ধতির কথা প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। শুষ্কযুগে এ-ধরনের সমীকরণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। জৈন গণিতে ষাবৎ-ভাবৎ-এর কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সমস্ত্রাকারে এরকম সমীকরণ দেখা যায়। বকশালী পাণ্ডুলিপিতেও সমস্ত্রাকারে এ-ধরনের সমীকরণ আছে। একটি উদাহরণ :

চার ব্যক্তির মধ্যে ১৩২ টাকা একরূপভাবে ভাগ করে দাঁও বেন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির দ্বিগুণ, তৃতীয় দ্বিতীয়ের তিনগুণ ও চতুর্থ তৃতীয়ের চারগুণ পায়।

সমীকরণের আকারে প্রকাশ করলে,—

$$x + 2x + 6x + 24x = 132$$

$$\text{বা, } 33x = 132$$

$$\text{বা, } x = 4$$

সুতরাং, প্রথম ব্যক্তি ৪ টাকা, দ্বিতীয় ব্যক্তি ৪ টাকা, তৃতীয় ব্যক্তি ২৪ টাকা এবং চতুর্থ ব্যক্তি ৯৬ টাকা পায়।

$ax + c = bx + d$ —এই ধরনের সমীকরণ নিয়ে আর্থভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, ভাস্কর প্রমুখ আলোচনা করেছেন। আর্থভটের এই সম্পর্কিত সূত্র ‘ভূনিকান্তরেন’ ইত্যাদি আমরা উদ্ধৃত করেছি। তাঁর সূত্রটির আধুনিক গাণিতিক রূপ :

$$ax + c = bx + d$$

$$\text{বা, } x = \frac{d - c}{a - b}$$

শ্রীপতির সিদ্ধান্ত শেখর গ্রন্থে পক্ষান্তর করার নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পদ্ধতি :

অব্যক্ত বিশেষকর্তে প্রতীপ-

রূপান্তরেহব্যক্তমিতী ভবেত্তাম্।

সাহবা যুতোনহতভক্ত মিচ্ছে-

তদাহন্যপক্ষে বিহ্নিতে তথৈব।

অর্থবাদ : “একবর্ণ সমীকরণ স্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের বর্ণকে যোগ বা বিয়োগ করিয়া একপক্ষে আনয়ন করিবে এবং রূপবানিকে ঐভাবে অন্তপক্ষে লইয়া যাইবে ; অতঃপর অব্যক্তের রূপবাশি দ্বারা ব্যক্ত রাশিকে ভাগ করিলে অব্যক্ত মান পাওয়া যাইবে।”

॥ ইষ্টকর্ম-পদ্ধতি ॥

একটি মাত্র অজ্ঞাত রাশি সমন্বিত একঘাত সমীকরণের একটি নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারক হচ্ছেন ভাস্কর। ভাস্কর এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন ‘ইষ্টকর্ম’। লীলাবতী-তে সংজ্ঞা ও উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। একটি ঐচ্ছিক সংখ্যা ধরে এ-ধরনের সমীকরণ সমাধান করাই রীতি।

ভাস্কর নিয়মটি বিবৃত করে বলেছেন, একটি ঐচ্ছিক সংখ্যা ধরে সমস্তার

সর্ত্তানুসারে চার নিয়মের সাহায্যে যে ফল পাওয়া যাবে, জ্ঞাতরাশি ও ঐচ্ছিক রাশির গুণফলকে পূর্বফল দ্বারা ভাগ করলে ঐচ্ছিক ফল পাওয়া যাবে।

এই পদ্ধতিতে সমাধান করতে গিয়ে ভাস্কর দুটি উদাহরণ দিয়েছেন,—একটি সম্পূর্ণ গণিত-ভাবনামূলক এবং অপরটি কাব্যরসমণ্ডিত একটি মনোরম সমস্যা। শেষের উদাহরণটি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার আছে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে যে-সব সরস কাব্যগুণমণ্ডিত অঙ্ক দেখা যায়, তা থেকে মনে হয়, সে-যুগে গণিতচর্চা কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ মানুষের মধ্যে গণিতের স্বল্প প্রশংসী ফল প্রলম্বিত করার জন্য গণিতজ্ঞরা চিন্তা করতেন, এবং গণিতকে রমণীয় করে তোলার জন্য সার্থক প্রয়াস চালাতেন। গণিতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ক্যাজবির মন্তব্যটি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণযোগ্য : “The pleasing poetic garb in which all arithmetical problems are clothed is due to the Indian practice of writing all school books in verse, and especially to the fact that those problems, propounded as puzzles, were a favourite social amusement.” কেবলমাত্র পাটীগণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রেই নয়, বীজগণিতিক সমস্যার ক্ষেত্রেও উক্তিটি সমভাবে প্রযোজ্য।

উদাহরণ : “একটি হস্তীর দল হইতে ইহার তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেক বন মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। ইহার সপ্তমাংশের সহিত একের ষষ্ঠাংশ নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। ইহার অষ্টমাংশের সহিত পদ্মবনে খেলা করিতে গিয়াছিল। দলপতিকে তিনটি হস্তিনীর সহিত দেখা গেল। সেই দলে কতগুলি হস্তী ছিল ?” (অঙ্কভাবনা)*

হস্তী-সংখ্যা = x ধরলে নিম্নরূপ বীজগণিতিক সমীকরণ পাওয়া যায় :

$$x = \frac{1}{3}x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{6}x + \frac{1}{2}x + 6^*$$

$$\text{বা, } x - \frac{57x}{60} = 6$$

$$\text{বা, } \frac{x}{20} = 6$$

$$\text{বা, } x = 120$$

* প্রদীপ কুমার মজুমদারের ‘প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা’ থেকে নেওয়া হয়েছে পৃঃ—212।

॥ আনুমানিক পদ্ধতি ॥

(Regula Falsi)

অজ্ঞাত রাশির বিভিন্ন মান অনুমান করে $ax+b=0$ —এ-ধরনের সমীকরণ সমাধান অতি প্রাচীন। হামানসূত্র-এ এই পদ্ধতির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। আরবদের মাধ্যমে যেমন দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন, শূন্য এবং গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা বিষয় পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়, এই পদ্ধতিও ঠিক তেমনভাবে ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল। অনেক পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞ এই পদ্ধতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বস্তুত এখানে False শব্টির আভিধানিক অর্থ অভিপ্রেত নয় বলে তাঁরা তার ব্যাখ্যাও করতে থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ গণিতজ্ঞ রবার্ট রেকর্ড তাঁর *Ground of Artes* গ্রন্থে কবিতার মাধ্যমে এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও প্রশংসা করেন :

"Suche falsehode is so good a grounde,

That truth by it will soone be founde."*

সত্যি কথা বলতে কি, গণিতে False বলে কিছু থাকতে পারে না। সত্যের অনুসন্ধান করাই গণিতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। False শব্দ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে বলে বেকার (Humphrey Baker) নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেন :

"The Rule of falsehoode is so named not for that it teacheth anye deceyte or falsehoode, but that by fayne numbers taken at all adventures, it teacheth to finde out the true number that is demaunded, and this of all the vulgar Rules which are in practice is ye most excellence."**

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখানো যাক। মনে করা যাক, $3x-9=0$ —এই সমীকরণটি সমাধান করতে হবে। এখন, অজ্ঞাত-রাশি x -এর দুটি আনুমানিক মান g_1 ও g_2 ধরা হলো; তার ফলে $3x-9$, এই রাশির দুটি ফল f_1 ও f_2 পাওয়া গেলে,

$$x = \frac{f_1 g_2 - f_2 g_1}{f_1 - f_2} \text{ হবে।}$$

এখন ধরা যাক, $g_1=1$ ও $g_2=2$

* History of Mathematics (Vol-II)—D. E. Smith, Page-43y

** History of Mathematics (Vol-II)—D. E. Smlth, Page-441

$$\text{তা হলে, } f_1 = 3.1 - 9 = 3 - 9 = -6$$

$$f_2 = 3.2 - 9 = 6 - 9 = -3$$

$$\therefore x = \frac{-6 \times 2 - 1 \times (-3)}{-6 - (-3)} = \frac{-12 + 3}{-6 + 3} = \frac{-9}{-3} = 3$$

॥ দুইটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ ॥

এ-ধরনের সমীকরণ প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ‘সংক্রমণ’ বলে অভিহিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ‘সংক্রমণ’ দ্বারা প্রায় সব গণিতজ্ঞই সংক্রামিত হয়েছেন। যেমন,—ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রমুখ। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ছাড়া আর সব গণিতজ্ঞই বিষয়টি পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ভাষ্যকার গঙ্গাধর ‘সংক্রমণ’ অর্থে দুটি অজ্ঞাত রাশির সমষ্টি ও অন্তর থেকে উদ্ভূত সমস্তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর মতে $x+y=a$ এবং $x-y=b$ ধরনের সমস্তাই সংক্রমণের আলোচ্য বিষয়। ব্রহ্মগুপ্ত এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক একটি পদ্ধতির বিষয় স্পষ্টরূপে বাক্য করেছেন। তিনি বলেন, যোগ ও বিয়োগ দ্বারা প্রত্যেকেরে ২ দ্বারা ভাগ করলেই অজ্ঞাত রাশিঘরের মান পাওয়া যায়। তাঁর সূত্রটি :

যোগোহস্তর যুত্বহীনো দ্বিস্ততঃ সংক্রমস্তরবিভক্তঃ বা ।

মহাবীর এ-বিষয়ে যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা একটু অন্য ধরনের। তাঁর সমীকরণ দুটি ও সমাধান নিম্নরূপ :

$$ax+by=s$$

$$bx+ay=t$$

$$x = \frac{as-bt}{a^2-b^2}, y = \frac{at-bs}{a^2-b^2}$$

॥ তিনটি অজ্ঞাত রাশি বিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ ॥

এ-ধরনের সমীকরণের দৃষ্টান্তের ইতিহাসও খুব প্রাচীন। অন্তর্গত হয়, অন্তত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকেই ভারতীয় গণিতজ্ঞদের চিন্তা-ভাবনায় এরকম সমস্তা স্থান পেয়েছিল। বকশালী পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতিদের লেখায় এ-ধরনের সমস্তা পরিলক্ষিত হয়।

সমস্যা : তিন-ব্যক্তি কিছু পরিমাণ সম্পদের মালিক। প্রথম ও দ্বিতীয়ের

একত্রে 13, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের 14 এবং প্রথম ও তৃতীয়ের 15 হলে প্রত্যেকের সম্পদ কত ?

তিন ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে x , y ও z হলে, সর্তাহুসারে,

$$x+y=13.....(1)$$

$$y+z=14.....(2)$$

$$z+x=15.....(3)$$

বকশালী পাণ্ডুলিপিতে আনুমানিক পদ্ধতি-তে (Regula Falsi) এর সমাধান দেওয়া আছে ।

॥ দ্বিঘাত সমীকরণ ॥

দ্বিঘাত সমীকরণের অস্তিত্ব ইউক্লিডের এলিমেন্টস গ্রন্থের জ্যামিতিক সমস্তার মধ্যে থাকলেও তা মাত্র খ্রীষ্টপূর্ব 300 বছরের । কিন্তু ভারতে এর অস্তিত্ব বৈদিক যুগের গণিতজ্ঞদের মধ্যে দেখা যায় । শুষ্ক-যুগে বেদী-নির্মাণের ক্ষেত্রে $ax^2+bx=c$ এবং $ax^2=c$, এই দু-ধরনের দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান অপরিহার্য ছিল । পাণ্ডুলিপির যুগেও এর অস্তিত্ব ছিল না । আর প্রাচীন ভারতের দুই শীর্ষস্থানীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট ও ব্রহ্মগুপ্ত এই সমীকরণ সমাধান বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন-ই । আর্যভটীয় গ্রন্থে অবশ্য এর সমাধান পদ্ধতির কোন বিস্তারিত আলোচনা নাই । নানা প্রসঙ্গ থেকে মনে হয় আর্যভট এর বিস্তারিত আলোচনা বাহ্যাবোধ করেছেন । তিনি সমান্তর শ্রেণীর পদসংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে অজ্ঞাত রাশিটি নির্ণয়ের কথা বলেছেন । তাঁর সূত্রটি :

গচ্ছোঃস্তোত্তরগুণিতাদ্ দ্বিগুণাহ্যত্তরবিশেষবর্গমুতাং ।

মূলং দ্বিগুণাদ্যনং স্তোত্তরভজিতং সরূপার্বম্ ॥

মর্মার্থ : সাধারণ অন্তরের ৪ গুণ দিয়ে সমষ্টিকে গুণ কর । প্রথম পদের দ্বিগুণের সঙ্গে সাধারণ অন্তর বিয়োগ করে বিয়োগ ফলের বর্গ কর । প্রথমোক্ত গুণফলের সঙ্গে এই বর্গ যোগ কর । মূল গ্রহণ করে প্রথম পদের দ্বিগুণ বিয়োগ করে সাধারণ অন্তর দিয়ে ভাগ কর । তারপর সমগ্র ফলের সঙ্গে 1 যোগ করে অর্ধ নাও ।

এখন, n -তম পদের সমষ্টি s হলে, এবং a —প্রথম পদ ও b —সাধারণ অন্তর হলে, আর্যভটের সূত্রটি নিম্নরূপে লেখা যায় :

$$n = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\sqrt{8bs + (2a - b)^2} - 2a}{b} + 1 \right\}$$

আবার, কোন কোন স্তর নির্ণয় ক্ষেত্রে $tx^2 + px - Ap = 0$ সমীকরণ সমাধান প্রয়োজন হয়। আর্ধভটীর গ্রন্থে এই সমীকরণ সমাধানের যে সূত্র দেওয়া আছে তা এরকম :

মূলফলং সফলং কালমূলগুণমর্ধমূলকৃত্তিযুক্তম্ ।

তমূলং মূলার্ধোনং কালহৃতং স্ফলফলম্ ॥

এখন প্রতি p টাকার x স্তর হলে এবং t মাসে স্তরাসল A হলে আর্ধভটের সূত্র থেকে লেখা যায়,—

$$x = \frac{\sqrt{Apt + \left(\frac{p}{2}\right)^2} - \frac{p}{2}}{t} = \frac{-p + \sqrt{p^2 + 4Atp}}{2t}$$

ব্রহ্মগুপ্ত সমাধান-পদ্ধতির দুটি সূত্র দিচ্ছেন। তার একটি সূত্র এখানে উদ্ধৃত হলো :

বর্গচতুগুণিতানাং রূপনাং মধ্যবর্গসহিতানাং ।

মূলং মধ্যমোনং বর্গদ্বিগুণোক্তং মধ্যং ॥

অর্থাৎ চরম পদটিকে অজ্ঞাতরাশির বর্গের সহগের চারগুণের সহিত গুণ করে মধ্যের সহগের বর্গ যোগ কর। অতঃপর মূল করে অজ্ঞাতরাশির (মধ্যের) সহগ বিয়োগ কর। তারপর অজ্ঞাতরাশির বর্গের সহগ দ্বিগুণ করে ভাগ কর।

সন্দেহ নাই, ব্রহ্মগুপ্ত $ax^2 + bx + c = 0$ এই আকারের সমীকরণের কথাই বলেছেন। সুতরাং সূত্রানুযায়ী,—

$$x = \frac{\sqrt{4ac + b^2} - b}{2a}$$

‘গণক-চক্র-চূড়ামণি’-র দ্বিতীয় সূত্রের তেমন অভিনবত্ব নাই। প্রথম সূত্র থেকেই এটি পাওয়া যায়,—

$$x = \frac{\sqrt{ac + \left(\frac{b}{2}\right)^2} - \frac{b}{2}}{a}$$

পরবর্তীকালে শ্রীধরাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের প্রথম সূত্রটি নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। বর্তমান স্কুলগণিতে অনেক সময় এটি শ্রীধরাচার্যের প্রণালী বা পদ্ধতি নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূত্রটির উদ্ভাবক হচ্ছেন ব্রহ্মগুপ্ত। শ্রীধরের বীজগণিত আজ অবশূণ্য। ভাস্কর, জ্ঞানরাজ ও সূর্যদাসের উদ্ধৃতি থেকে সূত্রটি জানা যায় :

চতুরাহতবর্গসমৈ রূপৈঃ পদ্ধতয়ম্ গুণয়েৎ ।

অব্যক্তবর্গরূপৈর্মুক্তৌ পক্ষৌ ততো মূলম্ ॥

অর্থাৎ সমীকরণের উভয়পক্ষকে বর্গ-অজ্ঞাত রাশির (x^2) সহগের চতুর্গুণ দ্বারা গুণ কর এবং উভয়পক্ষে অজ্ঞাত-রাশির সহগের বর্গ যোগ করে বর্গমূল নির্ণয় কর ।

(i) $ax^2 + bx = c$ সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে

$$ax^2 + bx = c$$

$$\text{বা, } 4a \times ax^2 + 4a \times bx = 4a \times c$$

$$\text{বা, } 4a^2x^2 + 4abx = 4ac$$

$$\text{বা, } 4a^2x^2 + 4abx + b^2 = 4ac + b^2$$

$$\text{বা, } (2ax + b)^2 = 4ac + b^2$$

$$\text{বা, } 2ax + b = \pm \sqrt{4ac + b^2}$$

$$\text{বা, } 2ax = -b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}$$

$$\text{বা, } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

(ii) $ax^2 + bx + c = 0$ এই সমীকরণের ক্ষেত্রে,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

বিধাত সহসমীকরণ নিয়েও ভারতীয় গণিতজ্ঞরা ব্যাপক আলোচনা করেছেন । এই সম্পর্কে আর্ঘভট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রমুখের নাম করা যেতে পারে ।

আর্ঘভট $x - y = a$ ও $xy = b$ এই সমীকরণ দুটির সমাধান করে বলেছেন,

$$x = \frac{1}{2} \left[\sqrt{a^2 + 4b} + a \right], \quad y = \frac{1}{2} \left[\sqrt{a^2 + 4b} - a \right]$$

মহাবীর $x + y = a$, $xy = b$ এই সমীকরণের সমাধান দিয়েছেন,—

$$x = \frac{1}{2} \left[a + \sqrt{a^2 - 4b} \right], \quad y = \frac{1}{2} \left[a - \sqrt{a^2 - 4b} \right]$$

তীর আর এক ধরনের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = c$, $xy = b$ -এর সমাধান,—

$$x = \frac{1}{2} \left[\sqrt{c + 2b} + \sqrt{c - 2b} \right], \quad y = \frac{1}{2} \left[\sqrt{c + 2b} - \sqrt{c - 2b} \right]$$

‘বিসমকর্ম’ বলে এক প্রকার সমীকরণ ভারতীয় গণিতে দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে বিশেষ পদ্ধতিতে সমাধান করতে হয়। এখানে দুটি উদাহরণ দেখানো হলো :

$$(i) \quad \begin{matrix} x^2 - y^2 = m \\ x - y = n \end{matrix} \quad (ii) \quad \begin{matrix} x^2 - y^2 = m \\ x + y = p \end{matrix}$$

এদের সমাধান নিম্নরূপ :

$$(i) \quad x = \frac{1}{2} \left(\frac{m}{n} + n \right), \quad y = \frac{1}{2} \left(\frac{m}{n} - n \right)$$

$$(ii) \quad x = \frac{1}{2} \left(p + \frac{m}{p} \right), \quad y = \left(p - \frac{m}{p} \right)$$

আচার্য আর্যভট্টের একটি সূত্র দিয়ে আরো এক ধরনের সমীকরণ সমাধান করা যায়। সূত্রটি :

সম্পর্কস্তু হি বর্গাদ্ বিশোদয়েদেব বর্গসম্পর্কস্ব ।

যন্তস্য ভবত্যর্ধং বিভাদ্ গুণকারসংবর্গস্ব ॥

অর্থাৎ দুটি উৎপাদকের সমষ্টির বর্গ থেকে তাদের বর্গের সমষ্টি বিয়োগ করে অন্তরকে অর্ধ কর। তাহলে দুটি উৎপাদকের গুণফল পাবে।

$$\text{বীজগণিতের ভাষায়, } x \times y = \frac{(x+y)^2 - (x^2 + y^2)}{2}$$

এই সূত্র থেকে $x^2 + y^2 = c$, $x + y = a$ সমীকরণের সমাধান,—

$$x = \frac{1}{2} \left[a + \sqrt{2c - a^2} \right], \quad y = \frac{1}{2} \left[a - \sqrt{2c - a^2} \right]$$

॥ দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ ॥

দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ সম্বন্ধে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এ-বিষয়ে যে তাঁরা ডায়োক্যাস্টাসকেও অতিক্রম করে গেছেন, তা অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা স্বীকার করেন। পদ্যনাভের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ভাস্কর বলেছেন, দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি বীজ আছে ; একটি ধনাত্মক, অপরটি ঋণাত্মক। কিন্তু ঋণাত্মক বীজটি তিনি গ্রহণ করেন নি। কারণ এটি অবাস্তব। ব্রহ্মগুপ্তের মতও একই ধরনের ; তিনিও ঋণাত্মক বীজটি অবাস্তবতার জন্য গ্রহণ করেননি।

ভাস্কর কর্তৃক উদ্ধৃত পদ্যনাভের মতটি এরকম :

ব্যক্ত পক্ষস্য চেন্দ্র মন্যপক্ষরূপতঃ

অন্নং বনৰ্ণগং কৃষ্ণা দ্বিবিশোং পত্ততে মিতি ॥

ভারতীয় গণিতজ্ঞদের ঋণাত্মক বীজ গ্রহণ না করার শিহনে যে কারণ ছিল, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে আরো স্পষ্ট করা যাক।

উদাহরণ : একদল বানরের এক-পঞ্চমাংশ থেকে 3 বিয়োগ করলে যে সংখ্যা হয়, তার বর্গ-সংখ্যক বানর একটি গুহার প্রবেশ করল। এখন যদি একটি বানর গাছে থাকে, তাহলে কয়টি বানর ছিল ?

বানরের সংখ্যা x ধরে প্রদত্ত সর্ত থেকে,

$$x - \left(\frac{1}{5}x - 3\right)^2 = 1$$

$$\text{বা, } x^2 - 55x + 250 = 0$$

$$\text{বা, } (x-5)(x-50) = 0$$

$$\therefore x = 5 \text{ অথবা } 50$$

কিন্তু ভাস্কর $x=5$ বীজটি গ্রহণ করেননি তার অবাস্তবতার জন্ত। অঙ্কের সর্তানুসারে $\frac{1}{5}$ অংশ $5 \times \frac{1}{5} = 1$, এবং 1 থেকে 5 বিয়োগ করা যায় না। সেজন্য ভাস্কর অপর বীজ $x=50$ গ্রহণ করেছেন।

পণ্ডিত-সার-সংগ্রহ-এর নানা উদাহরণ থেকেও বোঝা যায় মহাবীর দ্বিঘাত সমীকরণের যে দুটি বীজ আছে তা জানতেন।

বস্তুত, সমস্তাই আবিষ্কারের মূল উৎস। পাটীগণিতিক নানা সমস্যার সমাধানের অন্বেষণেই ভারতে বীজগণিতের উৎপত্তি। এ-বিষয়ে এফ. ক্যাম্ব্রি, হ্যাক্সলের মত উক্ত করে যা বলেছেন, তা প্রাধান্যযোগ্য : "Indeed, if one understands by algebra the application of arithmetical operations to complex magnitudes of all sorts, whether rational or irrational numbers or space magnitudes, then the learned Brahmins of Hindostan are the real inventors of algebra."

॥ একটি বিতর্ক ॥

একঘাত সমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে ভারত অন্ত দেশ বিশেষ করে গ্রীসের কাছে ঋণী কিনা এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে বেশ বিতর্ক আছে। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতরা অনেকে প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ব্যবহৃত দু-একটি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিচার করে এই বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। এমন একটি শব্দ হচ্ছে ‘রূপক’। এই শব্দটি আর্থভটের, ব্রহ্মস্পতির গ্রন্থাদিতে দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আর্থভটের “গুলিকান্তরেন” সূত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে, আর ওই স্লোকেও এই শব্দটি আছে। এটি একটি সূত্রার একক। এই এককটি কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র আর্থভটের ন’শ’ বছর আগে রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত এটিতে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

এম. ক্যাক্টরের মত গণিতের ঐতিহাসিক পর্যন্ত একঘাত বা দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে গ্রীক প্রভাব আছে বলে মনে করেন,—বিশেষ করে ডায়োফ্যাণ্টাসের প্রভাব। অবশ্য রূপক সম্বন্ধে প্রথম ভাবের বলেছেন এটি মূল্য,—দিশার। কিন্তু এতে রূপক শব্দ গ্রীক প্রভাবিত কলা চলে না। তা হলে কি কোটিল্যের আগে থেকেই গ্রীক প্রভাব ভারতে বিস্তার করেছিল? কিন্তু ইতিহাস তো সে সাক্ষ্য দেয় না।

বরং আমাদের মনে হয় আর্থভট কর্তৃক ব্যবহৃত রূপক বোধ হয় কোটিল্যের পূর্ববর্তী কোন প্রাচীন গণিতগ্রন্থের নিদর্শন। বাই হোক,—গণিতের ঐতিহাসিক ক্যাক্টরি একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি বোধ হয় ভারতীয় গণিতজ্ঞদের সম্বন্ধে প্রকৃত মূল্যায়ন। তিনি ক্যাক্টরের মন্তব্যো সন্মত প্রকাশ করে বলেছেন : “Even if it be true that the Indians borrowed from the Greeks, they deserve great credit for improving and generalising the solutions of linear and quadratic equations.”

॥ শ্রেণী ॥

(শ্রেণী)

ইতিপূর্বে অগতি বা শ্রেণী সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আমরা করেছি। এখানে অতি সংক্ষেপে আর একটু আলোচনা করা হলো।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানাতাবে শ্রেণী বা শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, বাজসেনীয় সংহিতা, রুহংদেবতা, কল্পসূত্র ইত্যাদিতে শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়। এসব গ্রন্থে যে ধরনের শ্রেণী দেখা যায় তা সবই সমান্তর শ্রেণী। বেদ গ্রন্থ সমূহে নানা ধরনের সংখ্যার উল্লেখ আছে।

এখানে অথর্ববেদের ১৭শ কাণ্ডের দ্বিতীয় সূত্র থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

যে তে রাজি নৃচক্ষসো ব্রহ্মারো নবত্বিবব।

অশীতিঃ সন্ত্যষ্টা উতো তে সন্ত সন্ততিঃ ॥

যষ্টিশ্চ বট চ রেবতি পঞ্চাশৎ পঞ্চ স্তুত্ময়ি।

চত্বারশ্চত্বারিংশচ্চ জয়ত্রিংশচ্চ ব্যাক্তিমি ॥

যৌ চ তে বিংশতিশ্চ তে রাজ্যেকাদশাবমাঃ।

তেভির্নো জন্ত পামুতিহুঁ পাহি হুহিতদ্বিবঃ ॥

অনুবাদ : “হে রাজি, তোমার মহিমার ব্রহ্মা, মাহুকের কর্মফলের জ্ঞাতা যে নিরানব্বই (৯৯), অষ্টাশী (৮৮) এবং সাতাস্তর (৭৭) জন গণদেবতা আছে, তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। হে ধনপ্রদে রাজি, তোমার ছেয়টি (৬৬) গণদেবতা আছে, হে স্তম্ভপ্রাপিকে, তোমার যে পঞ্চাশ (৫৫) গণদেবতা আছে, যে চুর্যাস্তি (৪৪) গণদেবতা আছে এবং হে অন্নবতি, তোমার যে তেত্রিশ (৩৩) সংখ্যক গণদেবতা আছে, তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। হে রাজি, যে দ্বাবিংশতি (২২) গণদেবতা তোমার মহিমার ব্রহ্মা আছে এবং যে নিকট এগার (১১) সংখ্যক দেবতা তোমার ব্যাপ্তিব্রহ্মা আছে, হে ছ্যলোকের পুত্রি, হে রাজি, এখন ক্ষুণ্ণ তোমার ব্যাপ্তিদর্শক গণদেবতার সাথে আমাদের রক্ষা কর।” (অথর্ববেদ—হরক, বিজ্ঞান বিহারী গোস্বামী, সংখ্যা লেখকের)

অনুবাদের মধ্যে সংখ্যাগুলি আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। এই সংখ্যাগুলির,—৯৯, ৮৮, ৭৭, ৬৬, ৫৫, ৪৪, ৩৩, ২২, ১১-এর দিকে তাকালে আমরা দেখি এগুলি সমাস্তর শ্রেণী গঠন করেছে, এবং এদের সাধারণ অন্তর = ১১।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় সংখ্যাগুলি এভাবে সাজানো আছে :

১, ৩, ৫, ৭ ... ১৭, ২৭, ৩৭ ... ৯৭

২, ৪, ৬, ৮, ১০, ২০

বৃহৎদেবতা ও কল্পসূত্রে কেবলমাত্র সমাস্তর শ্রেণীর অস্তিত্বই নাই,—এর সমষ্টি পর্যন্ত দেওয়া আছে। কিন্তু হুঃশের বিষয়, এখানে সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রের কোন হদিস নাই। যেমন, ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে নিয়ন্ত্রণ শ্রেণী ও সমষ্টি দেখা যায় :

$1+2+3+4+5+\dots+8192=16383$

শ্রেণী বিষয়ে সূত্র আলোচনা বকশালী পাণ্ডুলিপির যুগ থেকে দেখা যায়। আর্ষভট এ-বিষয়ে অনেক সূত্র দিয়েছেন। ইতিপূর্বে ঘিষাত সমীকরণে আমরা দু-একটি আলোচনা করেছি। এখানে, একটিমাত্র সূত্র উদ্ধৃত হলো :

ইষ্ট্যং ব্যোক্তং দলিতং সপূর্বমুত্তরগুণং সমুখমধ্যম্ ।

ইষ্টগুণিতমিষ্টধনং ত্রুণবাদ্যন্তং পদাৰ্হিতম্ ।

ভাবানুবাদ : পদসংখ্যা থেকে 1 বাদ দাও, 2 দিয়ে ভাগ কর। এবার আগের পদসংখ্যা যোগ কর ; সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ কর ; প্রথম পদ যোগ কর । তাহলে এই ফল সমান্তর মধ্যক হবে । একে পদসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমগ্র শ্রেণীর সংখ্যাসমূহ পাওয়া যাবে । অথবা প্রথম পদ এবং শেষ পদ এই উভয়ের যোগফলকে পদসংখ্যার অর্ধেক দিয়ে গুণ করলে শ্রেণীর সংখ্যার যোগফল পাওয়া যায় ।

ধরা যাক, শ্রেণীটি $a + (a + d) + (a + 2d) + \dots$

তাহলে $(a + pd) + (a + \overline{p+1}d) + \dots + \{a + (p + n - 1) d\}$

এই শ্রেণীর সমান্তর মধ্যক হবে

$$a + \left(\frac{n-1}{2} + p \right) d ;$$

আবার n -তম পদের সমষ্টি হবে

$$n \left\{ a + \left(\frac{n-1}{2} + p \right) d \right\}$$

বিশেষ ক্ষেত্রে : $p=0$ হলে,

$$\text{মধ্যক} = a + \frac{n-1}{2} \cdot d$$

$$\text{আর শ্রেণী সমষ্টি} = n \left\{ a + \frac{n-1}{2} \cdot d \right\}$$

শ্রেণী-বিষয়ক আলোচনায় ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর আরো অশূদ্ধল ও আরো স্পষ্ট ।

এ-বিষয়ে আচার্য ব্রহ্মগুপ্তের স্মৃতি অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় :

পদমেকহীমমুত্তরগুণিতং সংযুক্তমাদিমাহন্ত্যধনম্ ।

আদিমুত্তাত্ত্যধনার্হং মধ্যধনং পদগুণনং গণিতম্ ।

“অর্থাৎ প্রথম পদ, সাধারণ অন্তর এবং পদসংখ্যা জানা থাকলে শেষপদ কত সংখ্যা, মধ্যপদ কত সংখ্যা এবং যে কোন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা যেতে পারে । পদসংখ্যা থেকে এক বিয়োগ করে ঐ বিয়োগফলকে সাধারণ অন্তর দিয়ে গুণ করে তারপর প্রথমপদ যোগ করলে শেষপদ পাওয়া যাবে । এই শেষপদের সঙ্গে প্রথমপদ আবার যোগ দিয়ে তারপর দুই দিয়ে ভাগ দিলে মধ্যপদ পাওয়া

যাবে। এই মধ্যপদকে পদসংখ্যা দিবে গুণ করলে সমগ্র পদের সমষ্টি পাওয়া যাবে।* (প্রা. ভা. গ. চ.)

আধুনিক বীজগণিতের চিহ্ন ও সংকেতে উপরের সূত্রটি প্রকাশ করলে,—

$$t_n = a + (n-1)b; \quad t_k = \frac{2a + (n-1)b}{2}$$

$$S_n = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)b\}$$

কলা বাহুল্য, এখানে $t_n = n$ -তম পদ; a = প্রথম পদ, b = সাধারণ অন্তর; t_k = মধ্যম পদ এবং $S_n = n$ -সংখ্যক পদের সমষ্টি।

গুণোত্তর শ্রেণীর উল্লেখ পিকলের ছন্দসূত্র গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমরা এ-বিষয়ে সামান্য আলোচনা করেছি। এখানে মহাবীরের গণিত-সার-সংগ্রহ থেকে একটিমাত্র সূত্রের উল্লেখ করা হলো।

গুণধনমাদিবিভক্তং বৎপদ নিভবধসমং স এব চয়ঃ ।

গচ্ছপ্রমগুণপ্রকৃতং গুণিতং ভবেৎ প্রভবঃ ॥

আধুনিক বীজগাণিতিক ভাষায় এর মর্মার্থ,

$$(i) \quad \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \div a = \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

$$(ii) \quad \frac{r^n - 1}{r - 1} - 1 = \frac{r^n - r}{r - 1}$$

$$(iii) \quad a = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \times \frac{r - 1}{r^n - 1}$$

এ ছাড়া মহাবীর গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রও দিয়েছেন। ভাস্কর্যের আলোচনাও উল্লেখ করার মত।

বস্তুতপক্ষে শ্রেণী বিষয়ক সব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা ভারতীয় গণিতের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পড়তে পারেন। কিছুটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্তই এখানে সামান্য আলোচনা করা হলো।

সপ্তদশ অধ্যায়

"Some of the most brilliant of Hindoo discoveries in indeterminate analysis reached Europe too late to exert the influence they would have exerted, had they come two or three centuries earlier." —F. Cajori

॥ কুট্টক ॥

আধুনিক অনির্ণেয় সমীকরণ ভারতীয় গণিতে কুট্টক নামে অভিহিত। সাধারণভাবে কুট্টক নাম ব্যবহৃত হলেও আরো কয়েকটি নাম দেখা যায়। যেমন,—প্রথম ভাস্কর তাঁর মহাভাস্করীয় গ্রন্থে কুট্টকার, কুট্টক বা কুট্ট বলেছেন। ব্রহ্মগুপ্তও একই কথা বলেছেন, আর মহাবীর কুট্টিকার বলেছেন। কিন্তু প্রথম ভাস্কর সর্বপ্রথম অনির্ণেয় সমীকরণের পরিভাষা ব্যবহার করেন। 'কুট্টক' শব্দের অর্থ ভাঙা বা চূর্ণ করা। এই পদ্ধতিতে ক্রমিক ভাগহার বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাজন হয় অর্থাৎ বিতত ভগ্নাংশের প্রয়োগ হয় বলে এরকম নামকরণ হয়ে থাকবে।

শুভশূদ্রে অনির্ণেয় সমীকরণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। II-সংখ্যক বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কনের সমস্যা মধ্য এই অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের বীজ নিহিত আছে বলে মনে হয়। শূদ্রকার কাত্যায়ন সমস্যাটির চিত্রাঙ্কনের যে শূদ্র দিয়েছেন, তাতে $x^2 + y^2 = z^2$ —এই অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধান অপরিহার্য ছিল। কিন্তু এই সমীকরণটির সমাধানের কোন ইচ্ছিত বা আভাস শুভশূদ্রে দেখতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি বোধায়নের শুভশূদ্রেও একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণটি সমস্যা দেখা যায়। যেমন, গার্হপত্য-বেদী নির্মাণের সঙ্গে এই সমস্যা জড়িত।

কেবলমাত্র গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেই নয়, ধর্মীয় অঙ্গষ্ঠানে বেদী নির্মাণের ক্ষেত্রেও এর অপরিণীম গুরুত্ব থাকায় ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধানের ক্ষেত্রে মহৎ কৃতিত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে-কারণে বোধহয় এই বিষয়টি গণিতে একটি পৃথক শাখা হিসাবে আলোচিত হবার যোগ্যতা

অর্জন করে। যেমন,—পববর্তীকালে ভাষাকার দেবরাজ ‘কুট্টাকার-শিরোমণি’ নামে একটি গ্রন্থই রচনা করেন।

নিঃসন্দেহে বিষয়টি বীজগণিতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভাস্কর এটি পাটীগণিতের অন্তর্ভুক্ত করেন সম্ভবত একটি কারণে যে, তিনি গণিতের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পাটীগণিতের ছাত্রদের কাছে আগে থেকেই পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন।

॥ একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের শ্রেণী বিভাগ ॥

সাধারণত $by = ax \pm c$ এই সমীকরণকে একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ বলা হয়। অর্থাৎ a, b, c ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ধরে $by = ax + c$ সমীকরণটি সমাধান করেন, এবং একঘাত সহসমীকরণেও প্রয়োগ করেন।

এ ধরনের সমীকরণকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :

(i) কোন সংখ্যা (N)-কে প্রদত্ত দুটি রাশি a ও b দ্বারা ভাগ করলে দুটি প্রদত্ত অবশেষ (ভাগশেষ) R_1 এবং R_2 পাওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা পাই,—

$$N = ax + R_1 = by + R_2$$

$$\text{বা, } by - ax = R_1 - R_2$$

$$\text{এখন, } R_1 - R_2 = c \text{ হলে,}$$

$$by - ax = \pm c$$

(ii) এমন কোন একটি রাশি (x) নির্ণয় করতে হবে যাকে অত্র একটি প্রদত্ত রাশি α দিয়ে গুণ করলে ওই গুণফলের আর একটি প্রদত্তরাশি γ যোগ বা বিয়োগের পর তৃতীয় কোন রাশি β দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। গাণিতিক ভাষায়,—

$$y = \frac{\alpha x \pm \gamma}{\beta}$$

(iii) এই প্রকার সমীকরণের আকার $by + ax = \pm c$

প্রথম ভাস্কর কুট্টাক-কে দু-ভাগে ভাগ করেছেন,—সাত্র কুট্টাকার, আর নিরত্র কুট্টাকার। তিনি আবার উদাহরণ দিয়ে এই দু-ধরনের সমীকরণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথম ভাস্করের ভাস্কর গোবিন্দস্বামী আবার ‘মহাভাস্করীয়’ গ্রন্থের টীকায় এ-বিষয়ে আরো স্পষ্ট আলোচনা করেছেন।

॥ আর্ষভট ও একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ॥

আর্ষভটের পূর্বে ভারতে অনির্ণেয় সমীকরণের অস্তিত্ব থাকলেও এই অনন্ত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদই এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর্ষভটের অনেক যৌলিক অবদান আছে সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতে এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে স্বীকৃত হওয়ার বোধ্য।

আর্ষভটীয় গ্রন্থে এই সম্পর্কিত মাত্র দুটি শ্লোক দেখা যায়। কিন্তু এ-দুটির অস্বনিহিত অর্থ খুব জটিল ও দুর্লভ। শকার্ণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আচার্য আর্ষভট তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদান করার সময় এই শ্লোকের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা করে থাকবেন এবং তাঁর শিষ্যরাও গুরু প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে তাঁদের শিষ্যদের জটিলতা দূর করে থাকবেন। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সে-ব্যাখ্যা আজ অবলুপ্ত। ভারতীয় গণিতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ বি. বি. দত্ত আর্ষভটের একান্ত অম্বরগী প্রথম ভাস্করকৃত পদ্ধতি অবলম্বন করে এই সমীকরণ সমাধানের যে রূপরেখা দিয়েছেন, আমরাও মূলত সেই পথ অনুসরণ করে এই জটিল বিষয়টি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য আচার্য আর্ষভটের শ্লোক দুটি ও তাঁর ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হলো :

অধিকাগ্রভাগহারং ছিন্দ্যাদুনাগ্রভাগহারেণ ।

শেষপরম্পরভক্তং মতিগুণমগ্রান্তরে ক্রিপ্তম্ ॥

অধউপরিগুণিতমন্ত্যসুগুণাগ্রচ্ছেদভাজিতে শেষম্ ।

অধিকাগ্রচ্ছেদগুণং ছিচ্ছেদাগ্রমধিকাগ্রমুভম্ ॥

ইংরেজী অনুবাদ : Divide the divisor corresponding to the greater remainder by the divisor corresponding to the smaller remainder. (Discard the quotient). Divide the remainder obtained (and the divisor) by one another (until the number of quotients of mutual division is even and the final remainder is small enough). Multiply the final remainder by an optional number and to the product obtained add the difference of the remainders (corresponding to the greater and smaller divisors ; then divide this sum by the last divisor of the mutual division.

The optional number is to be so chosen that this division is exact. Now place the quotients of the mutual division one below the other in a column ; below them write the optional number and underneath it the quotient just obtained. Then reduce the chain of numbers which have been written down one below the other, as follows) : Multiply by the last but one number (in the bottom) the number just above it and then add the number just below it (and then discard the lower number). (Repeat this process until there are only two numbers in the chain). Divide (the upper number) by the divisor corresponding to the smaller remainder, then multiply the remainder obtained by the divisor corresponding to the greater remainder, and then add the greater remainder : the result is the dvicchedāgra (i.e., the number answering to the two divisors). (This is also the remainder corresponding to the divisor equal to the product of the two divisors).

[Āryabhaṭīya of Āryabhaṭa by Shukla & Sarma]

আর্থভটের শ্লোক দুটির জটিলতা ও তরুহতা বোঝানোর জন্তই কেবল ইংরেজী অম্ববাদটি দেওয়া হলো। বন্ধনীগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ঢাকা-ভাস্ক্য ব্যতিরেকে এই শ্লোকের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। যা হোক,—এবার আমরা একটি সমস্যা উদাহরণস্বরূপ নিয়ে আর্থভটের পদ্ধতি বুঝে নেওয়ার প্রয়াস পাব। বলা হয়, নিম্নরূপ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আচার্য অনির্গত সমীকরণ সমাধান করেন।

সমস্যা : কোন সংখ্যা (N)-কে প্রদত্ত দুটি রাশি a ও b দ্বারা ভাগ করলে R_1 ও R_2 ভাগশেষ পাওয়া যায় ?

সমস্যার বীজগাণিতিক রূপ,—

$$N = ax + R_1 = by + R_2$$

a ও b -এর নাম ‘ভাগহার’ এবং R_1 ও R_2 -এর নাম ‘অগ্র’।

এখন, $R_1 - R_2 = c$ হলে,

$$by = ax + c, \text{ যখন } R_1 > R_2$$

আবার, $ax=by+c$, যখন $R_2 > R_1$

c অর্থাৎ $R_1 - R_2$ -এর পারিভাষিক নাম অগ্রান্তর,—ভাগশেষ দুটির অন্তর।

মহাবীর, দ্বিতীয় অর্ধভট, ভাস্কর উপরের সমীকরণের $y = \frac{ax \pm c}{b}$ আকার বা রূপটি গ্রহণ করেছেন। এখানে a ='ভাজ্য', b ='হার', c ='ক্লেপ' বা 'প্রক্লেপ', x ='গুণ' এবং y ='কন্ম'। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা একবাক্যে সবাই স্বীকার করেছেন যে, a ও b পরস্পর মৌলিক হবে।

উদাহরণ : সমাধান কর : $137x+10=60y$

প্রথম সোপান : x ও y -এর সহগকে যথাক্রমে ভাজ্য ও ভাজক করে গ.সা.গু. পদ্ধতিতে ভাগ করা হলো :

$$\begin{array}{r} 60 \overline{) 137} \left(2 \right. \\ \underline{120} \\ 17 \overline{) 60} \left(3 \right. \\ \underline{51} \\ 9 \overline{) 17} \left(1 \right. \\ \underline{9} \\ 8 \overline{) 9} \left(1 \right. \\ \underline{8} \\ 1 \end{array}$$

দ্বিতীয় সোপান : প্রাপ্ত ভাগফলগুলি নিম্নরূপ বস্তুতে সাজানো হলো :

2
3
1
1

তৃতীয় সোপান : প্রথম ভাগফলটি উপেক্ষা করলে ভাগফলের সংখ্যা হয় 3 ; এবার একটি আনুমানিক সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এমন একটি 'গুণক' নির্ণয় করতে হবে যাকে সর্বশেষ ভাগশেষ দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত সমীকরণের 'চরম পদ'-টি বিয়োগ করলে ফলটি উপাত্ত্য ভাগশেষ অর্থাৎ শেষ ভাগশেষের আগেরটির দ্বারা বিভাজ্য হয়।

এখানে শেষ ভাগশেষ=1, উপাত্ত্য ভাগশেষ=8 ; সুতরাং $8 \times 1 = 1 \times 18 = 10$; এখানে আনুমানিক সংখ্যা=18 এবং নির্ণীত ভাগফল=1

চতুর্থ সোপান : প্রথম ভাস্করের সূত্র অবলম্বনে নিম্নরূপ সারণী করা হলো :

$$2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 297$$

$$3 \quad 3 \quad 3 \quad 130 \quad 130$$

$$1 \quad 1 \quad 37 \quad 37$$

$$1 \quad 19 \quad 19$$

$$\text{গুণক} \longrightarrow 18 \quad 18$$

নির্ণীত ভাগফল $\longrightarrow 1$

কিভাবে তালিকাটি বা সারণী প্রস্তুত করা হলো তার সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। ‘গুণক’ 18-কে ঠিক তার উপরের সংখ্যা 1 দ্বারা গুণ ও নীচের সংখ্যা 1 বোগ করে পরবর্তী স্তরের $(18 \times 1 + 1) = 19$ সংখ্যাটি পাওয়া গেল ; অতঃপর $(19 \times 1 + 18) = 37$ তৃতীয় স্তরের সংখ্যাও পাওয়া গেল। এভাবে সর্বশেষ স্তরের 297 সংখ্যাটি নির্ণীত হয়েছে।

$$\text{সুতরাং } x=140, y=297$$

এখন, 130-কে 60 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ 10, এবং 297-কে 187 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ 23 পাওয়া যায়। সুতরাং $x=10, y=23$

কিন্তু এই বীজ সাধারণ (general) নয় ; $x=10+60m, y=23+137m$ হচ্ছে সাধারণ বীজ।

এতক্ষণ যে পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো তার সামান্য পরিবর্তন করে সমীকরণের সর্বল বীজ সহজে নির্ণয় করা যায়। মনে করা যাক, ভাগশেষ=8

প্রথম ভাগফলকে উপেক্ষা করলে ভাগফল-সংখ্যাটি ‘স্বপ্ন’ হয়। সুতরাং ‘গুণক’ 1 ধরলে $8 \times 1 + 10 = 18 = 9 \times 2$ অর্থাৎ 18 সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য এবং নির্ণীত ভাগফল=2

আগের মত সারণী করলে,—

$$2 \quad 2 \quad 2 \quad 23$$

$$3 \quad 3 \quad 10 \quad 10$$

$$1 \quad 3 \quad 3$$

$$\text{গুণক} \longrightarrow 1 \quad 1$$

নির্ণীত ভাগফল $\longrightarrow 2$

বলা বাহুল্য, সারণীর অন্যান্য অঙ্কগুলি পূর্ব-নিয়মে নির্ণীত হয়েছে।

অতএব, $x=10, y=23$ —প্রদত্ত অনির্ণয়ের সমীকরণের সর্বল বীজ।

ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, ভাস্কর, শ্রীপতি, নারায়ণ প্রমুখ গণিতজ্ঞদের হাতে এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির প্রভূত উন্নতিসাধন পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাস্কর এই সমীকরণ সমাধানের নিয়ম খুবই সহজ ও সরল ভাবে ব্যাখ্যা করেন। মূলত তিনি আর্ঘভটের অমুসরণ করেছেন, তবে তিনি যে ধরনের সমীকরণের কথা বলেছেন তা হলো $\frac{ax-b}{b}=y; y=\text{ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা}$ । তাঁর মহাভাস্করীয়া

গ্রন্থে নিয়রূপ সূত্র বা নিয়ম পাওয়া যায় :

ভাজ্যং ক্রমেদ্বপরি হারমঘট তস্য খণ্ডয়াৎ পরম্পরমধো বিমিষায় লক্ষ্ম ।
কেনাহতোহয়মপনীয় যথাস্য শেষং ভাগং দদাতি পরিস্কন্ধমিতি প্রচিন্ত্যম্ ।
আপ্তাং মতিং তাং বিমিষায় বল্ল্যাং নিত্যং হৃদোহবঃ ক্রমশচ লক্ষ্ম ।
মত্যা হতং স্যাৎপরিষ্টিতং যল্লকেন যুক্তং পরতশচ তদ্বৎ ।
হারেণ ভাজ্যো বিমিষো পরিহো ভাজ্যেন নিত্যং তদবঃস্থিতশচ ।
অহর্গনোহগ্নিন্ ভগনাদয়শচ তদ্বা ভবেদ্যস্য সমীহিতং যৎ ।

ভাবানুবাদঃ বৃহত্তর অবশিষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভাজককে অল্পরূপে ক্ষুদ্রতর অবশিষ্টের ভাজক দ্বারা ভাগ কর। ক্রমিক ভাগ-ক্রিয়ায় প্রাপ্ত ভাগফল সমূহ শৃঙ্খলাকারে সজ্জিত (বলীতে) কর। সর্বশেষ অবশিষ্টকে এমন একটি ঐচ্ছিক রাশি দ্বারা গুণ কর যাতে গুণফলে অবশিষ্টান্তর যোগ বা বিয়োগ করে উপাস্ত্য অবশেষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয়; শৃঙ্খলাকারে সজ্জিত ভাগফল সমূহের নীচে ঐচ্ছিক রাশি ও নির্ণীত ভাগফল পর পর স্থাপন কর। উপাস্ত্য সংখ্যাটিকে পূর্ববর্তী সংখ্যা দ্বারা গুণ করার পর পরবর্তী সংখ্যা যোগ করে পরবর্তী স্তরের উপাস্ত্য সংখ্যা পাওয়া যায়। অনুরূপে দুটি সংখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত এই নিয়মের পুনরাবৃত্তি হবে। এবং পার্থিত অহর্গণ পাওয়া যাবে।

॥ একঘাত অনির্ণেয় সহসমীকরণ ॥

এ-ধরনের সমীকরণ নিয়ে আর্ঘভট, প্রথম ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রমুখ গণিতজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। এঁরা নিয়রূপ সমীকরণগুলির সমাধান করেছেন :

$$(1) \quad a_1x + b_1y + c_1z + d_1w = \omega$$

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2w = \omega$$

$$a_3x + b_3y + c_3z + d_3w = \omega$$

$$a_4x + b_4y + c_4z + d_4w = \omega$$

$$(2) \quad N = a_1x_1 + r_1 = a_2x_2 + r_2 = a_3x_3 + r_3 = \dots a_nx_n + r_n$$

$$(3) \quad \beta y_1 = \alpha_1x \pm \gamma_1$$

$$\beta y_2 = \alpha_2x \pm \gamma_2$$

$$\beta y_3 = \alpha_3x \pm \gamma_3$$

$$\beta y_4 = \alpha_4x \pm \gamma_4$$

.....

.....

$$(4) \quad \beta_1y_1' = \alpha_1x \pm \gamma_1$$

$$\beta_2y_2' = \alpha_2x \pm \gamma_2$$

$$\beta_3y_3' = \alpha_3x \pm \gamma_3$$

$$(5) \quad x \pm \alpha = s^2$$

$$x \pm \beta = t^2$$

(1) নং ধরনের সমীকরণের সুন্দর উদাহরণ ভাস্করের গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

উদাহরণ : “চার বণিকের যথাক্রমে পাঁচ, তিন, দুই ও আটটি করে ঘোড়া ; দুই, সাত, চার ও একটি করে উট ; আট, দুই, এক ও তিনটি করে গাধা এবং সাত, এক, দুই ও একটি করে বুধ আছে। সকলের ধন সমান হলে ঘোড়া প্রতিটির মূল্য কত ?” (প্রা. ভা. গ. চ.)

(2) নং ধরনের সমীকরণ সমাধান আর্ষভট্টের পদ্ধতিতে আছে ; প্রথম ভাস্কর ও ব্রহ্মগুপ্তও এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম ভাস্করের একটি উদাহরণ দেখানো হলো।

উদাহরণ : কোন্ সংখ্যাকে ৪ দ্বারা ভাগ করলে ৫ ভাগশেষ থাকে, ৭ দ্বারা ভাগ করলে ৪ ভাগশেষ থাকে, ৭ দ্বারা ভাগ করলে ১ ভাগশেষ থাকে ?

বলা বাহুল্য, সংখ্যাটি N হলে, সমীকরণগুলি এরূপ হবে,—

$$N = 8x + 5 = 7y + 4 = 7z + 1$$

(3) নং ধরনের সমীকরণের ভারতীয় গণিতে বিশেষ নাম আছে। তার নাম ‘সংশ্লিষ্ট কুট্টক’। ভাস্করের একটি উদাহরণ :

কোন সংখ্যাকে 5 দ্বারা গুণ করে 63 দিয়ে ভাগ করলে 7 ভাগশেষ থাকে ;
আবার ওই সংখ্যার 10 গুণ করে 63 দিয়ে ভাগ করলে 14 ভাগশেষ থাকে ?

$$\text{অর্থাৎ } \begin{cases} 63y_1 = 5x - 7 \\ 63y_2 = 10x - 14 \end{cases}$$

(4) ও (5) নং ধরনের সমীকরণ নিয়ে মহাবীর, শ্রীপতি, ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ গণিতজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত $x \pm a = u^2$ ও $x \pm b = v^2$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান নিম্নরূপ করেছেন,—

$$x = \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{a-b}{m} \pm m \right)^2 \mp a \right\}, \quad x = \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{a-b}{m} \mp m \right)^2 \mp b \right\}$$

এখানে, m = যে-কোন পূর্ণসংখ্যা।

॥ বর্গ-প্রকৃতি ॥

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে দ্বিঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ $Nx^2 \pm c = y^2$ ‘বর্গ-প্রকৃতি’ নামে আখ্যাত। এই সমীকরণে কোন বর্গ-সংখ্যাকে গুণক দ্বারা গুণ করে কোন ঐচ্ছিক রাশির সঙ্গে যোগ করার পর বর্গমূল নির্ণয় করা হয়।

$Nx^2 + 1 = y^2$ এই শ্রেণীর একটি মৌল সমীকরণ। এই সমীকরণের বর্গ-প্রকৃতি নামকরণের উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন গণিতজ্ঞদের মত ও ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় যে, গণিতে এই শাখার গণনার নীতি হচ্ছে একটি সংখ্যা বা সংখ্যানমূহ নির্ণয় করা যার প্রকৃতি এমন যে তার বর্গ বা বর্গসমূহ কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার পর একটি বা কয়েকটি বর্গের স্থায় সংখ্যা উৎপন্ন করে।

$Nx^2 + 1 = y^2$ এই সমীকরণে সহগ N -কে প্রকৃতি বলা হয় এবং N একটি অশূণ্য ধনরাশি। $Nx^2 \pm c = y^2$ এই সমীকরণে x = কনিষ্ঠপদ, y = জ্যেষ্ঠ পদ, N = গুণক এবং c = ঐচ্ছিক রাশি বা প্রক্ষেপ।

বর্গ-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দু-একটি পরিভাষা ও সংজ্ঞার কথা আগে আলোচনা করব।

কনিষ্ঠপদ বা আন্তমূল : যে-সংখ্যার বর্গ ঐচ্ছিক রাশি দ্বারা গুণনের পর অত্র একটি ঐচ্ছিক রাশির যোগ বা বিয়োগ দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়ে বর্গমূল নির্ণীত হয়, তাকে কনিষ্ঠপদ বলে।

জ্যেষ্ঠ মূল : যত্নাশ্র প্রক্রিয়ায় যে বর্গমূল নির্ণীত হয়, তাকে ‘অন্তমূল’ বা জ্যেষ্ঠমূল বলে।

উদ্বর্তক : যদি উভয় প্রকার মূলের কোন সাধারণ গুণক থাকে, তাকে উদ্বর্তক বলে।

অপবর্তক : যদি উভয় মূল দ্বারা বিভাজ্য কোন সংখ্যা থাকে, তাকে অপবর্তক বলে।

আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর ব্রহ্মসুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থে বর্গ-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর একটি উপাস্ত হলো :

মূলং দ্বিবেষ্টবর্গাদ্ গুণকগুণাদিষ্টমুত বিহীমাচ্চ ।

আত্মবথো গুণকগুণঃ সহাস্ত্যঘাতেন কৃতমন্ত্যম্ ॥

ব্রজবৈক্যং প্রথমং প্রক্ষেপং ক্ষেপবধতুল্যঃ ।

প্রক্ষেপশোধককতে মূলে প্রক্ষেপকে রূপে ॥

“অর্থাৎ ইষ্ট বর্গকে গুণক দিয়ে গুণ করার পর অত্র ইষ্ট যোগ বা বিয়োগ কর। তারপর মূলাকর্ষণ কর। এইভাবে দুবার কর। প্রথম দুটি বীজের গুণফলকে প্রকৃতি (N) দিয়ে গুণ করে দ্বিতীয় বীজদ্বয়ের গুণফল যোগ কর। তা হলে (নতুন) দ্বিতীয় বীজ পাওয়া যাবে। প্রথম দুটি বীজ এবং দ্বিতীয় দুটি বীজের বজ্র গুণন করে তারপর যোগ কর। তা হলে (নতুন) দ্বিতীয় বীজ পাওয়া যাবে। প্রথম দুটি বীজ এবং দ্বিতীয় দুটি বীজের বজ্র গুণন করে তারপর যোগ কর। তা হলে প্রথম (নতুন) বীজ পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেপটি পূর্বের ক্ষেপদ্বয়ের গুণফল হবে।” (প্রা. ভা. গ. চ.)

ধরা যাক, k ও k' -এর সুবিধাজনক মানের ক্ষত (α, β) ও (α', β')

$Nx^2 + k = y^2$ ও $Nx^2 + k' = y^2$ সমীকরণ দুটির এক প্রস্থ বীজ।

ব্রহ্মগুপ্তের উপাস্ত অনুসারে $Nx^2 + kk' = y^2$ -এর বীজ হবে,—

$$x = \alpha\beta \pm \alpha'\beta$$

$$y = \beta\beta' \pm N\alpha\alpha'$$

॥ চক্রবাল ॥

খুব সম্ভব ‘চক্রবাল’ পদ্ধতির আবিষ্কারক হচ্ছেন ভাস্কর। কারণ, এই পদ্ধতি তাঁর পূর্বে দেখা যায়নি। $Nx^2 + 1 = y^2$ সমীকরণে N অবর্গ সংখ্যা হলে, এই সমীকরণের সাধারণ ধনাত্মক অথও সমাধান করতে একটি সাহায্যকারী সমীকরণের প্রয়োজন। এই সমীকরণটি $Na^2 + k = b^2$, এখানে a ও b ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা, এবং $k = \pm 1, \pm 2$ এবং ± 4

ভাস্কর $67x^2 + 1 = y^2$ ও $61x^2 + 1 = y^2$ এই সমীকরণ দুটি চক্রবাল পদ্ধতিতে অতি সংক্ষেপে ও সহজে সমাধান করেছেন। বিশেষ করে শেষের সমীকরণটির একটি ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য আছে। এই সমীকরণটির সমাধানের জ্ঞান নাকি বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ফেরমা ফেনিলেকে চ্যালেঞ্জ করেন। আর এই সমীকরণটির x ও y -এর যে ক্ষুদ্রতম বীজ পাওয়া যায়, তা যথাক্রমে নয় ও দশ অঙ্কবিশিষ্ট রাশি। ল্যাগরেঞ্জের পদ্ধতিতে এর সমাধান আরো জটিল। যাই হোক, x ও y -এর ক্ষুদ্রতম বীজ দুটি যথাক্রমে 226, 153, 980 এবং 1, 766, 319, 049.

২. দুটি ঐতিহাসিক অপলাপ ॥

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি ভারতে একদাত অনির্ণয় সমীকরণ খুবই প্রাচীন। অনেক আগে থেকে এর অস্তিত্ব আছে, এবং যুগক্রম পরম্পরায় গণিতজ্ঞরা এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে সাধারণ সমাধান দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ-বিষয়ে যিনি প্রথম সাফল্য অর্জন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে আর্ষভট। কিন্তু গণিতের ইতিহাসে এটি “ডায়োফ্যান্টীয় সমীকরণ” নামে খ্যাত। আমাদের মনে হয়, ভারতীয় গণিতে অজ্ঞতার জ্ঞান ঐতিহাসিকদের এই ক্রটি ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডায়োফ্যান্টাস খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তা ছাড়া তিনি যে ধরনের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেইটি এর এক বিশেষ রূপ। সাধাবণীকরণের সব কৃতিত্বই ভারতীয় গণিতজ্ঞদের প্রাপ্য,—বিশেষ করে আর্ষভটই সর্বপ্রথম স্তূহ্ন আলোচনার সূত্রপাত করেন। গ্রীক ও ভারতীয় অনির্ণয় সমীকরণের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিষয়ে ক্যাম্বরি বলেন,—“The Hindoo indeterminate analysis differs from the Greek not only in method, but also in aim.” তাই, আমাদের প্রস্তাব এই সমীকরণের প্রকৃত নামকরণ করা উচিত ‘আর্ষভটীয় সমীকরণ’। তা হলে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক অপলাপ বা ক্রটি সংশোধিত হয়, তেমনি প্রকৃত আবিষ্কারক ও পথিকৃৎ যোগ্য সমাদর ও সম্মান লাভ করেন।

আর একটি অপলাপ দ্বিঘাত অনির্ণয় সমীকরণকে কেন্দ্র করে। ইউরোপে এই সমীকরণ ‘পেলীয় সমীকরণ’ নামে অভিহিত। এই ক্রটি অবশ্য লিওনার্দ অয়লাবের ভুলেই ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডঃ পেল (Pell) তাঁর একটি বীজগণিত গ্রন্থে এই সমীকরণের উল্লেখ করেছেন। এ-বিষয়ে এফ. ক্যাম্বরির প্রস্তাব হচ্ছে এর প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ‘হিন্দু-সমস্যা’ (Hindoo problem)।

ডঃ শ্রীনিবাসিয়েন্ডার প্রস্তাব করেছেন, এর নাম হওয়া উচিত 'ব্রহ্মগুপ্ত-ভাস্কর সমীকরণ'। ডঃ শ্রীনিবাসিয়েন্ডার প্রস্তাব অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, ব্রহ্মগুপ্ত এই সমীকরণের সমাধান পদ্ধতির আবিষ্কারক হলেও ভাস্কর এর প্রভূত উন্নতিসাধন করেন ও সাধারণীকরণের মধ্যে আনেন। তা হলেও আমাদের প্রস্তাব এই সমীকরণ 'ব্রহ্মগুপ্ত সমীকরণ': নামে আখ্যাত হোক। কারণ, প্রথম সম্মান আবিষ্কারক ও পথিকৃৎ-এর প্রাপ্য।

॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

“The invention of Sunya or ‘O’ liberated the human intellect from the prison bars of the counting-frame.”

—L. Hogben.

॥ শূন্য ॥

বিশ্ব-গণিতের ইতিহাসে অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ দুটি ঘটনা,—দশগুণোত্তর স্থানিক-মান পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখন ও শূন্য আবিষ্কার। বস্তুত, একে মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠ কসল না বলে আজ আর উপায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়,—কে, কবে এবং কোথায় এই আবিষ্কার করেছিলেন, তার কোন লিখিত প্রমাণ আজও আমাদের হস্তগত হয়নি। তবে এই মহত্তম দুটি আবিষ্কার যে ভারতীয় হিন্দুরা করেছিলেন, আজ আর সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। গণিতে কোম-না-কোন আবিষ্কারের পিছনে থাকে স্কম্পট কোন সমস্যা বা ঘটনা। বিশেষ করে জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের একটি ক্রমবিকাশ দেখা যায়। কিন্তু ‘শূন্য’ আবিষ্কার কোন সমস্যা কে কেন্দ্র করে হয়েছিল, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এর আবিষ্কারে দার্শনিকদের অবদান বেশী না গণিতজ্ঞদের কৃতিত্ব বেশী, এ-সম্বন্ধে বেদবাক্যস্বরূপ কিছু বলা যায় না।

॥ শূন্যের প্রাচীনতা ও দার্শনিক তাৎপর্য ॥

অধিকাংশ পাশ্চাত্য গণিতের ঐতিহাসিকরা শূন্য আবিষ্কারে ভারতীয় মনীষার উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসা করলেও, তাঁরা সবাই এই আবিষ্কারের উদ্ভব-কাল খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ঘটনা বলে মনে করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ-বিষয়ে আমাদের কোন লিখিত প্রমাণ নাই। তা হলেও প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-দর্শন-সাহিত্য প্রভৃতিতে শূন্যের উল্লেখ থেকে মনে হয় শূন্য আবিষ্কার খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর ঘটনা।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’-এ শূন্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ওই গ্রন্থে ‘শূন্য-নিবেশন’, ‘শূন্যপাল’, ‘শূন্য-স্থান’ ইত্যাদি শব্দের

ব্যবহার থেকে মনে হয় বিষ্ণুগুপ্তের সময় “শূন্য”-এর প্রচলন বোধেই ছিল। শুধু তাই নয়, ‘শূন্যপাল’ শব্দের অর্থ থেকে মনে হয় ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অজ্ঞাতরাশি বোঝাতে শূন্যের ব্যবহার কোটিল্যের যুগের বহু পূর্ব থেকেই করে আসছেন। “বকশালী পাণ্ডুলিপি”-তেও যে এর প্রমাণ আছে, তার দৃষ্টান্ত তো আগেই দেওয়া হয়েছে। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ‘শূন্য-নিবেশন’ ও ‘শূন্যপাল’ শব্দ দুটির অর্থ স্বাভাবিকভাবে “শূন্য বা কণিকাতির অযোগ্য ভূমিতে কণিকাদির নিবাসাদির রচনা” এবং “যুদ্ধকালে প্রবৃত্ত রাজ্যের অস্থগতিতে শূন্য রাজধানীর পালক” বলেছেন। বস্তুত এখানে গাণিতিক শূন্যের সঙ্গে কোটিল্যের ধারণার অমিল নাই।

অধ্যাপক হলস্টেড শূন্যকে নির্বাণ-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যই তুলনাটি যেমন সার্থক তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণভঙ্গুর সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। জানি না, বুদ্ধদেব তাঁর নির্বাণের ধারণা এই আধিতিক শূন্য থেকেই পেয়েছিলেন কিনা। তথাগত নির্বাণের ধারণা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, “তাঁহার অতি গভীর অস্থভূতিতে তিনি যে স্তরের (অর্থাৎ দেশ-কালের অতীত সত্তার) সন্ধান পান, তা তর্ক দ্বারা বুঝা যায় না, কেবল বোধিতে বোধগম্য হয়।” (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন—ডঃ সত্যশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) এই ধারণার উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর ‘শূন্যবাদ’ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ‘শূন্যবাদ’ বলতে সাধারণত “জগতে কোন অস্তিত্ব নাই, সবই শূন্য ও নিরূপাক বা অসং পদার্থ” বুঝায়। বস্তুর প্রকৃত সত্তার অনির্বচনীয়তাই শূন্যবাদের মূল কথা। গাণিতিক শূন্যও এক হিসাবে অনির্বচনীয়, —ভাব্য প্রকাশ প্রায় অসম্ভব বলেই চলে। কাব্য-সাহিত্যেও শূন্যের বিন্দু-রূপটি লক্ষ্য করা যায়। হুবহু বাসবদত্তা, বাণভট্টের কাদম্বরী, শ্রীহর্ষের ঐশ্বর্যচরিতে ‘শূন্য বিন্দু’-র উল্লেখ আছে। কাদম্বরীর নায়ক তো যৌবনে আবার ‘বিন্দুমতী’ খেলতেন। প্রাচীন দার্শনিক ও কবিদের এই সব উদাহরণ থেকে মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে অন্তত বুদ্ধের পূর্বেই শূন্যের আবির্ভাব হয়ে থাকবে।

॥ শূন্যের গাণিতিক তাৎপর্য ॥

একথা সত্য, মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতিতে শূন্য অভূতপূর্ব ভরণ সৃষ্টি করেছিল,—মানব-মনীষার মুক্তি দিয়েছিল। দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে সংখ্যা-লিখনের সুবিধার মধ্যেই ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের ব্যবহার সীমিত রাখেননি,

এর গাণিতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট মনোবা নিয়োজিত করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের দার্শনিক তাৎপৰ্য উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে গণিতের ব্যবহারিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি রেখে একে সংখ্যা হিসাবে গণ্য করেছেন। আৰ্যভট্ট কর্তৃক প্রদত্ত বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের সূত্রের মধ্যে শূন্যের ব্যবহারিক দিকটি পরিষ্কৃত হয়েছে; ব্রহ্মগুপ্ত শূন্যের সহিত মৌলিক প্রক্রিয়াগুলির সম্বন্ধের উল্লেখ করেছেন; ব্রহ্মগুপ্তের উত্তরসূরীরা মৌলিক প্রক্রিয়াগুলিতে শূন্যের ব্যবহার বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট মন্তব্য করে এর তাৎপৰ্য ব্যক্ত করেছেন। এমন কি, পাটীগণিত ও বীজগণিতে শূন্যের পৃথক পৃথক তাৎপৰ্যের উল্লেখ থেকে মনে হয়, তাঁরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

॥ শূন্যের পাটীগণিতিক তাৎপৰ্য ॥

শূন্য বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসূত্রসিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। এ-সম্পর্কে সূত্রাদিও আছে। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের দ্বারা যোগ, বিয়োগ ও গুণের বিষয় সুন্দর আলোচনা করেছেন, কিন্তু ভাগ সম্পর্কে তেমন সূত্র ও সুস্পষ্ট আলোচনা নাই বললেই চলে। তবে পাটীগণিতে ও বীজগণিতে যে শূন্যের ব্যবহার একটু ভিন্ন প্রকার, তাতে সন্দেহ নাই। তাই গণিত-কৌমুদীর লেখক নারায়ণ পণ্ডিত বলেছেন, পাটীগণিতে শূন্যের দ্বারা ভাগের কোন অর্থ হয় না, সেজন্য এখানে আলোচিত হলো না। কিন্তু যেহেতু বীজগণিতে এর অর্থ হয়, তাই সেখানে উল্লেখ করা হলো। দ্বিতীয় আৰ্যভট্ট তাঁর মহা-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে বলেছেন, শূন্যকে কোন সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করলে সংখ্যাটি অপরিবর্তিত থাকে, এবং বিয়োগের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। শূন্য দ্বারা গুণের ফল হবে শূন্য। ব্রহ্মগুপ্ত একই কথা বলেছেন। এ-সব তথ্য থেকে এটা অতি স্পষ্ট যে, ভারতীয় গণিতজ্ঞরা শূন্যের পাটীগণিতিক তাৎপৰ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

॥ শূন্যের বীজগণিতিক তাৎপৰ্য ॥

এ-সম্পর্কে ব্রহ্মগুপ্তের ধারণা ও সূত্রাদি উল্লেখ করার মত। তাঁর বোগের সূত্রটি নিম্নরূপ :

ধনয়োৰ্ধনমূণমূণয়োৰ্ধনৰ্ণয়োৱন্তরং সমঠৈ ধম্ ।

কণঠৈক্যং চ ধনমূণধনশূন্যয়োঃ শূন্যয়োঃ শূন্যম্ ॥

“অর্থাৎ ধনাত্মক রাশিগুলির যোগ ধনাত্মক, ঋণাত্মক রাশিগুলির যোগ

ঋণাত্মক।.....ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক একই রাশির যোগ শূন্য হবে। ঋণাত্মক রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ঋণাত্মক হবে। ধনাত্মক রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ধনাত্মক হবে। দুটি শূন্য যোগ করলে শূন্য হবে।” (প্রা. ভা. গ. চ.)

আধুনিক গণিতের ভাষায়,—

$$a-a=0; a+0=+a; -a-0=-a; 0+0=0$$

গুণনের ক্ষেত্রে শূন্যের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, শূন্য ও ধনরাশি, শূন্য ও ঋণরাশি:এবং শূন্য ও শূন্যের গুণফল সর্বদা শূন্য হবে। তাঁর সূত্র:

শূন্যগুণ্যোঃ ঋণগুণ্যোঃ ঋশূন্যগুণ্যোর্বাহবঃ শূন্যম্।

$$\text{অর্থাৎ } a \times 0 = 0; -a \times 0 = 0; 0 \times c = 0$$

ভাগ সম্পর্কেও ব্রহ্মগুপ্তের সূত্রেই ধারণা ছিল। এ-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে, শূন্য দ্বারা শূন্যকে ভাগ করলে ভাগফল শূন্য হয়; ধনরাশি বা ঋণরাশিকে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ‘তচ্ছ্বেদ’ অথবা শূন্য অথবা লব হরকে $\frac{0}{a}$ দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত $\frac{\pm a}{0}$ —কে ‘খ-ছেদ’ বলেছেন।

এ-বিষয়ে তাঁর সূত্রটি উদ্ধৃত হলো।

ধনভক্তঃ ধনমূণমতমূণং ধনং ভবতি খং খভক্তঃখম্

ভক্তমূণেন ধনমূণং ধনেন মতমূণমূণং ভবতি।

ধোদ্ধতমূণং ধনং বা তচ্ছ্বেদং খমূণধনবিভক্তং বা

ঋণধনয়োর্বর্গঃ খং খং খস্তু পদং কৃতির্ধত তং।

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ বিষয়ে ভাস্করের ব্যাখ্যাও ব্রহ্মগুপ্ত অমুসারী। তবে শূন্যরূপী ভাজকের ক্ষেত্রে তাঁর মত বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। তিনি বলেছেন, শূন্য দ্বারা ভাগ অশেষ হয়; শূন্যের ক্ষেত্রে শূন্য হলেও শূন্য গুণকরূপে থাকবে; আর শূন্যকে ভাজকরূপে ধরলে অবিকৃত রাশি বা উহ্ম আছে তা অপরিবর্তিত থাকবে।

কোন সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগের ক্ষেত্রে মহাবীরের একটি ভুল সিদ্ধান্ত আছে। তিনি বলেছেন, কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যাটির কোন পরিবর্তন হবে না।

॥ শূন্য ও ইপসিলন ॥

আধুনিক অতি অতি ক্ষুদ্র মান একটি গ্রীক বর্ণ ইপসিলনের (ε) সাহায্যে

প্রকাশ করার রীতি আছে। এ-বে কত ছোট, তা কেবল কল্পনার সাহায্যেই করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, কখনো কখনো শূন্য ও ইপসিলনকে পৃথক করা বেশ মুশ্কিলের। প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ইপসিলনের স্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়া গেলেও ব্রহ্মগুপ্তের একটি উক্তি থেকে ধারণা করা যায় যে, হয়তো এই গণিতাচার্যের শূন্যের অতি ক্ষুদ্র মান সম্পর্কে ধারণা ছিল। তিনি $a \div 0$ এবং $0 \div a$ এর ভাগফল দুটিকে $\frac{a}{0}$ এবং $\frac{0}{a}$ এই আকারে বেধে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কেন এরূপ আকারে বেধে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন, তার কোন ব্যাখ্যা বা বুদ্ধি দেননি। সর্ববিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করে হুদুমগুনীতে সম্ভ্রম খ্যাতি অর্জন করার প্রবণতার ফলে প্রাচীন ভারতের গণিতের অনেক বিষয় রহস্যমণ্ডিত হয়ে গেছে, এবং তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের স্রষ্টা হয়েছে।

যাই হোক, ব্রহ্মগুপ্ত আমাদের রহস্যের মধ্যে ফেললেও আচার্য ভাস্কর কিন্তু শূন্যের অতি ক্ষুদ্রতম মান (ϵ) সম্পর্কে আমাদের কিছুটা স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তিনি $a \times 0 = 'খ-গুণ'$ বলেছেন; গুণফলটির মান শূন্য বলেননি। তা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা গাণিতিক গণনা থেকে মনে হয় তিনি ϵ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর এ-সম্পর্কিত সূত্র:

খহরঃ স্যাৎ স্বগুণঃ খং খগুণশ্চিস্ত্যশ্চ ।

॥ শূন্য ও অনন্ত ॥

জৈন গণিতজ্ঞদের কাল ও সংখ্যা বিভাগের বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে মনে হয় অমন্ত (∞) সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল। ভাস্কর শূন্য দ্বারা বিভাজিত কোন সংখ্যার ভাগফল 'খ-হর' বলেছেন। অর্থাৎ $\frac{a}{0} = 'খ-হর'$ । ব্রহ্মগুপ্ত কথিত 'খ-ছেদ' ও 'খ-হর' সমার্থক বলে মনে হয়। আচার্য ভাস্করের মতে এই খ-হরের সঙ্গে কোন-কিছু যোগ বা বিয়োগ করলে তার মানের কোন পরিবর্তন হয় না। এ-বিষয়ে ভাস্করের ব্যাখ্যা দার্শনিক মনের পরিচায়ক ও ভারতীয় ঐতিহাসিকসারী। তিনি বলেছেন, অনন্ত শ্রীভগবানের মধ্যে অসংখ্য জীবের অঙ্গ ও ধ্বংস হচ্ছে; কিন্তু তাতে তাঁর কোন পরিবর্তন সূচিত করে না। অর্থাৎ অনন্ত বা অসীমে কোন-কিছু যোগ-বিয়োগে কিছু আসে যায় না। এই মন্তব্যটিকে স্পষ্টই মনে হয় ভাস্কর $\frac{a}{0} = \infty$, এবং $\infty \pm k = \infty$ বলেই জানতেন।

ভাস্করবোস্তর যুগের ভাস্কর্য্য গণেশ মন্তব্য করেছেন $\frac{a}{0}$ অনির্দিষ্ট, অসীম, অনন্ত-রাশি। কারণ, এই রাশিটি যে কত বড় তা নিরূপণ করা যায় না। ভাস্কর্য্য কৃষ্ণ বলেছেন, এ-ক্ষেত্রে ভাগফল কত বড় তা নির্দিষ্ট করা যায় না বলে অনন্ত বলে ধরে নিতে হবে।

মধ্যযুগের গণিতজ্ঞরা শূন্যের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত চিহ্ন ও সংকেতের অভাবে এর সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি। যেমন,—

আধুনিক গণিতে $\lim_{e \rightarrow 0} \frac{a \cdot e}{e} = a$, এই সম্পর্কটি বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু ভাস্করের সময় এক্ষণে কোন প্রতীক ও চিহ্ন না থাকায়, তিনি অজ্ঞভাবে এই একই গাণিতিক ধারণা কাছে লাগিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ভাস্করের একটি অঙ্ক উদ্ধৃত হলো :

উদাহরণ : কঃ খণ্ডণো নিজার্দ্ধযুক্ত স্ত্রিভিশ্চ গুণিতে খলতস্ত্রিযষ্ঠিঃ।

অর্থাৎ কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করে সংখ্যাটির অর্ধেক যোগ করে তার তিনগুণকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে 63 হবে ?

ভাস্করের পদ্ধতি : “অজ্ঞতো রাশিস্তস্য গুণঃ 0। সার্দ্ধংক্ষেপঃ $\frac{1}{2}$ গুণঃ 3। হব। 0 দৃষ্টং। 63। ততো বক্ষ্যমাণেন বিলোম বিধিনা ইষ্টকর্মণা বা লকো রাশিঃ 14।”

অর্থাৎ একটি অজ্ঞাতরাশি নেওয়া হলো, একে শূন্য দ্বারা গুণ করে $\frac{1}{2}$ যোগ করা হলো ; এবার একে 3 দিয়ে গুণ করা হলো, শূন্য দিয়ে ভাগ করা হলো। এখন রাশিটি 63। বিপরীত প্রণালী বা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী রাশিটি 14 হবে।

আধুনিক গণিতের ভাষায় অঙ্কটি প্রকাশ করলে,—

$$\frac{x \times 0 + \frac{x \times 3}{2}}{0} = 63$$

ভাস্কর x -এর মান দিয়েছেন 14

স্পষ্টত এখানে শূন্যকে শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় নি। নিঃসন্দেহে এখানে $0 = e$ বা অজ্ঞরূপ ধারণা।

॥ আধুনিক কবির ভাষায় শূন্য ॥

শূন্যের কত না বৈচিত্র্য ! গণিজ্ঞদের কাছে এর এক রূপ, দার্শনিকদের কাছে আবার আর এক রূপ। কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় রসঘন রূপের প্রকাশ ঘটে।

কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ একবার 'ভারতী' পত্রিকায় 'শূন্য' নামে একটি কাব্যরসমণ্ডিত প্রবন্ধ লেখেন। শূন্যের নানা আলোচনার শেষে 'মিষ্টান্ন ইতরে জনা' করা যাক না কেন। কবির ভাষায়,—

“এক একজন লোক আছে তাহার। বতকণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে একটা শূন্য (০) মাত্র; কিন্তু একের সহিত যখন যুক্ত হয় তখন দশ (১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহার। কি না করিতে পারে। সংসারে শত সহস্র শূন্য আছে বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে—তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসিয়া তাহার। উপযুক্ত ‘এক’ পাইল না। কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। এই সকল শূন্যদের এক মহা দোষ যে, পরে বসিলে ইহার। ১-কে ১০ করে বটে কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়ম অল্পদূরে ১-কে তাহার। শতাংশে পরিণত করে (০.১) অর্থাৎ ইহার। অস্ত্রের দ্বারা চালিত হইলেই চমৎকার কাজ করে বটে, কিন্তু অস্ত্রকে চালনা করিলে সমস্ত মাটি করে। ইহার। চমৎকার নৈমিত্ত যে মন্দ সেনাপতিকে ও জিতাইয়া দেয় কিন্তু এমন খারাপ সেনাপতি যে ভাল নৈমিত্তদেরও হারাইয়া দেয়। দ্বী-মর্যাদা অনভিজ্ঞ গৌরারগণ বলেন, দ্বীলোকের। এই শূন্য। ১-এর সহিত বতকণ তাহার। যুক্ত না হয় ততক্ষণ তাহার। শূন্য। কিন্তু ১-এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১-কে এমন বলীয়ান করিয়া তুলে যে দেশের কাজ করিতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১-এর পূর্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১-বেচারীকে তাহার। শতাংশে পরিণত করেন। দ্বৈপ পুরুষদের এক নাম ‘০.১।’

বলা বাহুল্য, এখানে ক্ষুদ্রতম সংযোজনও নিঃপ্রয়োজন। তবে দ্বীলোক সংক্ষেপে যে একটি কথা আছে “দেবাঃ ন জানন্তি কূতঃ মনুষ্যাঃ”, এটি বোধ হয় শূন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

॥ ভাষ্যতত্ত্ব ও ভারতীয় গণিতের কাল ॥

প্রমাণপঞ্জীর অভাবে ভারতীয় গণিতের প্রাচীনতা বিষয়ে অনেক জায়গায় সংশয়ের অবকাশ আছে। এই সংশয় থেকে মুক্তি পাবার যে খুব বেশী সম্ভাবনা আছে, তা মনে হয় না। কিন্তু ভারতীয় গণিতে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দের বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে অনেক জায়গায় সংশয়ের অবসান হতে পারে বলে মনে হয়। এ-বিষয়ে সুধীমগুলী একটু ভেবে দেখতে পারেন। আবার, প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ব্যবহৃত অনেক পারিভাষিক শব্দের বর্ধাযক ব্যাখ্যা

এখন দুক্লহ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাপক, দীর্ঘ ও শ্রমশীল গবেষণা চালালে এরও সমাধান হতে পারে। যেমন—ভারতীয় গণিতে ‘গোমূত্রিকা’ পদ্ধতি নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। গণিতের ঐতিহাসিকরা কেবল স্থূল অর্থ গোমূত্রের ছায় তির্যক বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই অর্থ একান্তই স্থূল,—এর আরো কোন গভীরতর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থাকতে পারে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গোমূত্রিকা-এর উল্লেখ আছে, এবং যে অর্থে সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, গণিতে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে তার ব্যুৎপত্তিগত মিল আছে বলে মনে হয়। অর্থশাস্ত্রে গোমূত্রিকা ‘বিত্তিলাকারে ব্রাহ্মনির্মাণ’ অর্থে ব্যবহৃত। গণিতে এই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্যুৎপত্তি এলোমেলোভাবে হয় না,—গোমূত্রিকার স্থূল আকারের মত হয়।

আর্যসভ্যতা যে মিশ্র সভ্যতা, এতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ মত পার্থক্য নাই। আর্য পূর্ব বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য স্বীকরণ করে ভারতীয় আর্যসভ্যতার বিকাশ। তাই আর্যভাষার মধ্যে নানা গোষ্ঠীর ভাষার অল্প প্রবেশ ঘটেছে, বহু শব্দ অল্পপ্রবিষ্ট হয়ে এই ভাষার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সাধারণের চোখে সে-সব শব্দ ধরা না পড়লেও কিছু কিছু শব্দ ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আচার্য স্থনীতিকুমার, জাঁ পশিলুস্কি ও সিলভ্যো লেভি প্রমুখের অষ্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ বিষয়ে গবেষণা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। জাঁ পশিলুস্কির *Vigesimal Numeration in India* এবং *Bengali Numeration and Non-Aryan Substratum* প্রবন্ধ দুটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

প্রথম প্রবন্ধে পশিলুস্কি ভারতে বিংশতি-ভিত্তিক সংখ্যা গণনার মূল উৎস নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে মাহুঘের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ভিত্তি করে বিংশতি-ভিত্তিক গণনার উদ্ভব। মাহুঘের হাতে-পায়ে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে আঙুল মিলে কুড়ি (20) সংখ্যাটির আবির্ভাব। সে-কারণে 20 ও মাহুঘ সমার্থক, এক 20-র উপর ভিত্তি করেই অষ্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীভূত ভাষাভাষীদের উচ্চতর সংখ্যা-গণনা রচিত হয়েছে।

শান ও খড়-এর হিসাব রাখার ব্যাপারে এই পদ্ধতির আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—পন=এক আনা=4 পয়সা=80 কড়ি=80। অষ্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর সাঁওতালী ভাষায় ‘পন’ শব্দের অর্থ 80। ‘বার পন গাছি’ =160 খাঁটি ধানবীজ। এখানে, ‘বার’=2, ‘পন’=80। আবার

সাঁওতালীতে ‘পণ’=4, ‘পণ’ 20 র চতুর্গুণ হিসাবে হয় বলে ভাষাতাত্ত্বিকদের মত। এ কারণে সংক্ষিপ্ততার জন্য 8) কে 4 বলে মনে করা হতো। সাঁওতালী ‘পণ’-এর সঙ্গে আমাদের 100-এর কোন পার্থক্য নাই। 4 এবং 20-র গণনা রীতি থেকেই পণ-এর প্রবর্তন হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

সাঁওতালী গণনার দেখা যায়, পণ=80, 20 গণা=1 পণ, এবং গণা=4 ; নিঃসন্দেহে 4-সংখ্যাটি এই পদ্ধতিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যেমন,—

গণা	কুড়ি	পণ
4	20	80
	(5×4)	(20×4)

সংস্কৃতে গণ্ডক শব্দের অর্থ চার কৌড়ি বিশিষ্ট মুদ্রা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কৌড়ির মুদ্রা হিসাবে ব্যবহারের রীতি নাই। ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একরূপ রীতির প্রচলন ছিল। এই তথ্য থেকে পশিলুন্ধি সিদ্ধান্ত করেছেন ‘গণা’ অস্ট্রো-এশীয় শব্দ। হুতরাং একরূপ বলা যেতে পারে, ভারতীয় গণিতে ‘গণা’ বা গণ্ডকের ব্যবহার এর সুপ্রাচীনতা প্রতিপন্ন করছে।

অজ্ঞাতরাশি শব্দে প্রাচীন ভারতীয় গণিতে ‘সাবং-তাবং’-এর ব্যবহার দেখা গেছে। এই শব্দটিও অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষায় কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়ে একরূপ শব্দসমূহ গঠন লক্ষ্য করা যায় না। অধিকন্তু, এটি অস্ট্রো-এশীয় বৈশিষ্ট্য। দিল্লী লেভির এই গবেষণা থেকে একরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় গণিতে কেবলমাত্র আর্ষসভ্যতার ফসল নয়, এতে আর্ষপূর্ব সভ্যতার অবদানও আছে।

আচার্য হুনীতি কুমারের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, অনেক বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি শব্দের উৎস অস্ট্রো-এশীয় ভাষা,—কোল বা মুণ্ডা থেকে। সংস্কৃত বিংশ সংখ্যার বাংলা রূপ বিস, বিশ ও কুড়ি। পশিলুন্ধি দেখিয়েছেন, সংস্কৃত কোটি থেকে কুড়ি-র উদ্ভব হয়নি,—হয়েছে অস্ট্রো-এশীয় ভাষা থেকে। বাংলা ভাষায় বিংশতি-ও গণা-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা এখনো দেখা যায়। পল্লীবাংলার অশিক্ষিত জনসাধারণ বিশেষ করে মহিলারা এখনো তেইশ বোঝেন না, কিন্তু এক কুড়ি তিন বোঝেন, এবং দশ বোঝেন না, হু গণা হই বোঝেন।

৪-সংখ্যার যে বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে, তা কেবল অষ্টো-একাদশ ভাগাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যই নয়, ভারতীয়-আর্য ভাষায় একক ব্যবহারেও অঙ্করূপ বীতি দেখা যায়। এখানে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে থেকে একটি এককের তালিকা দেওয়া হলো :

$$৪ \text{ পরমাণু} = 1 \text{ বিপ্রষ্ট}$$

$$(=2 \times 4)$$

$$৪ \text{ বিপ্রষ্ট} = 1 \text{ লিঙ্গা}$$

$$(=2 \times 4)$$

$$৪ \text{ লিঙ্গা} = 1 \text{ যুকামধ্য}$$

$$(=2 \times 4)$$

$$৪ \text{ যুকামধ্য} = 1 \text{ যবমধ্য}$$

$$(=2 \times 4)$$

$$৪ \text{ যবমধ্য} = 1 \text{ অঙ্গুল}$$

$$(=2 \times 4)$$

$$৪ \text{ অঙ্গুল} = 1 \text{ ধনুগ্রাহ}$$

$$৪ \text{ অঙ্গুল} = 1 \text{ ধনুসূত্রি}$$

$$(=2 \times 4)$$

$$১২ \text{ অঙ্গুল} = 1 \text{ বিতস্তি}$$

$$(=3 \times 4)$$

$$২৪ \text{ অঙ্গুল} = 1 \text{ অরতি}$$

$$(=6 \times 4)$$

বিংশতি-ভিত্তিক সংখ্যা গণনার এককও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় :

$$৪০ \text{ হস্ত} = 1 \text{ বঙ্কু}$$

$$(=2 \times ২০)$$

$$৪০ \text{ হস্ত} = 1 \text{ পরিদেশ}$$

$$(=4 \times ২০)$$

$$১২০ \text{ হস্ত} = 1 \text{ নিবর্তন}$$

$$(=6 \times ২০)$$

পরিচালনার বিষয়, অঙ্করূপ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা বেনীদুর অগ্রসর হয় নি। এমন কি, ভারতীয় সভ্যতা কতখানি অনার্য সভ্যতার কাছে ঋণী, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের নিরাশ করেছে। বিদেশী পণ্ডিতরা বার বার আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন, কিন্তু আমরা অসম্মুখ, ভাগচাষের ফসল পেতেই আগ্রহী। কেবল তাই নয়, আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা যা অনার্য সভ্যতার কাছে অনেকাংশে ঋণী স্বীকার করলে ‘জাত’ যাবার ভয়ে আমরা অনেকেই নির্বাক। এ-বিষয়ে মনসী পিলভ্যা লেভির মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য: *The daring and skill of these men she was unable to appreciate before and she continued to ignore all that she owed to them.*

অনার্য-আর্য সভ্যতার সমগ্র ফলনই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি,—উত্তরাধিকার। কেবল কৌতূহল নয়, জ্ঞানার জন্যই জ্ঞান নয়, আত্মার সংস্কারের জন্যও তা জ্ঞানার দরকার আছে। তাই ঐতব্যের ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে,—আত্মা সংস্কৃতিবান্ শিল্পামি....আত্মানং সংস্করতে। একটি জাতির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায় তার উত্তরাধিকার, কুলশীল, তার চর্য ও চর্চার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,—“....মাহুষ যখন তার নিজের কালের প্রশ্ন, সমস্তা ও দায়-দায়িত্বের সম্মুখীন হয়, তখন স্বভাবতই সে তার প্রেরণা, উত্তর ও সমাধান খোঁজে তার অতীতের উত্তরাধিকারের মধ্যে। তার ভেতর সে কিছু প্রেরণা, কিছু উত্তর নিশ্চয়ই পেতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি কিছুতেই নয়, কারণ অতীত কিছুতেই একই রূপে ও আকৃতিতে পুনরাবর্তিত হয় না; কালধর্মের নিয়মেই তা নয়।...যাই হোক, এ ইচ্ছিতটি পরিষ্কার যে, প্রত্যেকটি মানব-বংশকে, প্রত্যেকটি কালকেই পরীক্ষা-নিবীক্ষা করে দেখতে হয় তার কুল বা উত্তরাধিকারকে....।...এই শীলচরণই মাহুষের উত্তরাধিকার বা অতীত, অম্লার্ধে কুল-চেতনার পরিচয়, বর্তমান-চেতনার পরিচয়, ভাবী কাল সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয়।”

• • • • •

এল. হগবেন বলেছেন,—গণিতের ইতিহাস হচ্ছে মানবসভ্যতার দর্পণ (The history of mathematics is the mirror of civilization.)। আমাদের তৈরী এই ক্ষুদ্র দর্পণে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রূপরেখা দেবার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। শুধু তাই নয়,—আজকের পুরোপুরি বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার যুগে যে গণিতের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। পঞ্চাশের দশকের পর বাংলাদেশে যেন গণিতের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার অভাব বেশী করে দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাতেই জ্ঞানেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় গণিতের অবাধ অধিকার ও বিচরণ। একথা সত্য, আগের চেয়ে এখন গণিত বহুল পরিমাণে বিমূর্ত—বাস্তবের সঙ্গে এর ছোঁয়া আর নাই বললেই চলে। কিন্তু সেটাই তো মাহুষের অনন্তসাধারণ ক্ষমতার গৌরব। এই গৌরব ও মর্যাদার দিকটি আমাদের দেশের গ্রেষ্ঠ গণিতাচার্যরা সম্যকরূপেই উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য তখন আজকের মত বিস্তৃত গণিতের চর্চা ব্যাপকভাবে হয়নি, আর সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্ভবও ছিল না। ভারতে গণিতের চর্চা মূলত—

জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। যে-দেশের সমাজ-রাষ্ট্র ধর্মীয় নীতির অনুশাসনে পরিচালিত হতো, সে-দেশে যে জ্যোতিষ তথা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষ মর্যাদা পাবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

সিদ্ধান্ত-শিরোমণি-র গণিতাধ্যায়ে আচার্য ভাস্কর জ্যোতিষের প্রশংসা করে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ; তিনি মাহুঘের দেহের সঙ্গে বেদ সহায়ক শাস্ত্রাদির তুলনা করেছেন। আমরা তাঁর কথাই হু-একটি পরিবর্তন করে বলতে পারি,—

শব্দশাস্ত্রং যুগং 'গণিতং' চক্ষুর্বা
 শোভয়ন্তং নিরুক্তং চ কল্পঃ করৌ ।
 যা তু শিক্ষাস্ত বেদস্ত সা নাসিকা
 পাদপদ্যদ্বয়ং ছন্দ আদৈবু^১ বৈঃ ॥
 বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং 'গণিতং'
 যুধ্যতা চাক্ষমধ্যে^২ ন্য তেনোচ্যতে ।
 সংযুক্তো^৩ নীতরৈঃ কর্ণ^৪ নাসাদিভি-
 শ্চক্ষুযাদৈম হীনো ন কিক্ষিৎকরঃ ॥

 যো 'গণিতং' বেত্তি মনঃ স সম্যগ্-
 বস্মা^৫ কাশাস্ত্র^৬ ভতে বশন্ত ॥

অনুবাদঃ ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্র বেদের যুগ, গণিতকে চক্ষু, যজ্ঞোপকরণ ত্রযাদি-জ্ঞাপক নিরুক্ত শাস্ত্র কর্ণ, বস্ত্র-পদ্যভি-জ্ঞাপক কল্পশাস্ত্র হস্তদ্বয়, বর্ণোচ্চারণ ভেদ-জ্ঞাপক শিক্ষা বেদের নাসিকা এবং ছন্দ-শাস্ত্রকে বেদের পদদ্বয় নামে প্রাচীন জ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন।

গণিত বেদের চক্ষুস্বরূপ। এইজন্য এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে গণিতই প্রধান। যেহেতু কর্ণ নাসিকাদি অপর অঙ্গ সকল থাকলেও চক্ষুহীন ব্যক্তি অকিক্ষিৎকর হয়। যিনি সম্যকরূপে গণিত জানেন তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও বশ লাভ করেন।*

আমাদের বিশ্বাস প্রাচীন ভারতের গণিত এখনো শেষ হয়নি। এর মধ্যে নানা সম্পদ ও ঐশ্বর্য এখনো ইঙ্গিতে-আভাসে অস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়ে আছে।

* মূল সংস্কৃত অংশে জ্যোতিষ বলে 'গণিত' লেখা হয়েছে এবং সেরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

প্রকৃত পণ্ডিত ও সুধীমণ্ডলী এসব রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারেন, কোন কোন পাশ্চাত্য গণিতের ঐতিহাসিকও একথা স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে *A Concise History of Mathematics*-এর লেখক *D. J. Struik* বলেছেন,—“Ancient India may still yield many more Mathematical treasures.” আমরাও সেই treasure-এর প্রতীক্ষা করছি বা মানব-সভ্যতার উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও বিতর্কের অবসান ঘটাবে।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
অংশ ঐ	বৃত্তের 360 ভাগের এক ভাগ চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু	Degree An upper vertex of a quadrilateral
অগ্র	প্রান্ত বা শেষ ; অবশিষ্ট বা ভাগশেষ	Tip or end ; residue or remainder
অগ্রান্তর	ভাগশেষ পার্থক্য	residue difference
অঘন	ঘন নয়	Non-cube
অধিকাংশ	বৃহত্তর ভাগশেষ	Greater remainder
অধিকাগ্রভাগহার	বৃহত্তর ভাগশেষের পরিপ্রেক্ষিতে ভাজক	Divisor corresponding to greater remainder
অহলোম	ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিক	Anticlockwise
অন্তর	দুইটি রাশির পার্থক্য	Difference between two quantities
অন্ত্যপদ	শেষপদ	Last term in a series
অপচয়	বিয়োগ্য	Subtractive
অক্ষমারজ্জু	আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের কর্ণ	The diagonal chord of a rectangle or a square
আবাম্বা, অবাম্বা, বাম্বা	ভূমির উপর তির্যক বাহুর অভিলম্ব	The projection of any slanting side on the horizontal
অভ্যান	গুণন	Multiplication
অবুর্দ	10°	10°
অবর্গ	ক-বর্গ, চ-বর্গ ইত্যাদি নয়	—
আদি, আদিঘন	প্রথম পদ	First term
আয়ত, আয়তচতুর্ভুজ	আয়তক্ষেত্র	Rectangle
আয়তবৃত্ত	উপবৃত্ত	Ellipse

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
আয়াম	দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ	Length or breadth
আয়ামক্ষেত্র	ট্রাপিজিয়াম	Trapezium
আসন্ন	আসন্ন	Approximate
ইচ্ছা, ইচ্ছারানি	ত্রৈবানিকের একটি ঈঙ্গিত রানি	Requisition, one of three quantities in the rule of three.
ইচ্ছাফল	ফল	Fruit corresponding to icchā
ইষ্ট	প্রদত্ত সংখ্যা	Given number
উৎসেধ	উচ্চতা	Height
উত্তর	সাধারণ অন্তর	Common difference
উদীচা	উত্তর-দক্ষিণ রেখা	North-South line
উপতিতি	সাধারণ শ্রেণী	A series in general
উভয়ত প্রযুগ	দ্বিগুণদ্বিবাহু ত্রিভুজ ; রম্বস	Double isosceles triangle ; Rhombus
উনাগ্র-ছেদ	ক্ষুদ্রতর ভাগশেষের পরিপ্রেক্ষিতে ভাজক	Divisor corresponding to smaller remainder
উর্ধ্বভুজা	উচ্চতা বা উন্নয় বাহু	Altitude or vertical side
খড়্ভুজ	সমরেখ ক্ষেত্র	Rectilinear figure
ঋণ	ঋণাত্মক	Negative Quantity
করণী	সমরেখ ক্ষেত্রের বাহু ; বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের বাহু	The side of a rectilinear figure ; the side of a square or rectangle
করণ	কর্ণ ; অতিভুজ	Diagonal or hypotenuse

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
কোট	সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব	The perpendicular side of a right-angled triangle
কোটিজ্যা	চাপের কোসাইন-জ্যা	R cos of the angle
কোণ	কোণ	Angle
ক্ষয়	ঋণ, ঋণাত্মক	Minus, negative
ক্ষেত্র	বন্ধক্ষেত্র	Closed figure
ক্ষেত্রগণিত	জ্যামিতি	Geometry
ক্ষেত্রবিভাগ	দেখ বিভাজন	Division of space
ক্ষেত্রফল	ক্ষেত্রফল, কালি	Area
ক্ষেপ	সংযুজ্য রাশি	Additive quantity
খ	আকাশ ; শূন্য	Sky ; Zero
গচ্ছ	পদসংখ্যা	Number of terms
গণিত	গণিত ; ক্ষেত্রফল ; জ্যোতি-বিজ্ঞানের গণনা	Mathematics; area; Astronomical calculations
গ্রাস	পরস্পর ছেদী দুইটি বৃত্তের সাধারণ অংশ	The common portion of two intersecting circles.
গুণকার	গুণক	Multiplier
গুহিকা	অজ্ঞাত রাশি	A thing of unknown value
গোল	বৃত্ত ; গোলক	Circle ; sphere
ঘন	ঘন	Cube of a number
ঘনগোল	কঠিন গোলক	Solid sphere
ঘনক্রিতিঘন	স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনশ্রেণীর সমষ্টি	Sum of the series of cubes of natural numbers
ঘনফল	আয়তন	Volume

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
ঘনমূল	ঘনমূল	Cube root
বাটক্ষেত্র	চিত্রাকারে গুণফল	Diagrammatic representation of multiplication product
চক্র	বৃত্ত	Circle
চতুরঙ্গ	চতুর্ভুজ	Quadrilateral
চতুর্কোণ	চতুর্ভুজ	Quadrilateral
চাপ, কামূর্ক, ধনুস	চাপ	Arc
চাপঅ্যর্থ	—	R Sine
চাপক্ষেত্র	খণ্ড, অংশ	Segment
চিতি	স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি	Sum of a series of natural numbers
চিতিধন	—	Sum of a series Σn
চিতিবর্গ	স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি	Square of the sum of a series of natural numbers
ছেদ	হর	Denominator
জীবা	—	R Sine
অনু	মূলদ ত্রিভুজ বা আয়তক্ষেত্র	Rational triangle or rectangle
জাত্য	মূলদ সমকোণী ত্রিভুজ	A rational right-angled triangle.
তির্ধঙ্মানী	চতুর্ভুজের আড়াআড়িস্থিত বাহু	Transverse side of a quadrilateral
ত্রিঅ্য	ব্যাসার্ধ; পরিধির এক চতুর্থাংশ	Radius; one fourth of the circumference.
ত্রিভুজ	ত্রিভুজ	Triangle
ত্রিসম	সমবাহু ত্রিভুজ; সমান তিনটি	Equilateral triangle;

সংস্কৃত

বাংলা

ইংরেজী

বাহ বিশিষ্ট ট্রাপিজিয়াম

trapezium with
three sides equal.

ত্রিভুজ

ত্রিভুজ

Triangle

ত্রৈবংশিক

ত্রৈবংশিক

Rule of three

দ্বল

অর্ধ

Half

আবিযমভুজ বা আবিযম

দ্বিবাহ

Triangle

ধন

সংযুক্ত; ধনাত্মক

Additive, positive

ধনু

চাপ

Arc

নয়

শঙ্কু

Gnomon

না

রৈখিক দৈর্ঘ্যের একক

A unit of linear
measure equal to
four cubitsনিম্নত - 10^5 10^5

নিরবশেষ

সঠিক, যথার্থ

Exact

পদ

বর্গমূল; বৃত্তের পাদ;
শ্রেণীর পদSquare root; quad-
rant of a circle;
term of a series

পরকর্ণ

বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের
তৃতীয় কর্ণThe third diameter
of a cyclic Quadrila-
teral.

পরিদাহ

পরিধি

Circumference

পরিধি

পরিধি

Circumference

পরিমণ্ডল

উপবৃত্ত

Ellipse

পার্শ্ব

সন্নিহিত বাহু

Adjacent side

পার্শ্বমানী

চতুর্ভুজের সন্নিহিত বাহু

The adjacent side
of a quadrilateral.

প্রতিলোম

ঘড়ির কাঁটার দিকে

clockwise

প্রমাণ

ত্রৈবংশিকের যুক্তি

Argument in the
rule of three.

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
প্রযুত	10°	10°
পৃষ্ঠফল	পৃষ্ঠফল	Surface area
প্রমুগ	ত্রিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ	Triangle, an isos-celes triangle.
ফল	আসদের হ্রদ	Interest on principal
ফলবাশি	ত্রেয়াশিকের একটি বাশি	One of the three quantities in the rule of three.
ভাগ	ভাগ	Degree
ভাগহরণ	ভাগ	Division
ভাগহার	ভাজক	Divisor
ভূ	ভূমি	Base
মণ্ডল	বৃত্ত	Circle
মতি	ঐচ্ছিক সংখ্যা	Optional number
মধ্য	কেন্দ্র ; মধ্যক ; গড়	Centre ; middle term of a series ; mean.
মূখ	শ্রেণীর প্রথম পদ , সম্মুখীন বাহু	First term in a series ; face side.
মূল	বর্গমূল ; আসল	Square root ; prin-cipal
মূলফল	হ্রদ	Interest
বর্জক	পরিমাপ	Perimeter
কুণ্ড	প্রস্থ	Breadth
বাশি	চিহ্ন ; বাশি ; বারো	Sign ; quantity ; twelve
রূপ	এক	One
লম্ব	লম্ব ; উচ্চতা ; উন্নত	Perpendicular ; alti-tude ; vertical

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
বলয়াকার ক্ষেত্র	রিং-এর মতো ক্ষেত্র	Figure shaped like a ring.
বিমদ্বন্দ্ব	আয়তন	Volume
বিদ্বন্দ্ব	ব্যাস	Diameter
বিবর	পার্থক্য	Difference
বিশেষ	পার্থক্য	Difference
বিষম চক্রবাল	উপবৃত্ত	Ellipse
বিষম	বিষমবাহ চতুর্ভুজ ; বৃত্তে অঙ্কলিখিত চতুর্ভুজ	A quadrilateral with unequal sides ; a cyclic quadrilateral
বিস্তার	দৈর্ঘ্য	Length
বিদ্বৃতি	ব্যাস	Diameter
বৃত্তি	পরিসীমা	Perimeter
বৃত্ত	বৃত্ত	Circle
বেধ	গভীরতা	Depth
ব্যাস	ব্যাস	Diameter
ব্যাসার্ধ	ব্যাসার্ধ	Radius
শঙ্কু	শঙ্কু	Gnomon
শৃঙ্গাটক	ত্রিভুজ ; চতুস্তলক	Triangle ; tetrahedron
শ্রেণীক্ষেত্র	চিত্রাকারে গাণিতিক শ্রেণী উপস্থাপন	Diagrammatical representation of a mathematical series.
শ্রোণী	ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের নিম্নভাগের শীর্ষবিন্দু	A lower vertex of a triangle or quadrilateral.
ষট্শ্রী	চতুস্তলক	Tetrahedron
সংবর্গ	গুণন	Multiplication
সমচতুর্ভুজ	বর্গ	Square

সংস্কৃত	বাংলা	ইংরেজী
সমদলকোটি	ত্রিভুজের উচ্চতা	Altitude of a triangle
সমপরিগাহ	বৃত্তের পরিধি	Circumference of a circle.
সমবৃত্ত	বৃত্ত	Circle
সম্পর্ক	সমষ্টি	Sum
সর্বধন	শ্রেণীর সমষ্টি	Sum of a series
সবর্ণত্ব	সমহবে পরিণত করা	Reduction to common denominator
সমচতুর্ভুজ	বর্গ ; রম্বস	Square ; Rhombus
সমবাহু	সমবাহু	Equilateral figure
সমলম্ব	যে চতুর্ভুজের উচ্চতাসমূহ সমান ; ট্রাপিজিয়াম	A quadrilateral with equal altitudes ; Trapezium
সমচক্রবাল	বৃত্ত	Circle
সম্পাত	ছেদ বিন্দু	Point of intersection
হৃদয় বা হৃৎ বা		
হৃদয়বিন্দু	পরিব্যাসার্ধ	Circum-radius.

বিঃ দ্রঃ এ ছাড়াও গ্রন্থমধ্যে আরো বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ।

॥ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ॥

[কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকের নাম ভুলে যাওয়ায় মার্জনাপ্রার্থী ।]

1. অধর্ব বেদ—বিজয় বিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮
2. অধর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলকাতা ।
3. অলবেকুণী—শ্রেয়সময় দাশগুপ্ত, ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ।
4. আলবেকুণীর ভারততত্ত্ব—আবু মহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, বাংলাদেশ ।
5. আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (১ম+২য়)—যোগেশচন্দ্র রায়
বিজ্ঞানিধি ।
6. ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম+২য়)—রমেশচন্দ্র দত্ত ।
7. ঋগ্বেদ—পরিতোষ ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ।
8. ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র—বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ ।
9. কুমারসম্ভবম্—বহুমতী প্রকাশন, কলকাতা ।
10. কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র (১ম+২য়)—রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল
প্রিকার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা ।
11. গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস—কাজী মোতাহার হোসেন, বাংলাদেশ ।
12. গণিতের কথা ও কাহিনী—নন্দলাল মাইতি, আলফা-বিটা প্রা. লি.,
কলকাতা ।
13. গণিতের ললিত পাঠ—নন্দলাল মাইতি, প্রোগ্রেসিভ বুক কোরাম,
কলকাতা ।
14. প্রাগৈতিহাসিক মহেন্দ্র-জো-দড়ো—কুঞ্জবিহারী গোস্বামী, ক. বি. ।
15. প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা—প্রদীপকুমার মজুমদার, গ্রন্থমেলা,
কলকাতা ।
16. প্রাচীন ভারতে গণিতচিন্তা—রমাতোষ সরকার, ব্যাডিক্যাল বুক ক্লাব,
কলকাতা ।
17. প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা—রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিশ্বভারতী ।
18. প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান—অরুণরতন ভট্টাচার্য, ক. বি. ।
19. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—প্রফুল্লচন্দ্র বোস ।
20. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ।

21. পৃথিবীর ইতিহাস (১-৮)—দুর্গাদাস লাহিড়ী ।
22. পৌরাণিক অভিধান—স্বধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা ।
23. পুরাণ ও বিজ্ঞান—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ।
24. বঙ্গ প্রসঙ্গ—সুশীল রায়, কলকাতা ।
25. বাঙালীর ইতিহাস—নীহারবল্লভ রায়, লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা ।
26. বাংলার ইতিহাস (১ম+২য়)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা ।
27. বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম)—রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স ।
28. বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক. বি. ।
29. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম+২য়+৩য়)—অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।
30. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন ।
31. বীজগণিত—রাধাবল্লভ দেবশর্মা ।
32. বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম+২য়)—সমরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান অ্যানো-সিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুর ।
33. বেদ ও বিজ্ঞান—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ।
34. ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক. বি. ।
35. ভাষা গণিত—সাধন দাশগুপ্ত, প্রত্যয় প্রকাশ, হাওড়া ।
36. মৌর্য যুগের ভারতীয় সমাজ—নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক. বি. ।
37. যজুর্বেদ—বিজ্ঞানবিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ।
38. সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ (১ম+২য়)—দুর্গাশঙ্কর ।
39. সামবেদ—পরিতোষ ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ।
40. সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—রাধাবল্লভ দেবশর্মা ।
41. সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী ।
42. লীলারতী—রাধাবল্লভ দেবশর্মা ।
43. কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি—নীহারবল্লভ রায়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ।

॥ বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ॥

1. জ্ঞান ও বিজ্ঞান (জুন—1975)—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ।
2. ধাঁধা—কলকাতা ।
3. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা :

ডঃ বি. বি. দত্ত :

- (a) শব্দ-সংখ্যা প্রণালী—35 তম বর্ষ, 1ম সংখ্যা ।
- (b) অক্ষর-সংখ্যা প্রণালী—36 তম বর্ষ ।
- (c) জ্যামিতিশাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার—37 তম বর্ষ ।
- (d) নাম সংখ্যা—37-তম বর্ষ ।
- (e) জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা—37-তম বর্ষ ।
- (f) অঙ্কগাং বামতো গতিঃ—37-তম বর্ষ ।
- (g) মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা—41-তম বর্ষ ।
- (h) মহাভারতে স্থানীয় মান তত্ত্ব—43-তম বর্ষ ।
- (i) বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স—44-তম বর্ষ ।
- (j) দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন কাল—46-তম বর্ষ ।

বে'গেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিষি :

- (a) আক্ষিক শব্দ—36-তম বর্ষ ।

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় :

- (a) স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত নক্সেতটির উদ্ভাবন কাল—43-তম বর্ষ ।

অনামাঙ্কিত লেখক :

- (a) অঙ্ক ভাবনা—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ।

পর্ষদ বার্তা : নন্দলাল মাইতি

- (i) সেপ্টেম্বর সংখ্যা, 1979

- (ii) মার্চ সংখ্যা, 1981

- (iii) এপ্রিল সংখ্যা, 1981

॥ সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ ॥

1. Aryabhaṭīya of Āryabhaṭa—Critically edited with introduction, notes, comments and translation by

- K. S. Shukla and K. V. Sarma ; Indian Science Academy, New Delhi, 1976.
2. Āryabhata—Indian Mathematician and Astronomer—K. S. Shukla.
3. Āpastamba-Śulba-Sūtra—Edited and translated by Satya Prakash and R. S. Sharma, New Delhi, 1968.
4. Artha Śāstra of Kautilya—Edited and translated by R. Shamasastri, Mysore, 1951.
5. A Concise History of Mathematics—Florian Cajori, 1893.
6. A Concise History of Science in India—Bose, Sen & Subbarayappa ; INSA, New Delhi, 1971.
7. A Historical View of Hindu Astronomy—J. Bently.
8. Bakhshālī Manuscript—Edited by Kaye, Archaeological Survey of India, New Imperial Series, No. 43, pts. I and II, Calcutta ; pt III, Delhi, 1933.
9. Baudhāyana Śulba-Sūtra—With Thibaut's Tr, ed. by Satya Prakash and R. S. Sharma, New Delhi, 1968.
10. (Tr. of Bījagaṇita) : Algebra with Arithmetic and Mensuration Translated from the Sanskrit of Brahmagupta and Bhāscara, by H. T. Colebrooke, 1872
11. Bijganitavatamsat—K. S. Shukla, Akhil Bharatiya Sanskrit Parishad, Lucknow.
12. A Concise History of Mathematics—D. J. Struik, Dover Publications, N. Y., 1967
13. An Advanced History of India—Mazumder, Roychowdhuri & Dutta.
14. Cambridge History of India. ed. by E. J. Rapson
15. Cultural Heritage of India—Ramakrishna Mission.

16. *Geometry in Ancient and Mediaval India*—T. A. Saraswati, Motilal Banarsidass, New Delhi, 1979
17. *Golasara of Nilkanta*—Ed. K. V. Sharma, Vishvesvarananda Institute, Hoshiarpur, 1970
18. *Grahanamandan of Paramesvara*—Ed. K. V. Sharma, V. V. Institute, 1965
19. *History of Hindu Mathematics*—B. B. Dutta & A. N. Singh, Asia Publishing House, Bombay.
20. *History of Kerala Astronomy*—K. V. Sharma, V. V. Institute, 1972
21. *History of Ancient Indian Mathematics*—C. N. Srinivasienger, World Press, Calcutta, 1967
22. *History of Mathematics (vol. I+II)*. D. E. Smith, Dover, N. Y., 1958
23. *History and Culture of Indian People (vol-I)*, R. C. Mazumder, C. U.
24. *Indian Philosophy (vol. I)*—S. Radhakrishnan, London.
25. *Indian Culture (Kamala Lecture)*—Hirendranath Datta, C. U.
26. *Islamic Science*—S. H. Nasr, World of Islamic Festival Publishing Company, 1976
27. *Khandakhadyaka*—Ed. by P. C. Sengupta, C. U., 1941
28. *Mahābhāskariya of Bhāskara I*—Ed. by K. S. Shukla, L. U.
29. *Mathematics in Western Culture*—M. Kline, Penguin.
30. *Mathematics from Ancient to Modern Times*—M. Kline, Oxford, N. Y.
31. *Mathematics and Imagination*—Kasner and Newman, G. Bell & sons, London, 1950

32. Men of Mathematics—E. T. Bell, Simon & Schuster, N. Y., 1965
33. Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India—Sylvain Levis, Jean Przyluski V Joles Bloch, translated by P. C. Bagchi, C. U., 1959
34. Patiganita of Sridhara—Ed. by K. S. Shukla, L. U., 1959
35. Rasigolasphutaniti of Acyuta—ed. by K. V. Sharma.
36. Surya Siddhanta—Burgess, translated by P.L. Ganguli, C. U.
37. Siddhantadarpana of Nilkanta—ed. by K. V. Sharma.
38. Siddhanta Sekhara of Sripati—ed. by Babua Misra, C. U.
39. Studies in Antiquities—H. C. Roychowdhuri, C. U.
40. Science and Scientists of Ancient India—O. P. Jaggi, Atmaram & Sons, New Delhi.
41. The Origin of Bengali Script—R. D. Banerji, Naba-bharat Prakashan, Calcutta.
42. The Indus Civilization—M. Wheeler, London.
43. The Science of Sulba—B. B. Datta, C. U.
44. The Astronomical observatories of Jai Singh—G. R. Kaye, Archaeological Survey of India.
45. Thoughts on the nature of Mathematics—J. N. Kapoor, Atmaram & Sons, New Delhi.
46. Vedic Culture—Mahadevananda Giri, C. U.
47. Vedanga Jautisha—R. Shamshastry

ARTICLES IN JOURNALS

1. A. K. Bag :
(a) Al-Bīrūnī on Indian Arithmetic, IJHS, Vol-10, 1973

- (b) The method of Integral Solution of Indeterminate equations of the type $By = Ax \pm c$ in ancient and medieval India—IJHS, Vol—12, 1977

2. B. B. Datta :

- (a) The present mode of expressing numbers—IHQ (III), 1927.
- (b) The Scope and development of the Hindu Maths—IHQ, 1929.
- (c) Elder Āryabhaṭa's methods rule for the solution of indeterminate equation of the first degree—Bull, Cal. Math. Soc., Vol—24, 1932
- (d) Testimony of early Arab writers on the origin of our numerals—BCMS, Vol—24, 1932
- (e) The Hindu method of testing Arithmetical operation—JASB, Vol—23, 1927
- (f) Hindu value of π —JASB, Vol—22
- (g) The Jain School Mathematics—BCMS, Vol—21, 1929
- (h) The Bakhshali Mathematics—BCMS, Vol—21
- (i) The Hindu solution of the general Pellian equation—BCMS, Vol—19, 1928
- (j) Early History of the Arithmetic of Zero and Infinity in India—BCMS, Vol—18.
- (k) Two Āryabhaṭas of Albiruni—BCMS, Vol—17, 1926
- (l) The Algebra of Nāśāyaṇa—The Jain Atiquary, Vol—19, 1933.

3. B. S. Jain :

On the Ganitasāra Saṁgraha of Mahavira (C. 850 AD)
IJHS, Vol—12, 1977

4. B. S. Jain & Ram Behari.

Some Mathematical Contribution of ancient Indian mathematicians as given in the works of Bhāskarācarya—IJHS, Vol—12, 1977.

G. Chakraborty :

- (i) On the Hindu treatment of Fractions—JDL, Vol—24, 1934
- (ii) Surd in Hindu Mathematics—JDL, Vol—24, 1934
- (iii) Growth and development of progressive series in India, JDL, Vol—24, 1934
- (iv) The Hindu terms of area—JDL, Vol—24, 1934.

5. G. R. Kaye :

- (i) Reference of Indian mathematics in certain Medieval works—JPAS, 1911
- (ii) The Bakshali Manuscript—JPAS, vol-8, 1912

6. S. K. Ganguli :

- (i) Was Aryabhata indebted to the Greeks for his alphabetic system of expressing numbers ? BCMS, Vol—17
- (ii) The Source of the Indian solution of the so called Pellian equation—BCMS, Vol—19, 1928
- (iii) Did the Babylonians and Mayas of Central Americans possess place value arithmetic notation ? BCMS, Vol—22

7. N. K. Mazumder :

- (i) Manava Sulba Sutram—JDL, Vol—8, 1922
- (ii) Aryabhata's Rule in relation to Indeterminate equation of the first degree—BCMS, Vol—3, 1911-12

8. S. R. Das :

- (i) The origin and development of numerals—IHQ (iii) 1927

9. P. K. Mazumdar :

- (i) Ganita Kaumudi and the Continued Fraction—IJHS, Vol—13, 1978

10. N. B. Misra :

(i) Remarks on Kaye's article, Modern Review.

11. R. N. Mukherjee :

(i) Background to the discovery of the symbol for zero—
IJHS, Vol—12, 1977

12. P. C. Sengupta :

(i) Aryabhata's lost work—JCMS, Vol—22, 1930

(ii) The Aryabhatiyam—Translation, JDL, Vol—16, 1927

বিঃ দ্রঃ : এ ছাড়া আরো বহু প্রবন্ধের সহায়তা গ্রহণে স্বীকার করি যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। একান্ত সুধীমণ্ডলীর মার্জনা প্রার্থী।

নির্ঘণ্ট

॥ অ ॥

অক পুস্তক—১০২
 অজ্ঞাত রাশি—৪৫, ৫৩, ১২১-১২২
 অখর্ব বেদ—৪, ২০২, ২১০
 অর্থশাস্ত্র—১৬৬, ২০২, ২২৫, ২৩২, ২৩৪
 অনন্ত—৪২, ৪৩, ৪৪, ২২২-২৩০
 অনির্ণেয় সমীকরণ (কুট্টক)—১৫, ৬৫,
 ১১০, ২১৩-২২৪
 অমুযোগ-দ্বার-সূত্র—৪৭, ১৮১, ১২৩
 অপ্রকৃত নিয়ম (অস্থানিক পদ্ধতি)
 (Regula Falsi)—৫২, ২০১
 অপ্রকৃত ভগ্নাংশ—৪৫
 অ্যাপোলোনিয়াস—১০৮
 অমর কোষ—৫৩
 অমর সিংহ—৫৩
 অমূলদরাশি—১৫, ৩২, ৬৪
 অরূপবতন তট্টাচার্হ—৭৮
 অল কলসাদী—১৬৭
 অলবিক্রণী—৬৩, ৭২, ৮০, ১১১, ১৪৫
 ১৫২
 অ্যালমাজেস্ট—৪৫
 অল হাসাব—১৬৭
 অ্যাস্ট্রোলাব—১৪২, ১৪৪, ১৪৫
 অয়লাব—১৩২, ২২৩

 ॥ অ ॥
 আইনস্টাইন—৮০

আর্কিমিডিস—৬৭, ১৩৮
 আগম—৫
 আপস্তম্বীয়-শুদ্র-ভাষ্য—৩৫
 আবুল ফজল—১২৮
 আয়তক্ষেত্র—১৫, ১২, ২৩, ২৮, ৩৩, ৪৫
 আরণ্যক—২, ৩, ৪
 আর্ষভট (প্রথম)—৩৪, ৩৫, ৩৬, ৬১-
 ৭৪, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৬, ৮৯,
 ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০০, ১১২, ১২৬,
 ১২৭, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৭,
 ১৫৮, ১৬২, ১৬৬, ১৭১, ১৭৭,
 ১৮৩, ১৮৫, ১৯১, ১৯৭, ২০২,
 ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৯, ২১৪,
 ২১৫, ২১৬, ২১৯, ২২৩, ২২৭
 আর্ষভট (দ্বিতীয়)—১৩, ৬৩, ৬৪, ৬৭,
 ৮২, ১১০, ১১১, ১১২, ১২৬, ১২৭,
 ১৬৪, ১৬৫, ১৬৮, ১৭১, ২২৭
 আর্ষভটীয়—৫৩, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৭১,
 ৭৩, ৭৭, ৮১, ১০০, ১১৩, ১৩৫,
 ১৬৩, ১৮২, ১৮৩, ১৯৭, ২০৪,
 ২০৫, ২১৭
 আর্ষভটীয় সূত্রভাস্ক বা আর্ষভটীয়
 তত্ত্বভাষ্য—৭৭, ৭৮, ১১২
 আর্ষসিদ্ধান্ত—১১০
 আল খোয়ারিজমি—১৬৭
 আলী ইবন দীশ—১৪৫
 আলেফ-জিরো—৪৪

॥ ই ॥

ইউক্লিড—২০, ২২, ২৭, ১৩৭, ১৪৫,

২০৪

ইপসিলন—২২৮, ২২৯

ইয়াকুব ইবন তারিখ—২৪

॥ উ ॥

উত্তরাধায়ন সূত্র—৬, ৪৭, ৫০, ১২৩

উস্তা-উল্লা-রুহুদী—১২৮

উপনিষদ—২, ৩, ৪

উপবৃত্ত—১০৮

উপাঙ্গ—৬

উমাধাতী—৪৫, ৪৯, ৫০

উলুখ বেগ—১৪৫

॥ ঋ ॥

ঋষেদ—৩, ১৩, ১৭, ২৩, ২৪, ৩৭, ৫৬,

১০৩, ১৪২, ১৭৩,

ঋষভদেব—৭, ৪২

॥ এ ॥

একক ভগ্নাংশ—১০২

একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ—৬৫, ৭৩,

২১৪-২২১

এডওয়ার্ড কাসনার—১২০

এফ ক্যাজরি—৮, ৪২, ৭৯, ১১২,

১৮৮, ২০১, ২০৮, ২০৯, ২১৩, ২২২

এম. ব্রজাচার্য—৯৮, ১০৮

এল. হগবেন—১৫২, ১৭৭, ২১৫, ২৩৫,

এলিমেন্টস—২০, ২০৪

এস. ওয়াগেন আলী—৮৬

এস. এন. সেন—৪৪, ১৪২, ১৮২

॥ ক ॥

কঙ্ক (গণিতজ্ঞ)—২৪

কচ্চায়ন—৫৩

কটপয়ধি—২৪, ১৫৯

কপদিস্বামী—৩৬

কপাটসঙ্ঘি—২৫

কমলাকর—৬৭, ১৩৭

করণপদ্ধতি—১৫৬, ১৪৯, ১৫০

করমী—১৫, ৩২, ৩৪, ১১৮

করবিন্দস্বামী—৩৫

কর্ণত্রয় সম্পাত্ত—১৩০

কর্ণের উপর বর্গ—২৭

কর্মদীপিকা—১৩৪

কলন—১২৭

কল্প—৪, ৫, ৬

কল্পলতাবতায়—১৮৮

কল্পসূত্র—৬, ১২, ৩১, ৫০, ৭৫, ২০৯,

২১০

কাদম্বরী—২২৬

কাল্পনিক রাশি—১২৬

কালিদাস—২৬, ১১৩

কাত্যায়ন—২০, ২১, ২২, ৩২, ৩৫, ২১৩

কাশ্যপ সংহিতা—১০

ক্রিয়াকর্মকারী—১২৬

কুট্টক—৬৫, ১১৩, ২১৩-২২৪

কুট্টকার-শিরোমণি—২১৪

কৃষ্ণ—১২৫, ১৩৭, ১৭৮, ২৩০

কৃষ্ণ স্বজুর্বেদ—৩
 কেপলার—১৪৬
 কে. ডি. শর্মা—১৫১, ২১৬
 কে. এস. সুর—৭৭, ১২৫, ২১৬
 ক্লেইন—১৩৩
 কেশব—১৩৪, ১৩৭
 কোপারনিকাস—১৪৬
 কোলকাক—৫১
 ক্যাটানিও—৬৭
 ক্যাটালডি—৬৭
 ক্যাক্টর—৩৪, ৪৪, ৩৬, ১১৮
 ক্যাক্টর (এম.)—২০২
 কো—৫১, ৫২, ১৪১

॥ খ ॥

খাই ফ্যাং—৬৭
 খাই লি ফ্যাং—৬৭
 খণ্ডখাতক—৬৪, ৭৪, ২৩, ২৪, ১১৩
 খরোজী—১১, ৩৭, ৩২, ৫০

॥ গ ॥

গণিত কোমুদী—১২৮, ১২৯, ১৬২,
 ২২৭
 গণিত তিলক—১১২, ১৬২
 গণিত বিজ্ঞা—৬
 গণিত মঞ্জরী—১৬২
 গণিতামৃত কৃপিকা—১৩৭
 গণিতসার—১৩৭
 গণিত-সার-সংগ্রহ—৪২, ৪৭, ৫২, ২৮৮

১০০, ১১৪, ১৬২, ১৭১, ১২৪, ২১২
 গদাধর—১৩৬
 গঙ্গাধর—১৬৪, ২০৩
 গণেশ—১২৫, ১৩৭, ১৬২-১৭০, ২৩০
 গাউস—১২৭, ১৩২, ১৪৬
 গোটে—২৮
 গ্যালেলিও—৬৬, ১৪৬
 গোবিন্দস্বামিন—২৭, ১৩৫, ২১৪
 গোবিন্দকৃতি—২৭
 গোস্বত সার—১০২
 গোলকের ক্ষেত্রফল—৭৪, ১২৩
 গোলকের ঘনফল—১২৩
 গোলদৌপিকা—১৩৪
 গোলসার—১৩৫
 গ্রহণ নির্ণয়—১৩৫
 গ্রহণ মণ্ডন—১৩৪

॥ ঘ ॥

ঘন—৪৪, ৬৫, ১৮৩-১৮৪, ১২৬
 ঘনমূল—৬৫, ৬৭-৬৯, ১৬৩, ১৮৩-১৮৪

॥ চ ॥

চতুর্ভুজ—৮২, ২৬, ১০৬, ১১২, ১২২,
 ১৩০
 চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল—১৩০
 চতুস্তলক—১০৪-১০৫
 চার্লস এম. উইল—১৪৬
 চসার—১, ১৪৫
 চোডের ক্ষেত্রফল—৩৪, ১০২

চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি—৬

॥ ঠ ॥

ঠাণংগ—৬

॥ হ ॥

ছন্দ—৪-৬, ৬৫

॥ ড ॥

ছন্দশূত্র—৫, ১৫, ১৬, ৪৮, ১০৫, ২১২

ছায়াগণিত—১৩৫

ডানংসিগ—১২

ডায়োফান্টাস—২০৭, ২০২, ২২৩

ডি. মরগ্যান—১৩২

ডি. জে. ডুইক—২৩৭

ডিকসন—৮৮

ডি. ই. স্মিথ—১৬২, ১৭১, ১৮৫, ১৮৭,
১২২

ডি. লা. আয়ার—১৪৫

ডেডিকিণ্ড—৫৪

॥ জ ॥

জগন্নাথ পণ্ডিত—১৪৫

জর্জ সার্টন—৭২

জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি—৬, ৪৭

জিন চরিত—৫

জিন ভদ্রগণি—১৭৩

জীজ—১৪৫

॥ ক ॥

জয় সিং—১৩৮-১৪৫

জৈন গণিত—৪২-৫০, ৬৫-৬৭, ৬২,

১২৭

জানবাজ—১৩৭

কল্পসার—১৩৫

কল্প সংগ্রহ—১৪৬

কর্তার্বাধিগমশূত্র ভাষ্য—৪৫, ৫০, ১৭১

কিলক—৩

কৈস্তিরীয় সংহিতা—১২, ১৪, ২৩, ২২,
২০২, ২১০

॥ ট ॥

টঙ্ক—১৪০, ১৪৬

টলেমী—৬৭, ১৩৮, ১৪৫

টি. এ. সর্বস্বতী—১৫, ২২, ২৮, ২২,
২৬, ১০২, ১৮৮ট্রান্সিলিয়াম—১২, ২৬, ২৭, ৬৫, ২২,
১০৬, ১০২, ১২৫

ট্রান্সিলিয়ামের ক্ষেত্রফল—৩৪, ৭৪

ত্রিকোণমিতি—১৭, ২৩, ৬৫, ১২৬

ত্রিভুজ—১২, ২৩, ৬৫, ১০৬

ত্রিভুজ (সমকোণী)—৩২, ৩৫

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল—৩৪, ৭৩, ৮৭, ১০৬,
১০৭, ১২২

ত্রিলোক-প্রজ্ঞপ্তি—১০২

ত্রিলোক-সার—১০২

ত্রিশতিকা—৩৫, ৫৪, ৯৫, ১৩৬, ১৩৭, নবাবু—১৩৮

১৬২, ১৭১, ১৯২

ত্রৈশাশিক—৫৬, ৬৫, ১৮৪-১৮৭

॥ খ ॥

খিওন—১৮২

খিবো—২৮

॥ দ ॥

দক্ষিণ—১৮, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯

দশগুণোত্তর স্থানিক মান পদ্ধতি—১৫২-

১৫৫, ২২৫

দামোদর—১৩৪, ১৩৫

দিবাকর—১৩৭

দেবলভট্ট—৬১

দেবরাজ—২১৪

দারকানাথ—৫৪-৩৬

দ্বিষাৎ সমীকরণ—১৫, ৬৫, ১৮২,

২০৪-২০৯

দ্বিপদ উপপাদ্য—৫

দৃগ্ গণিত—১৩৪

॥ ব ॥

ধবলা-টীকা—১০২

ধীকোটিকরণ—১১২

ধুন্ধিরাজ—১৩৭

ধ্রুবমানস—১১২

॥ ম ॥

নাগার্জুন—২২৬

নরেন্দ্রকুমার মজুমদার—২১

নারায়ণ পণ্ডিত—১২৮-১৩১, ১৭১, ১৯৪,

১৯৫, ২১৯, ২২৭

নারায়ণ ভট্ট—৬১

নাসির আল-দীন আল-তুঘী—১৪৫

নিউটন—২৩, ১১৫, ১১৮, ১২৭, ১৪৬

নিকোম্যাকাস—৮৩

নির্ঘণ্ট—৬

নিকর—৬

নীলকণ্ঠ—৩৬, ৬৩, ১৩৪-১৩৬

নীহারবল্লভ রায়—৬১, ২৩৫

নেপিরার—১৪৫

নৈষদচরিত—২২৬

নুসিংহ—১৩৭

॥ প ॥

পতঞ্জলি—৫, ১৯, ২২

পরমেশ্বর—১৩৪, ১৩৫, ১৭৭, ১৮২

পরহিত—৯৫, ১৩৪

পশিলা—২৩২, ২৩৩

পদ্মনাভ—১১৪

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ—১২, ১৪, ৬৯

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা—৭৫, ৭৬, ১৩৫

পরিব্যাসার্থের মত—১৩১

পাই (প)—৩০, ৬৫, ৬৬

পাটীসার—৯৫, ১৩৮, ১৬২

পাটীগণিতের বিষয়বস্তু—১৬২-১৭৬

পাঞ্চাল—১৬, ৪৮, ১৬৯

পিরামিড—৬৫
 পিক্সল—১৫, ১৬, ২১২
 পীথাগোরাস—২৪, ২৭, ৩৪, ৭৩
 পেলিয়ান সমীকরণ—৮১, ২২৩
 প্লেটে—১৭
 পৈতামহ সিদ্ধান্ত—৭৬
 পোলিশ সিদ্ধান্ত—৭৬, ১২৬
 প্রগতি—১৪, ১৫, ৬২, ৭০, ২০২-২১২
 প্রক্ষেপ তত্ত্ব—২৩, ১২৭
 প্রদীপকুমার মজুমদার—১৬৬, ১৮৩
 প্রহ্ম—৮০
 প্রভাকর—৭৪
 পৃথুক বায়ী—৫৭, ৮১, ২২, ১৩৩, ১৬২,
 ১৭৭, ১২০, ১২২, ১২৮

॥ ক ॥

ক্রামশ্রীড—১৪৫
 কিবোনাচি—৮৮
 ফেরমা—২২৩
 কেসিলে—২২৩

॥ খ ॥

বকশালী পাণ্ডুলিপি—৫১-৭০, ৬৫, ৬২,
 ৮১, ৯৫, ১৬২, ১৬৬, ১৭১, ১৮৪,
 ১২০, ১২৭-১২২, ২০৩, ২১০, ২২৬
 বরকটি—২৪, ১৫২
 বরাহমিহির—৭৪, ৭৫-৭৭, ১২৬, ১৮৫
 বর্গ—৪৪, ৬৫, ৮৩, ৯৬, ১২২,
 ১৭৭-১৮১

বর্গ-প্রকৃতি—১১৩, ২২১-২২৪
 বর্গমূল—৬৫-৬৮, ১৬৩, ১৮১-১৮৩
 বর্রাল—১৩৮
 বশিষ্ট ধর্মসূত্র—৩৭
 বাসসেনীর সংহিতা—৬২, ২০২
 বাণভট্ট—২২৬
 বাণি ষ্টিসিদ্ধান্ত—৭৬
 বাসবদত্তা—২২৬
 বাৎস্তায়ন—৫
 বিবরণ—১৩৪
 বিভূতিভূষণ দত্ত—২৮, ৫২, ৫৪, ২১৫
 বিক্রাস—১৫, ১৬, ৪৫, ৪৭, ১১৭
 বিশ্বনাথ—১৩৭
 বিষ্ণু—১৩৬, ১৩৭
 বীজগণিত—১৭, ২৩, ১৮৮-২১২
 বীজগণিতাবতংশ—২৮
 বীরসেন—১০২
 বুদ্ধিবিলাসিনী—১৩৭, ১৭০
 বৃহলার—৭২
 বৃষক—২৮
 বেকার—২০২
 বেদাঙ্গ—৪, ১২, ৬২
 বেদাঙ্গ জ্যোতিষ—১৩৫, ১৭৩
 বোধায়ন—১২-২১, ২৭, ২৮, ৩২, ২১৩
 বৃহস্পতি—১০, ৬৫, ৭২, ১২৬
 বৃহস্পতির ক্ষেত্রফল—৪৫, ৭৫, ১৩৬
 বৃহজ্জ্যোতিষ—৭৬, ১৩৫
 বৃহদ্রথ—১৪, ৬২, ২০২, ২১০
 বৃহৎ সংহিতা—৭৫, ৭৬, ১৩৫

ব্রহ্মগুপ্ত—১৩, ৪৫, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭৪,
৭২-২৫, ২২, ১০৬, ১১৪, ১১৭,
১২৬, ১৬২, ১৬৬, ১৬৭, ১৭১,
১৭৩, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৬, ১৮২, ১২২-
১২৭, ২০০, ২০৬-২০৫, ২০৭, ২০২,
২১১, ২১৩, ২১২-২২২, ২২৭, ২২২
ব্রহ্ম-স্মৃতি-সিদ্ধান্ত—৫৩, ৬৪, ৭২-৮১,
২৫, ১২৮, ১৩৩, ১৬৩, ১৭৭, ১২৫,
২২২

ব্রাহ্মণ—২, ৪, ১২-১৪, ২৩
ব্রাহ্মী—১১, ৩৭-৪০, ৫০
ব্যাকরণ—৪, ৬

॥ ভ ॥

ভগবানলাল ইন্দ্রজী—৫৮
ভগবতী স্তব—৪৭
ভগ্নাংশ—১৪, ৪৫, ৫৬
ভটমোপিকা—১৩৪
ভটসংস্কার—৩৫
ভদ্রবাহু—৬, ৪২, ৫০, ৭৫, ৭৬, ৮২,
৮৩, ১২৩, ২১০

ভাউদাঙ্গী—৬২
ভাট্টবাহবী সংহিতা—৭৬-৭৮
ভাবতীকৃষ্ণ তীর্থজী—১৩৩
ভিনটাবনিজ—৩, ৪
ভিয়েটা—৮৮
ভূ-ত্ৰয়বাদ—১২৭, ১৩৩
ভাস্কর (প্রথম)—৭১, ৭৪, ১৩২,
১৩৪, ১৬৪, ১৮০, ২১৩, ২১৪,
২১৫, ২১২, ২২০

ভাস্কর (দ্বিতীয়)—১৫, ৩৬, ৪৬, ৫৩,
৫৭, ৬৭, ৭৭, ৮২, ২৪-২৬, ২৮,
১১৩-১২৮, ১৩২-১৩৪, ১৩৬, ১৬৪,
১৭১, ১৭৩-১৭৬, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৫,
১৮২, ১২২-১২৭, ২০০, ২০৩, ২০৬-
২০৮, ২১১, ২১৪, ২১৭, ২১২-২২২,
২২৮-২৩০, ২৩৬

ভেক্টেবর—৩৪, ৩৫

॥ ঙ ॥

মহাবীর—১৫, ৪২, ৪৭, ৫৭, ৫২, ৬৭,
৮৭, ৮২, ২৫, ২৮-১০২, ১১৪, ১১৭,
১৩২, ১৩২, ১৭১, ১৭২, ১৮৪,
১২৪, ১২৬, ২০৩, ২০৬, ২১২, ২১৭,
২১২, ২২১

মহাভাষ্ক—১৩৫

মহা-ভাস্করীয়—৭৭, ৭৮, ২৭, ১৬৪,
২১৩, ২১৪, ২১২

মহামার্গনিবন্ধন—২৫

মহাসিদ্ধান্ত—৬৩, ৬৪, ৬৭, ১১০, ২২৭

মরীচি—১৩৮

মল্লারি—১৩৭

মহীধর—৩৫

মাধব—১৩৫

মানব—২১-২২

মাণ্য গুণন—১০২

ম্যাক্সমুলাব—৩, ৫১

ম্যাকে—১০

ম্যাক্সিমালি—১৩২

মার্সেনে—১৩২
মিতভাষিনী—১৩৮
মীমাংসা—১৩৫
মুনীন্দর—১৩৮
মুগ্গাল—১১২
মুহম্মদ ইবন ইব্রাহিম অল-কজারী—২৪
মুহম্মদ মুহদি—১৪৫
মুহম্মদ শরীফ—১৪৫
মুলদরাশি—১৫, ৩২, ৩৪
মেকশ্রস্তর—১৬, ৪৮
মৈত্রায়নী—৩৬
মৌলানা চাদ—১৪৫

॥ ব ॥

বহুভট্ট—৬১
বশোভজ—৭৫
বুক্তিভাষা—১৪৬, ১৪৭-১৪৯, ১৮১

॥ র ॥

রবার্ট রেকর্ড—১৮৫, ২০২
রবার্ট মে—১০২
রসভেদ—৪৭
রঘুবংশ—২৬
রঙ্গনাথ—১৩৭, ১৩৮
রবীন্দ্রনাথ—২৩১
রঘুস—১১০, ১১১
রাধাগোবিন্দ বসাক—২২৬
রমেশচন্দ্র মজুমদার—৫১, ৫৫
রামচন্দ্র—৫৫, ৩৬

রামায়ণ—২১
রামায়ণতন—১৩০
রীড (Read)—৭৫
রোমক সিদ্ধান্ত—৭৪, ৭৬
রোস—১১

॥ ল ॥

ল. সা. গু.—২৯
লজ্জাচার্য—৪৬, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬,
১২৬
ললিতা বিস্তার—৪৩
লঘু ভাস্করীয়—৭৭, ৭৮, ৯৭, ১৩৪
লঘু মানস—১১২, ১৩৫
লঘু মানসের ভাস্কর—১৩৪
লক্ষ্মীদাস—১৩৭
লাটদেব—৭৪, ৮০
ল্যাপলাস—১৩৯
ল্যাগরেঞ্জ—২২৩
লিবনিজ—১১৮, ১২৭, ১৪৬
লীলাবতী—৬৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬,
১১৭, ১১৯, ১২৩, ১২৮, ১৩৬, ১৩৮,
১৬২, ১৭০, ২০০
লেজেগুর—১০৯
লৈখিক চিত্র—৬৫

॥ শ ॥

শঙ্কর—৫, ২১
শঙ্কর নারায়ণ—৯৭
শঙ্কর ভট্ট—৩৬

শতপথ ব্রাহ্মণ—১৩, ১৪, ১৮৮

॥ জ ॥

শিবদাস—২০

সদরত্ন মালা—১৪৬, ১৫০

শিশুধীবৃদ্ধি—৪৬

সমবায়—৫, ১৫, ১৬, ৪৭, ৪৮, ১০৫,

১১৭

শীর্ষ প্রহেলিকা—১৩, ৪৪

শুভসূত্র—৫, ১২, ১৪, ১৫, ১৭-৩৬, ৬৬,

৮১, ৮৬, ১০৩, ১৬৬, ১৭৩, ১৮৮,

২১৩

সমাস্তর শ্রেণী—শ্রেণী ত্রৈব্য

সাইন-তালিকা—৭১-৭৩, ৯৩, ১২৬

সাইন-পার্থক্য—৬৫

শুভ-সূত্র-বৃত্তি—৩৫

সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল—৩৪, ১১০

শুভ-প্রদীপ—৩৬

সায়নাচার্য—৩৬

শুভ-প্রদীপিকা—৩৬

সিদ্ধান্ত—৫

শুল্ক যজুর্বেদ—৩

সিদ্ধান্ত দর্পণ—১৩৪, ১৩৫

শূলপাণি—৩৬

সিদ্ধান্ত বিবেক—১৩৭

শূন্য—১১৭, ১২২, ১৬০-১৬১, ২২৫,

২২৬-২৩১

সিদ্ধান্ত-শিবোমণি—১১৩, ১১৪, ১২৮,

১৬৮, ২৩৬

শ্বেনচিতি—১৫, ২৪, ২৫, ১৮৮, ১৮৯

সিদ্ধান্ত-শেখর—১১২, ১৩৫, ১২৪, ২০০

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—৫১, ৯৫

সিদ্ধান্ত-সুন্দর—১৩৭

শ্রীনিবাসিরেকার—৫৪, ৬০, ২২৪

সিলভা নেভি—২৩২, ২৩৪

শ্রীপতি—১১১-১১২, ১৩৩, ১৬৮, ১৭৭,

১৯২, ১৯৪, ২০০, ২০৩, ২১২, ২২১

সুদকবা—৬৫, ৮২

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—২৩২, ২৩৩

শ্রীধরাচার্য—৩৫, ৩৬, ৪৫, ৫৩, ৫৭, ৬৭,

৮৯, ৯৫-৯৬, ৯৯, ১১০, ১১৪, ১৩২,

১৩৭, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭৫, ১৭৭,

১৯২, ২০৩, ২০৫, ২০৬

সুবন্ধু—২২৬

সুন্দররাজ—৩৬

সুশ্রুত—৪৭

সুচক সূত্র—৪৭

শ্রীসেন—৮০

সুত্রের সংজ্ঞা—৪

শ্রীহর্ষ—২২৬

সূর্যদাস—১৩৭, ১৬৫

সূর্য-প্রজ্ঞাপ্তি—৬, ৪৬, ১৭৩

শ্রেণী—১৪, ১৫, ৫৩, ৫৬, ৬৫, ৬৯, ৭০,

৮৩-৮৫, ৯৬, ১০৯, ২০৯-২১২

সূর্য সিদ্ধান্ত—৬৭, ৭৪, ১২৬, ১৩৫, ১৩৮

সৌর সিদ্ধান্ত—৭৬

শ্রোত সূত্র—৩৫

সৈয়দ হোসেন নাসির—১৪১, ১৪২

সংখ্যা বর্ণ পদ্ধতি—১৫৭-১৫৯	হরিদন্ত—২৫, ১৫৯
সংখ্যা শব্দ পদ্ধতি—১৫৫-১৫৭	হলস্টেড—১৬০, ২২৬
সংহিতা—২, ৩, ৪, ১২, ১৪, ২৩	হলায়ুধ—১৬, ৪৮
সিংহভিলক স্ত্রী—১১২	হাডি—৬১
স্বীকার্য—২২, ২৩	হিপারকাস—১৪৫
স্বতঃসিদ্ধ—২০, ২১, ২২, ২৩	হীরন—৫৫, ১৩৮
স্বানাক সূত্র—৬, ১২৭, ২০২	হেমচন্দ্র—৪৯
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি—৩৭	হেমাদ্রি—৩৬
হর্নেল—৫৫	হাকেল—২০৮

॥ হ ॥